

全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）

指定辅导用书

2011

护理学（师）考试

护师急救包

要考过，找“军医”！

下 册

访问网站 <http://www.591guo.com> 在线答题


2011 全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书
模拟试卷及解析 网络学习版

要考过，找“军医”！


通过率 最高

网络评价 最好

全国 最畅销



人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS



全能职业人
www.591guo.com

400 元

含：

- 辅导教材 历年考点精编
- 试卷 5套高仿真模拟试卷
- 网络学习卡 内含高仿真模拟试卷及习题，共5000余道题；不少于8课时的培训课程



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

护理学专业初级（师）资格考试

模拟试卷一

下篇

模拟试卷及解析

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1. 滴虫性阴道炎阴道分泌物的特征是
 - A. 豆渣样
 - B. 脓性
 - C. 黏液状
 - D. 泡沫状
 - E. 血性
- 2. 影响子宫内膜由增殖期转变为分泌期的主要激素是
 - A. 雌激素
 - B. 孕激素
 - C. 雄激素
 - D. 促卵泡素
 - E. 黄体生成素
- 3. 女性外生殖器不包括
 - A. 阴阜
 - B. 阴蒂
 - C. 阴道
 - D. 小阴唇
 - E. 前庭大腺
- 4. 正常妊娠血液循环系统的生理改变是
 - A. 血浆蛋白含量降低
 - B. 血沉减慢
 - C. 红细胞总数减少
 - D. 纤维蛋白原含量降低
 - E. 白细胞总数减少
- 5. 宫内节育器避孕的原理是

- A. 抑制排卵
- B. 阻止受精卵的运行
- C. 改变输卵管蠕动方向
- D. 改变子宫内膜的功能
- E. 改变宫腔内环境
- 6. 硫酸镁治疗重度妊娠高血压综合征的药理作用是
 - A. 降压
 - B. 解痉
 - C. 利尿
 - D. 镇静
 - E. 扩容
- 7. 煮沸灭菌时，在水中加入碳酸氢钠制成 2% 溶液，可使沸点提高到
 - A. 103℃
 - B. 105℃
 - C. 107℃
 - D. 109℃
 - E. 111℃
- 8. 急性肾衰竭病因中属于肾性因素的是
 - A. 休克
 - B. 严重脱水
 - C. 心功能不全
 - D. 严重肾脏挤压伤
 - E. 前列腺增生
- 9. 急性肾衰竭少尿期危害最大的电解质改变是
 - A. 高血磷
 - B. 低血钙
 - C. 高血钾
 - D. 高血镁

E. 低血钠

10. 局麻药中毒出现严重惊厥，处理时首选的药物是

- A. 硫喷妥钠
- B. 地西洋（安定）
- C. 哌替啶
- D. 氯丙嗪
- E. 苯巴比妥钠

11. 最易引起喉痉挛的麻醉方法是

- A. 普鲁卡因局部麻醉
- B. 普鲁卡因蛛网膜下腔麻醉
- C. 氯胺酮静脉麻醉
- D. 硫喷妥钠静脉麻醉
- E. 氧化亚氮吸入麻醉

12. 在对心室颤动病人进行心肺复苏时，首选药物是

- A. 碳酸氢钠
- B. 阿托品
- C. 利多卡因
- D. 异丙肾上腺素
- E. 氯化钙

13. 引起丹毒的最常见致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. β 溶血性链球菌
- C. 变形杆菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 脆弱拟杆菌

14. 引起破伤风的病原体属于

- A. 革兰染色阴性厌氧芽胞杆菌
- B. 革兰染色阴性需氧芽胞杆菌
- C. 革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌
- D. 革兰染色阳性需氧芽胞杆菌
- E. 革兰染色阴性厌氧杆菌

15. 属于烷化剂类的抗癌药是

- A. 环磷酰胺
- B. 阿糖胞苷
- C. 5-氟尿嘧啶
- D. 甲氨蝶呤
- E. 阿霉素

16. 虽为肿物，并非肿瘤的是

- A. 黑色素瘤
- B. 粉瘤
- C. 脂肪瘤
- D. 纤维瘤
- E. 血管瘤

17. 中厚皮片包括有

- A. 表皮
- B. 表皮及极少量真皮
- C. 表皮及部分真皮
- D. 表皮及全部真皮
- E. 表皮、真皮及少量皮下组织

18. 乳癌最好发的部位是乳房的

- A. 外上象限
- B. 内上象限
- C. 外下象限
- D. 内下象限
- E. 乳晕

19. 急性脓胸最常见的致病菌是

- A. 厌氧菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 肺炎球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 溶血性链球菌

20. 最易发生嵌顿的疝是

- A. 腹股沟直疝
- B. 股疝

- C. 婴儿脐疝
- D. 切口疝
- E. 腹白线疝

21. 可引起原发性腹膜炎的是

- A. 胃穿孔
- B. 肠穿孔
- C. 阑尾炎穿孔
- D. 胆囊炎穿孔
- E. 女性生殖器感染

22. 胃癌的最好发部位是

- A. 贲门
- B. 胃底
- C. 胃体
- D. 胃窦
- E. 幽门

23. 肛痿形成的相关因素是

- A. 肛裂
- B. 内痔
- C. 外痔
- D. 直肠肛管周围脓肿
- E. 直肠脱垂

24. 门静脉高压症患者的门腔静脉交通支开放曲张, 其中最有临床意义的是

- A. 胃底与食管下段静脉交通支
- B. 脐旁与腹壁上静脉交通支
- C. 脐旁与腹壁下静脉交通支
- D. 腹膜后静脉交通支
- E. 直肠下端与肛管静脉交通支

25. 左心衰竭出现的脉象改变是

- A. 奇脉
- B. 不整脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 缓脉

26. 意识全部丧失, 所有反射均消失的状态称为

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

27. 面容枯槁, 面色灰白或发绀, 表情淡漠是

- A. 急性病容
- B. 慢性病容
- C. 危重病容
- D. 甲状腺功能亢进病容
- E. 二尖瓣病容

28. 导致肺癌发生的最重要的危险因素是

- A. 电离辐射
- B. 食物中毒
- C. 汽车尾气
- D. 吸烟
- E. 遗传因素

29. 心力衰竭加重最多见的因素是

- A. 呼吸道感染
- B. 体力活动多
- C. 精神压力大
- D. 高盐饮食
- E. 药物使用不当

30. 引起慢性风湿性心脏瓣膜病的病原菌是

- A. 军团菌
- B. 厌氧菌
- C. 肺炎球菌
- D. 流感病毒
- E. 溶血性链球菌

31. 心绞痛发生的最主要原因是

- A. 主动脉瓣狭窄

- B. 主动脉痉挛
- C. 全身小动脉痉挛
- D. 冠状动脉痉挛
- E. 肺动脉痉挛

32. 上消化道大出血最常见的原因是

- A. 慢性胃炎
- B. 胃癌
- C. 消化性溃疡
- D. 胆道结石
- E. 胰腺炎

33. 在我国，肝硬化的主要病因是

- A. 血吸虫病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胆石症
- D. 胆道蛔虫病
- E. 胃溃疡

34. 急性肾盂肾炎最常见的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 厌氧菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 链球菌
- E. 分枝杆菌

35. 慢性肺心病发病的关键环节是

- A. 气管阻塞
- B. 肺泡膨大
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右心房肥大

36. 慢性胃炎的主要病因是

- A. 幽门螺杆菌
- B. 消炎药物
- C. 烟酒过度
- D. 暴饮暴食
- E. 胆汁反流

37. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素是

- A. 细菌直接损害
- B. 免疫介导炎症
- C. 超量蛋白饮食
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 慢性心力衰竭

38. 甲状腺功能亢进的主要原因是

- A. 精神刺激
- B. 细菌感染
- C. 过度劳累
- D. 自身免疫
- E. 外部创伤

39. 阻塞性肺气肿的主要病因是

- A. 慢性支气管炎
- B. 急性支气管炎
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 支气管扩张
- E. 肺脓肿

40. 脑出血最常见的原因是

- A. 肺源性心脏病
- B. 高血压
- C. 心肌炎
- D. 风湿性心脏病
- E. 冠心病

41. 支气管扩张最常见的病因是

- A. 上呼吸道感染
- B. 麻疹、百日咳
- C. 肺结核
- D. 重症肺炎
- E. 支气管哮喘

42. 1型糖尿病的发病机制是

- A. 细菌感染
- B. 摄糖过多
- C. 代谢不良

- D. 供血不足
- E. 自身免疫

43. 系统性红斑狼疮的发病原因是

- A. 自身免疫
- B. 烈日暴晒
- C. 烟酒过多
- D. 劳累过度
- E. 药物过敏

44. 急性感染性多发性神经根炎危及生命的原因是

- A. 吞咽困难
- B. 呼吸肌麻痹
- C. 面神经麻痹
- D. 水电解质紊乱
- E. 肢体感觉异常

45. 在小儿年龄分期中, 幼儿期是指

- A. 从出生到满 28 天内
- B. 从出生到满 1 周岁
- C. 从 28 天到满 1 周岁
- D. 1 周岁后到满 3 周岁
- E. 3 周岁后到满 6 周岁

46. 正常小儿前囟最迟闭合的时间为

- A. 3~4 个月
- B. 5~6 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月
- E. 24 个月

47. 小儿急性上呼吸道感染最常见的病原体是

- A. 细菌
- B. 真菌
- C. 病毒
- D. 支原体
- E. 衣原体

48. 出生体重为 3.5kg, 现体重为 7kg, 按公式计算其月龄为

- A. 3 个月
- B. 5 个月
- C. 6 个月
- D. 8 个月
- E. 10 个月

49. 婴儿平均每日每公斤体重所需水量为

- A. 100ml
- B. 110ml
- C. 120ml
- D. 150ml
- E. 180ml

50. 极低出生体重儿是指出生体重不足

- A. 1 000g
- B. 1 250g
- C. 1 500g
- D. 2 000g
- E. 2 500g

51. 5 岁小儿正常血压为

- A. 110/70mmHg
- B. 100/60mmHg
- C. 90/60mmHg
- D. 90/50mmHg
- E. 80/50mmHg

52. 小儿中最常见的青紫型先天性心脏病是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 肺动脉狭窄
- D. 大血管错位
- E. 法洛三联症

53. 引起夏季小儿腹泻的病原体主要是

- A. 致病性大肠埃希菌
- B. 金黄色葡萄球菌

- C. 轮状病毒
D. 变形杆菌
E. 柯萨奇病毒
54. 胸部触诊语颤增强见于
A. 肺水肿
B. 肺淤血
C. 气胸
D. 肺空洞
E. 肺实变
55. 支气管哮喘的发病机制是
A. 遗传基因突变
B. 气道变态反应
C. 心肌急性缺血
D. 肺泡充血水肿
E. 肺动脉栓塞
56. 男性, 62 岁, 高血压病史 25 年, 以胸前区持续疼痛 2 天来诊。ECG 显示急性心肌梗死。引起该病的最可能因素为
A. 肺动脉栓塞
B. 主动脉瓣狭窄
C. 冠状动脉梗死
D. 上腔静脉受压
E. 肾动脉狭窄
57. 女性, 25 岁, 确诊为成人缺铁性贫血。引起该病最常见的原因是
A. 饮食中缺铁
B. 骨髓造血不良
C. 铁需要量过多
D. 慢性失血
E. 吸收铁不良
58. 女性, 27 岁, G1P1, 自然分娩一男婴, 体重 4 100g, 胎盘娩出后半小时内阴道出血 500ml, 色红。查看胎盘完整, 见有血管中断于胎膜边缘, 其出血原因最可能是
A. 胎盘残留
B. 子宫收缩乏力
C. 胎盘剥离不全
D. 软产道损伤
E. 宫颈裂伤
59. 女性, 26 岁, 宫颈黏液分泌增多, 黏液变得稀薄, 拉丝度长, 引起此种变化的激素是
A. 促性腺激素释放激素
B. 绒毛膜促性腺激素
C. 促卵泡素
D. 雌激素
E. 孕激素
60. 女性, 34 岁, 主诉停经 50 天, 阴道不规则出血 12 天, 左下腹痛 1 天, 妇科检查: 后穹窿穿刺抽出不凝血 4ml, 尿妊娠试验 (+), 诊断为异位妊娠, 其可能的病因是
A. 子宫肌炎
B. 子宫内膜炎
C. 阴道炎
D. 宫颈炎
E. 输卵管炎
61. 女性, 28 岁, 孕 35 周, 阴道少量出血 4 小时, 伴有剧烈腹痛。检查子宫硬如板状, 压痛 (+), 胎心 112/min, 胎位未触清。诊断可能性最大是
A. 前置胎盘
B. 先兆早产
C. 急产
D. 子宫破裂
E. 胎盘早剥
62. 女性, 24 岁, 平日月经不规律, 因自己无意中摸到腹部包块而就诊, 查尿妊娠反应阳性, 可听到胎心, 宫底在脐耻之间, 估计孕周为

- A. 10 周末
- B. 12 周末
- C. 14 周末
- D. 16 周末
- E. 18 周末

63. 女性, 50 岁, 频繁呕吐多日, 不能进食, 出现脱水、低血钾, 补液时家属心切, 私自将补液速度加快, 发生了高血钾, 此时治疗应选用

- A. 硫酸镁
- B. 氯化铵
- C. 碳酸氢钠
- D. 乳酸钠
- E. 葡萄糖酸钙

64. 男性, 51 岁, 因严重疾病导致胃肠消化功能丧失, 但吸收能力尚好, 欲短期营养疗法, 应采用

- A. 液化饮食
- B. 要素饮食
- C. 浅静脉营养疗法
- D. 深静脉营养疗法
- E. 流食

65. 女性, 53 岁, 休克已 10 小时, 中心静脉压 $16.02\text{cmH}_2\text{O}$ (1.57kPa), 血压 $80/60\text{mmHg}$ ($10.6/8.0\text{kPa}$), 以此判断发生了

- A. 肾衰竭
- B. 肺衰竭
- C. 肝衰竭
- D. 脑衰竭
- E. 心力衰竭

66. 女性, 54 岁, 手术前行腰麻, 当麻醉穿刺注药后, 血压立即下降, 主要原因是

- A. 麻药注入过慢
- B. 麻醉平面过低

- C. 交感神经抑制
- D. 缺氧
- E. 穿刺部位出血

67. 男性, 55 岁, 火灾事故中, 大面积烧伤后 1 天转来, 约占全身 35% 的面积为大小水疱, 血压偏低。此时患者的主要病理生理改变是

- A. 休克
- B. 心衰竭
- C. 肾衰竭
- D. 肝衰竭
- E. 感染

68. 男性, 56 岁, 损伤性血胸入院 4 小时, 患者呼吸困难, 血压低, 行闭式胸膜腔引流已 3 小时, 每小时引出血液均在 200ml 以上, 目前胸膜腔内

- A. 继续出血
- B. 血液已凝固
- C. 血液已机化
- D. 出血完全停止
- E. 出血基本停止

69. 女性, 45 岁, 5 年来时常便血, 量少, 或滴出, 或附在粪便表面, 无痛, 经检查, 诊为内痔, 其扩大曲张的血管主要是

- A. 直肠上静脉丛
- B. 直肠下静脉丛
- C. 直肠上下静脉丛
- D. 直肠上动脉
- E. 直肠下动脉

70. 男性, 57 岁, 门静脉高压症多年, 今日入院, 患者家属问及患者的主要病理改变, 护士解释的重点应是

- A. 肝大、脾大、腹水
- B. 脾大、腹水、门腔静脉交通支扩张
- C. 腹水、门腔静脉交通支扩张、黄疸

- D. 门腔静脉交通支扩张、黄疸、肝大
E. 黄疸、肝大、脾大
71. 男性，60岁，突发左下肢动脉栓塞，该栓子最可能来源于
A. 大动脉
B. 大静脉
C. 心脏
D. 小动脉
E. 小静脉
72. 男性，48岁，误服敌敌畏约100ml，出现呼吸困难，面肌细颤的原因是
A. 肾上腺素过多
B. 胆碱酯酶活性降低
C. 胰淀粉酶不足
D. 乙酰胆碱失活性
E. 去甲肾上腺素过多
73. 女性，25岁，天寒燃木炭取暖，出现呕吐，昏迷，经医生诊断为急性一氧化碳中毒，其发病机制是
A. 细胞中毒
B. 呼吸中枢受抑制
C. 血红蛋白不能携氧
D. 气道通气受阻
E. 大脑受抑制
74. 男性，65岁，突发急性广泛心肌梗死，咳大量粉红色泡沫痰，其咳痰病因是
A. 急性气胸
B. 急性肺气肿
C. 肺囊肿
D. 急性肺水肿
E. 肺不张
75. 男性，24岁，患1型糖尿病已3年，近日发生恶心呕吐，头痛，嗜睡，呼吸深快，呼气有烂苹果味，其原因是

- A. 酮症酸中毒
B. 呼吸衰竭
C. 短暂脑缺血
D. 低血糖
E. 脑血栓形成
76. 小儿，3个月，体重5kg，每日所需8%糖牛乳的量
A. 450ml
B. 550ml
C. 650ml
D. 750ml
E. 850ml
77. 患儿，8岁，2周前患上呼吸道感染，2天来颜面水肿，尿少，尿为浓茶色。诊断为急性肾小球肾炎。患儿感染的致病菌最可能是
A. 乙型β溶血性链球菌
B. 甲型链球菌
C. 草绿色链球菌
D. 肺炎链球菌
E. 粪链球菌

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(78~80题共用题干)

患儿，8岁，被开水烫伤后4小时送至急诊，患儿躯干前侧包括会阴部均为薄壁的大水疱，疼痛剧烈，双下肢红斑性改变

78. 该患儿二度烫伤面积是
A. 9%
B. 14%
C. 18%

- D. 25%
- E. 36%

79. 该患儿躯干前侧烫伤的深度达到

- A. 表皮
- B. 真皮浅层
- C. 真皮深层
- D. 皮下层
- E. 肌肉

80. 该患儿双下肢损伤的深度达到

- A. 表皮
- B. 真皮浅层
- C. 真皮深层
- D. 皮下层
- E. 肌肉

(81~83 题共用题干)

男性, 38 岁, 晨起及半夜有上腹痛, 进食后缓解已经 2 个月。既往 2 年每到秋冬季均有发作, 经胃镜检查确诊为十二指肠溃疡

81. 本病的主要因素是

- A. 促胃液素
- B. 胃酸
- C. 胃蛋白酶
- D. 胆汁反流
- E. 精神紧张

82. 本病的重要致病菌是

- A. 溶血链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 厌氧菌

83. 治疗本病采用三(四)联疗法, 主要目的是

- A. 减少胃痉挛

- B. 保护溃疡面
- C. 减少胃酸分泌
- D. 消灭幽门螺杆菌
- E. 促进胃蠕动

(84~85 题共用题干)

女性, 45 岁, G1P1, 因月经过多继发贫血 2 年, 妇科检查: 宫颈轻度糜烂, 子宫如孕 3 个月大小, 凹凸不平, 双附件正常

84. 最可能的诊断是

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 子宫肌瘤
- C. 妊娠
- D. 子宫颈癌
- E. 子宫内膜癌

85. 月经过多的原因是

- A. 营养不良
- B. 自主神经紊乱
- C. 子宫内膜面积增大
- D. 激素分泌紊乱
- E. 造血功能障碍

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(86~88 题共用备选答案)

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 5~6 个月
- D. 7~9 个月
- E. 10~12 个月

86. 添加鱼肝油的月龄是

87. 添加蛋黄的月龄是

88. 添加肉末的月龄是

(89~90 题共用备选答案)

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 内旋转
- E. 复位

89. 能使枕额径变为枕下前凶径的动作是
90. 使胎头的矢状缝和中骨盆及出口前后径一致的动作是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 优锁
 - B. 0.02%呋喃西林
 - C. 3%氯化钠
 - D. 2%硝酸银
 - E. 10%鱼石脂软膏
91. 炎症早期, 消炎退肿选用
92. 肉芽水肿创面选用
93. 防腐除臭, 溶解坏死组织选用
94. 感染创面湿敷选用

(95~98 题共用备选答案)

- A. 血糖 11.1 mmol/L
 - B. 尿蛋白 >3.5g/天
 - C. 尿沉渣大量脓细胞
 - D. 尿沉渣大量蜡样管型
 - E. 全血细胞减少
95. 肾功能衰竭可致
96. 骨髓造血功能受损可致
97. 肾小球滤过膜通透性增加可致
98. 尿路上行感染可致

(99~100 题共用备选答案)

- A. 10%葡萄糖酸钙
 - B. 氨茶碱
 - C. 10%氯化钾
 - D. 50%葡萄糖
 - E. 维生素 C
99. 禁忌静脉推注的药物是
100. 病人出现荨麻疹时可静脉推注的药物是

相关专业知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 代谢性酸中毒时, 患者的主要化验改变是
- A. 血 pH↓, 二氧化碳结合力↑
 - B. 血 pH↓, 二氧化碳结合力↓
 - C. 血 pH↑, 二氧化碳结合力↑
 - D. 血 pH↑, 二氧化碳结合力↓
 - E. 血 pH↓, 二氧化碳结合力无变化
2. 重度感染或严重创伤时能量需求可增加

- A. 10%~20%
 - B. 25%~35%
 - C. 40%~50%
 - D. 60%~80%
 - E. 100%~200%
3. 中心静脉压的正常值是
- A. 2~3cmH₂O
 - B. 3~4cmH₂O
 - C. 4~5cmH₂O
 - D. 5~6cmH₂O
 - E. 6~12cmH₂O

4. 弥散性血管内凝血 (DIC)，早期及时给患者应用的药物是
 - A. 止血芳酸
 - B. 6-氨基己酸
 - C. 鱼精蛋白
 - D. 肝素
 - E. 维生素 K
5. 心肺复苏时，人工循环与人工呼吸次数比正确的是
 - A. 30 : 2
 - B. 15 : 3
 - C. 15 : 4
 - D. 15 : 5
 - E. 15 : 6
6. 下列检查属于血液系统监护的是
 - A. 血尿素氮
 - B. 血肌酐
 - C. 血小板
 - D. 血糖
 - E. 血氨
7. 金黄色葡萄球菌感染的脓液特点是
 - A. 稠厚、无味
 - B. 稠厚、恶臭
 - C. 稀薄、无味
 - D. 稀薄、恶臭
 - E. 稀薄、甜腥臭味
8. 国际上通用的肿瘤“TNM”分期法，其中的“N”表示
 - A. 原发肿瘤
 - B. 骨转移
 - C. 肝转移
 - D. 肺转移
 - E. 区域淋巴结转移
9. 恶性肿瘤术后第 1 年，随访的时间是
 - A. 每半个月 1 次
 - B. 每 1~2 个月 1 次
 - C. 每 3 个月 1 次
 - D. 每 4~5 个月 1 次
 - E. 每 6 个月 1 次
10. 肾移植，术前最后一次血液透析距手术时间不应超过
 - A. 24 小时
 - B. 36 小时
 - C. 48 小时
 - D. 72 小时
 - E. 1 周
11. 乳房检查的最佳时期是
 - A. 月经前 7~10 天
 - B. 月经前 3~5 天
 - C. 月经期
 - D. 月经后 3~5 天
 - E. 月经后 7~10 天
12. 门静脉高压症患者，脾大、脾功能亢进，其外周血象改变是
 - A. 白细胞↑血小板↑
 - B. 白细胞↑血小板↓
 - C. 白细胞↓血小板↑
 - D. 血小板↓白细胞↓
 - E. 白细胞↑血小板无改变
13. 用于胆道疾病检查的首选方法是
 - A. B 超
 - B. CT
 - C. MRI (磁共振)
 - D. PTC (经皮肝穿胆道造影)
 - E. ERCP (逆行胆胰管造影)
14. 急腹症患者，腹透见膈下游离气体，提示腹内的病变是
 - A. 炎症性

- B. 梗阻性
- C. 出血性
- D. 穿孔性
- E. 绞窄性

15. 脓尿是指每高倍视野含有脓细胞不少于

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 5 个

16. 鉴别肱骨髁上骨折与肘关节脱位，主要检查

- A. 有无肿胀
- B. 有无畸形
- C. 肘后三点关系是否正常
- D. 有无肱动静脉损伤
- E. 有无桡神经损伤

17. 急性血源性骨髓炎 X 线检查出现异常，最少要在发病后

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周

18. 产后子宫颈内口关闭的时间是

- A. 12 小时内
- B. 1~3 天
- C. 3~6 天
- D. 7~10 天
- E. 11~13 天

19. 属于正常胎位的是

- A. 肩左前
- B. 骶右后
- C. 骶左前

- D. 枕左前
- E. 枕右后

20. 重度妊娠高血压综合征 24 小时尿蛋白定量超过

- A. 0.5g
- B. 1.5g
- C. 3g
- D. 3.5g
- E. 5g

21. 预测排卵的方法中无损伤、最简单、花费最少的是

- A. 基础体温测定
- B. 超声波检查
- C. 激素的测定
- D. 刮取子宫内膜检查
- E. 宫颈黏液检查

22. 早期宫颈癌患者行妇科检查时最有可能出现

- A. 下腹部压痛
- B. 肌紧张
- C. 阴道排液
- D. 宫颈举痛
- E. 接触性出血

23. 阴道灌洗适用于

- A. 产后
- B. 长期卧床患者
- C. 全子宫切除术前
- D. 会阴有伤口者
- E. 妊娠期出血者

24. 嗜酸粒细胞增多应考虑是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 急性白血病
- C. 支气管哮喘
- D. 活动性肺结核

E. 军团菌肺炎

25. 红细胞绝对增多的心脏病是

- A. 高血压心脏病
- B. 贫血性心脏病
- C. 急性心肌梗死
- D. 肺源性心脏病
- E. 风湿性心脏病

26. 尿液有烂苹果样气味见于

- A. 服维生素 B₂ 后
- B. 尿放置过久
- C. 糖尿病酮症
- D. 多吃苹果后
- E. 慢性膀胱炎

27. 尿液呈酱油色见于

- A. 输液过多
- B. 输异型血溶血
- C. 高热尿浓缩
- D. 尿中胆红素增加
- E. 尿道感染出血

28. 镜下血尿指每高倍视野中红细胞至少

- A. 3 个
- B. 4 个
- C. 5 个
- D. 6 个
- E. 7 个

29. 尿内出现多量管型提示

- A. 膀胱炎
- B. 前列腺炎
- C. 输尿管炎
- D. 肾盂肾炎
- E. 肾炎

30. 尿中含有大量胆红素提示是

- A. 胃炎

B. 胃溃疡

C. 肝炎

D. 胰腺炎

E. 胆囊炎

31. 对肾功能初步评价的检查是

- A. 血尿素氮测定
- B. 血肌酐测定
- C. 内生肌酐清除率
- D. 酚红试验
- E. 红细胞排泄率

32. 大便呈柏油样见于

- A. 痢疾
- B. 胃溃疡伴上消化道出血
- C. 直肠癌
- D. 霍乱
- E. 胰腺炎

33. 血淀粉酶显著增高见于

- A. 胰腺炎
- B. 溃疡病
- C. 急性肝炎
- D. 肝硬化
- E. 心肌炎

34. 血液总胆固醇增高见于

- A. 肺心病
- B. 风心病
- C. 冠心病
- D. 心肌炎
- E. 心包炎

35. X 线肺部检查见云絮状阴影是

- A. 胸膜炎
- B. 肺炎
- C. 肺气肿
- D. 肺癌

E. 肺囊肿

36. 咳大量粉红色泡沫痰应考虑是

- A. 急性左心衰竭
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 慢性右心衰
- D. 心包腔积液
- E. 胸腔积液

37. 引起急性心肌梗死的危险因素是

- A. 血胆红素增加
- B. 血清三酰甘油（甘油三酯）下降
- C. 血清胆固醇增加
- D. 高密度脂蛋白增高
- E. 低密度脂蛋白下降

38. 急性心肌梗死最早发生变化的酶是

- A. 谷丙转氨酶
- B. 磷酸肌酸激酶
- C. 淀粉酶
- D. 转肽酶
- E. 碱性磷酸酶

39. 确诊甲状腺功能亢进的化验是

- A. 三酰甘油增高
- B. 三碘甲状腺原氨酸增高
- C. β_1 微球蛋白增高
- D. 磷酸肌酸激酶减少
- E. 谷丙转氨酶减少

40. X 线检查手指关节间隙变窄或半脱位可确诊为

- A. 骨关节病
- B. 风湿性关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 急性风湿热

41. 足月新生儿生理性黄疸血清胆红素值最

高不超过

- A. $85.5\mu\text{mol/L}$ (5mg/dl)
- B. $171\mu\text{mol/L}$ (10mg/dl)
- C. $205\mu\text{mol/L}$ (12mg/dl)
- D. $256.5\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)
- E. $342\mu\text{mol/L}$ (20mg/dl)

42. 应在新生儿期接种的疫苗是

- A. 乙脑疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 麻疹减毒活疫苗
- D. 百、白、破混合制剂
- E. 脊髓灰质炎减毒疫苗

43. 人类维生素 D 的主要来源为

- A. 蛋黄中的维生素 D
- B. 牛奶中的维生素 D
- C. 动物肝脏中的维生素 D
- D. 植物食品中的维生素 D
- E. 皮肤中的 7-脱氢胆固醇

44. 中度脱水时失水占体重的百分比是

- A. $<5\%$
- B. $5\% \sim 10\%$
- C. $11\% \sim 15\%$
- D. $16\% \sim 20\%$
- E. $21\% \sim 25\%$

45. 小儿易出现骨髓外造血的原因是

- A. 缺乏红骨髓
- B. 骨髓造血功能尚不成熟
- C. 骨髓造血器官功能活跃
- D. 缺乏黄骨髓，造血代偿潜力很低
- E. 红骨髓过多，造血代偿潜力过高

46. 呼吸、心跳骤停的婴幼儿心脏按压的频率为

- A. 80/min