

2011年国家执业医师资格


(医学综合笔试部分)

临床执业医师 模拟试卷

本书专家组 编

全真实战模拟
紧扣考试大纲
强化题型训练

三套精选试题
综合考查要点
增强应考能力



210 - 1

试卷标识码: ****

将此标识码填涂在答题卡指定位置

2011 年医师资格考试模拟试卷 (一)

(医学综合笔试部分)

报考类别: 临床执业医师 第一单元

考试日期: 2011 年 9 月 17 日

考试时间: 9:00 ~ 11:30

考生姓名: _____

准考证号: _____

考 场 号: _____

中国协和医科大学出版社

答 题 须 知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页码所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前，请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元是否完整无误。
3. 在开始答题前，请考生检查试卷有无缺损、重印、错印，发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点，必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂，如需要作修改，应用橡皮将原涂黑的地方擦干净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写，考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷，请注意保持答题卡平整、干净。
7. 开始考试后半小时内，考生不得交卷出场。
8. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后，经监考员允许，考生方可退场。
10. 考生如违反“考场指令”和本“答题须知”，其一切后果由考生本人承担。

A1 型题 (1 ~ 83 题)

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 不宜应用糖皮质激素治疗的肾脏疾病是
 - A. 急性过敏性间质性肾炎
 - B. 狼疮性肾炎
 - C. 急性肾炎
 - D. 急进性肾炎
 - E. 微小病变肾病
2. 与单纯下肢静脉曲张发病相关的因素不包括
 - A. 遗传因素
 - B. 重体力劳动
 - C. 长期站立
 - D. 妊娠
 - E. 慢性腹泻
3. 在碱性尿液中弱碱性药物
 - A. 排泄速度不变
 - B. 解离的多，再吸收多，排泄快
 - C. 解离的多，再吸收少，排泄快
 - D. 解离的少，再吸收多，排泄慢
 - E. 解离的少，再吸收少，排泄快
4. DNA 的一级结构是指
 - A. 多聚 A 结构
 - B. 核小体结构
 - C. 双螺旋结构
 - D. 三叶草结构
 - E. 核苷酸排列顺序
5. “潜意识”理论属于的心理学派是
 - A. 行为主义
 - B. 精神分析
 - C. 认知治疗
 - D. 人本主义
 - E. 完形主义
6. 男性患者后尿道损伤，针对尿道不全撕裂最常采用的早期处理是
 - A. 尿外渗引流术
 - B. 耻骨上高位膀胱造瘘术
 - C. 留置导尿
 - D. 经会阴尿道修补术
 - E. 尿道端口吻合术
7. 局部麻醉药的作用机制是
 - A. 阻断 Na^+ 通道
 - B. 促进 K^+ 通道
 - C. 抗胆碱作用
 - D. 阻断 Ca^{2+} 通道
 - E. 抗肾上腺素作用
8. 在噪声对听觉系统损伤的发病过程中，最具特征的表现是
 - A. 早期高频段听力下降
 - B. 早期属功能性听觉敏感性下降
 - C. 晚期语频段听力下降
 - D. 听阈升高在后期不能恢复到正常水平
 - E. 听力下降的发展呈渐进性，先快后慢
9. 有机磷农药中毒导致肺水肿的主要用

药是

- A. 毛花苷 C (西地兰)
- B. 阿托品
- C. 解磷定
- D. 地西洋 (安定)
- E. 地塞米松

10. 拟诊支气管扩张患者首选的检查时

- A. 支气管动脉造影
- B. 支气管镜
- C. 胸部 MRI
- D. 支气管造影
- E. 胸部高分辨率 CT

11. 神经末梢释放神经递质的方式是

- A. 单纯扩散
- B. 经通道易化扩散
- C. 经载体易化扩散
- D. 主动转运
- E. 胞吐

12. 心肌有效不应期较长的主要作用为

- A. 使心肌得到充分的休息
- B. 使心肌产生“全或无”式收缩
- C. 避免心肌发生强直收缩
- D. 便于窦房结控制心节律
- E. 使心房和心室交替收缩

13. 肝素抗凝作用的主要机制是

- A. 直接灭活凝血因子
- B. 激活血浆中的 AT - III
- C. 与血浆中 Ca^{2+} 结合
- D. 激活纤溶酶原活性
- E. 抑制肝脏合成凝血因子

14. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎电镜下可见肾小球毛细血管基底膜的变化是

- A. 内皮细胞下见驼峰状致密沉积物

B. 基底膜和上皮细胞间见驼峰状致密沉积物

C. 内侧大团块状致密沉积物

D. 外侧大团块状致密沉积物

E. 基底膜内粗大带状致密沉积物

15. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎时, 增生的细胞主要是

- A. 肾小球脏层细胞
- B. 肾小球壁层细胞
- C. 肾小球脏层细胞和系膜细胞
- D. 肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞
- E. 肾小球系膜细胞和基质

16. 医师在执业活动中不属于应当履行的义务是

- A. 宣传普及卫生保健知识
- B. 尊重患者隐私权
- C. 人格尊严、人身安全不受侵犯
- D. 努力钻研业务, 及时更新知识
- E. 爱岗敬业, 努力工作

17. 不应使用糖皮质激素的疾病是

- A. 水痘
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 血小板减少症
- D. 过敏性休克
- E. 中毒性肺炎

18. II 型呼吸衰竭最常见的病因是

- A. 肺纤维化
- B. 肺结核
- C. 支气管扩张
- D. 阻塞性肺炎
- E. 慢性阻塞性肺疾病

19. 急性肾衰竭少尿期最常见的酸碱失衡是

- A. 代谢性酸中毒
B. 呼吸性酸中毒
C. 代谢性碱中毒
D. 呼吸性碱中毒
E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
20. 抢救室性心动过速发作伴血流动力学不稳定的患者应首选
A. 静脉滴注普罗帕酮
B. 刺激迷走神经
C. 静脉滴注维拉帕米
D. 静脉滴注索他洛尔
E. 直流电复律
21. 关于糖尿病的描述, 正确的是
A. 2 型糖尿病的主要死因是酮症酸中毒
B. 1 型糖尿病多见于 40 岁以上
C. 代谢综合征是 2 型糖尿病的危险因素
D. 1 型糖尿病常以慢性并发症为首发症状
E. 中枢神经病变是糖尿病最常见的并发症
22. 《希波克拉底誓言》中提出了
A. 不伤害原则、为患者利益原则和保密原则
B. 不伤害原则、为患者利益原则和尊重原则
C. 尊重原则、为群众利益原则和保密原则
D. 尊重原则、为患者利益原则和保密原则
E. 不伤害原则、尊重原则和保密原则
23. 根据《临床输血技术规定》应设置独立输血科(血库)的医院是
A. 三级医院
B. 二级以上医院
C. 二级以下医院
D. 二级医院
E. 一级以上医院
24. 从事人体器官移植的医务人员, 应该允许
A. 从事有关人体器官移植的广告宣传
B. 参与捐赠器官的分配
C. 参与死后捐赠器官患者的抢救
D. 参与死后捐赠器官患者的死亡判定
E. 接受提供应用于器官移植的器械、药品公司的馈赠
25. 体重指数的计算公式是
A. $[\text{身高 (m)} / \text{体重 (kg)}]^2$
B. $\text{身高 (m)} / \text{体重 (kg)}$
C. $\text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$
D. $\text{体重 (kg)} / \text{身高 (m)}$
E. $[\text{体重 (kg)}]^2 / \text{身高 (m)}$
26. 个体处于应激状态时, 表现出心率加快、血压增高、呼吸加速、血糖升高和肌张力增强, 这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是
A. 下丘脑-垂体-甲状腺轴
B. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
C. 交感-肾上腺髓质轴
D. 下丘脑-垂体-性腺轴
E. 下丘脑-神经垂体轴系
27. 物质滥用的耐受性是指
A. 机体产生的一种心理上的适应性改变
B. 反复使用精神活性物质导致的一组症状
C. 长期使用精神活性物质造成的生理

改变

- D. 明知有害仍持续使用精神活性物质
- E. 物质使用者必须增加剂量方能达到原先的效果

28. 关于尿素生成的描述, 正确的是

- A. 在脑中生成
- B. 通过鸟氨酸循环途径生成
- C. 通过三羧酸循环途径生成
- D. 生成反应由 CTP 供能
- E. 关键酶是精氨酸酶

29. 下列属于丙类传染病的疾病是

- A. 百日咳
- B. 猩红热
- C. 包虫病
- D. 登革热
- E. 狂犬病

30. 道德的决定因素是

- A. 上层建筑
- B. 经济基础
- C. 教育程度
- D. 个人信念
- E. 文化传统

31. 心脏压塞的临床表现除心音遥远微弱外还有

- A. 中心静脉压正常, 动脉压低, 脉压小
- B. 中心静脉压低, 动脉压低, 脉压小
- C. 中心静脉压低, 动脉压低, 脉压大
- D. 中心静脉压高, 动脉压低, 脉压大
- E. 中心静脉压高, 动脉压低, 脉压小

32. 二尖瓣狭窄时, 体循环栓塞最常发生于

- A. 脾动脉
- B. 脑动脉

C. 肾动脉

D. 下肢动脉

E. 肠系膜动脉

33. 心室肌有效不应期的长短主要取决于

- A. 动作电位 0 期去极的速度
- B. 动作电位 1 期的长短
- C. 动作电位 2 期的长短
- D. 动作电位 3 期的长短
- E. 阈电位水平的高低

34. 对以医疗事故为由, 扰乱医疗机构正常医疗秩序者, 司法机关应当

- A. 给予治安管理处罚或追究刑事责任
- B. 给予治安管理处罚或追究民事责任
- C. 给予治安管理处罚或追究行政责任
- D. 说服教育, 必要时给予治安管理处罚
- E. 与医疗机构进行协商调解

35. 对于下列行为, 不应给予“没收违法所得, 并处 10 万元以下罚款”的行政处罚的是

- A. 非法采集血液的
- B. 医疗机构将不符合国家规定标准的血液用于患者的
- C. 医疗机构出售无偿献血的血液的
- D. 血站出售无偿献血的血液的
- E. 非法组织他人出卖血液的

36. 接受婚前医学检查的人员对检查结果持有异议的

- A. 应当申请医学技术鉴定
- B. 可以申请医学技术鉴定
- C. 可以申请复议
- D. 可以提起诉讼
- E. 可以重新接受婚前医学检查

37. 胃食管反流病患者的典型症状是
- A. 餐后上腹胀
 - B. 上腹部钝痛
 - C. 吞咽困难
 - D. 嗝气
 - E. 反酸、胃灼热
38. 胃酸分泌增多较明显的疾病是
- A. 慢性浅表性胃炎
 - B. 十二指肠溃疡
 - C. 慢性萎缩性胃炎
 - D. 反流性食管炎
 - E. 胃溃疡
39. 增生型肠结核患者不经常出现的临床表现是
- A. 腹泻
 - B. 便秘
 - C. 腹痛
 - D. 腹部包块
 - E. 发热
40. 有关急性心肌梗死心肌损伤标记物的描述, 不正确的是
- A. 肌红蛋白起病后 2h 内升高, 12h 内达到高峰, 24 ~ 48h 恢复正常
 - B. 肌钙蛋白起病后 6h 内升高, 5 ~ 6d 恢复正常
 - C. CK - MB 起病后 4h 内增高, 16 ~ 24h 达高峰, 3 ~ 4d 恢复正常
 - D. AST 在起病 6 ~ 10h 开始升高, 3 ~ 6d 恢复正常
 - E. LDH 在起病 6 ~ 10h 后升高, 1 ~ 2 周内恢复正常
41. 关于上消化道出血的定义, 正确的是
- A. 贲门以上部位出血
 - B. 幽门以上部位出血
 - C. 空肠以上部位出血
 - D. 十二指肠悬韧带以上部位出血
 - E. 十二指肠乳头水平以上部位出血
42. 男, 25 岁, 发热、咳嗽、咳痰 3 天, 胸部 X 线片示右下肺炎, 右侧少量胸腔积液, 经二代头孢菌素抗感染治疗后症状改善不明显, 同时出现右侧胸腔积液增多, 此时需进一步紧急的措施是
- A. 胸腔穿刺
 - B. 更换广谱抗生素
 - C. 加用抗生素治疗
 - D. CT 肺动脉造影
 - E. 支气管镜检查
43. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的主要临床表现是
- A. 肢体对称性麻木
 - B. 肢体对称性无力
 - C. 发作性肢体无力
 - D. 发作性肢体麻木
 - E. 双侧眼外肌瘫痪
44. 对诊断原发性肝细胞癌最有意义的血清学指标是
- A. GGT
 - B. ALP
 - C. CA125
 - D. AFP
 - E. CEA
45. 急性肾衰竭选择血液净化疗法时, 血钾 (mmol/L) 至少应达到
- A. 5.0
 - B. 5.5
 - C. 6.0
 - D. 6.5
 - E. 7.0

46. 应激性溃疡出血时错误的治疗是

- A. 使用 H_2 受体阻断剂
- B. 使用胃黏膜保护剂
- C. 经胃管灌注止血药物
- D. 胃镜下止血治疗
- E. 经胃壁切开电灼止血

47. 动脉瘤最典型的临床表现是

- A. 压迫症状
- B. 搏动性肿块
- C. 肢体远端缺血
- D. 破裂出血
- E. 体积增大伴疼痛、感染

48. 急性胃炎的临床表现不包括

- A. 黄疸
- B. 消化道出血
- C. 呕吐
- D. 上腹痛
- E. 恶心

49. 急性重症胰腺炎的临床表现一般不包括

- A. 休克
- B. 呼吸衰竭
- C. 发热
- D. 腹泻
- E. 消化道出血

50. 上消化道大出血最常见于

- A. 胃十二指肠溃疡
- B. 胃癌
- C. 胆道出血
- D. 出血性胃炎
- E. 食管胃底静脉曲张

51. 肝硬化食管静脉曲张大出血后, 可能出现的表现不包括

- A. 血尿素氮增高
- B. 脾缩小
- C. 腹腔积液减少
- D. 意识障碍
- E. 少尿

52. 下列各组织疾病均为乙类传染病的是

- A. 流行性感冒、SARS
- B. 黑热病、肺结核
- C. 流行性出血热、疟疾
- D. 鼠疫、狂犬病
- E. 麻风病、伤寒

53. 心电图上 I 和 AVL 导联出现急性心肌梗死的特异性改变, 其梗死部位是心脏的

- A. 下壁
- B. 前壁
- C. 后壁
- D. 高侧壁
- E. 前间壁

54. 属于特异性感染的是

- A. 疔
- B. 痈
- C. 丹毒
- D. 急性化脓性腱鞘炎
- E. 气性坏疽

55. 下列物品中毒抢救时, 禁忌洗胃的是

- A. 有机磷农药
- B. 浓硫酸
- C. 杀鼠剂
- D. 安眠药
- E. 阿托品

56. 属于“Ⅰ”类切口的手术是

- A. 小肠切除吻合术

- B. 化脓性阑尾炎手术
C. 腹腔镜疝修补术
D. 结肠脾区癌引起的急症肠梗阻手术
E. 胃后壁穿孔手术
57. 老年人继发性肾病综合征常见的疾病是
A. 乙肝病毒相关性肾炎
B. 狼疮性紫癜肾炎
C. 过敏性紫癜肾炎
D. 轻链沉积病
E. 糖尿病肾病
58. 肾癌的主要治疗方法是
A. 放射治疗
B. 化学治疗
C. 根治性肾切除
D. 肾部分切除术
E. 单纯性肾切除术
59. 医师的下列行为不属于违法违规的是
A. 违反技术操作规范
B. 延误救治
C. 拒绝以其他医院的检验结果为依据出具诊断证明书
D. 未经患者同意实施实验性临床医疗
E. 泄漏患者隐私
60. 适度的应激对于大多数人来说可以
A. 引起心理障碍
B. 促进个体适应
C. 导致疾病
D. 加重疾病
E. 引起生理障碍
61. 低钾血症一般不表现为
A. 碱中毒
B. 碱性尿
C. 心电图出现 U 波
D. 恶心呕吐
E. 腱反射减弱
62. 如果肠系膜上动脉起始部发生血栓栓塞，造成血供障碍的所有肠段为
A. 十二指肠、空肠、回肠
B. 全部小肠和全部结肠
C. 全部小肠、盲肠和升结肠
D. 升结肠和横结肠
E. 降结肠、乙状结肠和直肠
63. 腹腔镜胆囊切除优于开腹胆囊手术的原因是
A. 住院时间短
B. 术后疼痛轻
C. 可早期恢复正常活动
D. 腹壁创伤的并发症少
E. 胆道损伤的风险性小
64. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者，早期呼吸困难常表现为
A. 端坐呼吸
B. 劳力性呼吸困难
C. 夜间阵发性呼吸困难
D. 心源性哮喘
E. 急性肺水肿
65. 下列情况可诱发黏液性水肿昏迷，除了
A. 替代治疗中断
B. 使用镇静剂
C. 寒冷
D. 手术
E. 饱餐
66. 有关肺结核发生发展的描述，不正确的是
A. 原发性肺结核主要见于儿童和边远山区初次入城的成人

- B. 血行播散型肺结核仅来源于有肺内和肺外结核的成人
C. 浸润型肺结核主要为内源性感染所致
D. 肺结核纤维组织增生和收缩牵引亦可引起支扩
E. 结核球是干酪坏死灶被纤维包裹，干酪物干涸浓缩形成
67. 血中补体水平下降一般不见于
A. 急性肾小管坏死
B. 膜性肾病
C. 系膜增生性肾小球肾炎
D. 狼疮肾炎
E. 急性肾小球肾炎
68. 高血压伴低血钾应首先考虑
A. 皮质醇增多症
B. 原发性醛固酮增多症
C. 嗜铬细胞瘤
D. 肾实质性高血压
E. 肾动脉狭窄
69. 关于急性肾炎的治疗，正确的是
A. 一般有自愈倾向可不治疗，如病灶细菌培养阳性，应积极给予抗生素治疗
B. 常规限制蛋白质摄入量
C. 常规应用糖皮质激素及细胞毒药物治疗
D. 如出现肾功能不全需长期透析治疗
E. 如有扁桃体炎，马上给予手术摘除
70. 确诊慢性阻塞性肺疾病（COPD）最主要的依据是
A. 胸部 X 线片
B. 血气分析
C. 肺功能
D. 典型的慢性咳嗽、咳痰症状
E. 胸部体检
71. 原始骨痂形成一般需要
A. 1 周左右
B. 2~3 周
C. 4~8 周
D. 9~10 周
E. 11~12 周
72. 脊柱骨折搬运时禁用的方法是
A. 平托将伤员移至木板
B. 平托将伤员移至担架
C. 多人用手同时平托搬运
D. 一人抬头一人抬足搬运
E. 将患者躯干成一整体滚动
73. 甲胎蛋白（AFP）升高的临床意义是
A. AFP > 400 μg/L 时可确诊肝细胞癌
B. 肝转移癌患者 AFP 常显著增高
C. 手术后 AFP 又升高提示肝癌复发
D. 消化道其他肿瘤 AFP 不会升高
E. ALT 和 AFP 同时增高更支持肝癌诊断
74. 肛裂患者肛门疼痛的特点正确的是
A. 疼痛多为隐痛
B. 排便前出现括约肌挛缩痛
C. 排便后出现肛门隐痛可延续到数小时
D. 排便时与排便后疼痛之间有间歇期
E. 疼痛无规律
75. 糖皮质激素治疗慢性特发性血小板减少性紫癜错误的是
A. 一般为首选治疗
B. 一般选用泼尼松
C. 近期有效率约为 80% 左右

- D. 复发时再应用常无效
E. 治疗缓解后一般小剂量维持 3 ~ 6 个月
76. 重度贫血的血红蛋白浓度是
A. <30g/L
B. 30 ~ 50g/L
C. 60 ~ 89g/L
D. 90 ~ 100g/L
E. >100g/L
77. 弥漫性膜性增生性肾小球肾炎时, 增生前细胞主要是
A. 肾小球脏层细胞和中性粒细胞
B. 肾小球壁层细胞和系膜细胞
C. 肾小球系膜细胞和基质
D. 肾小球毛细血管基底膜增厚和系膜细胞增生
E. 肾小球各种细胞均有较明显增生
78. “心力衰竭细胞”是指
A. 心力衰竭时某些形态特殊的心肌细胞
B. 硅沉着病时, 肺内吞噬硅尘的巨噬细胞
C. 肺褐色硬变时肺内含有含铁血黄素的细胞
D. 心力衰竭时肺内吞噬炭末的细胞
E. 心力衰竭时肺泡腔内的泡沫细胞
79. 下列抗精神病药物中易引起粒细胞减少或缺乏, 需定期检查血常规的是
A. 氟哌定醇
B. 奋乃静
C. 舒必利
D. 氯氮平
E. 利培酮
80. 兴奋传导速度最快的部位是
A. 窦房结
B. 心房肌
C. 房室交界
D. 心室肌
E. 浦肯野纤维
81. 肾病综合征引起水肿的主要机制是
A. 血浆晶体渗透压降低
B. 毛细血管滤过压升高
C. 毛细血管通透性增加
D. 血浆胶体渗透压降低
E. 肾小球滤过率下降
82. 医师执业应当履行的法定义务是
A. 参加专业培训
B. 进行医学诊查
C. 关心、爱护、尊重患者
D. 从事医学研究
E. 加入医师协会
83. 有心绞痛的主动脉瓣狭窄患者治疗首选
A. 口服血管紧张素转换酶抑制剂
B. 抗凝治疗
C. 暂不治疗, 继续随访
D. 主动脉瓣置换术
E. 主动脉瓣球囊成形术

A2 型题 (84 ~ 111 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

84. 女, 50 岁。间断上腹痛 8 个月, 进食后半小时为重, 近 2 个月来转为持续性上腹胀痛伴恶心, 持续大便隐血试验强阳性, 首先考虑的诊断是
- A. 应激性溃疡
 - B. 门静脉高压症
 - C. 慢性胃炎
 - D. 十二指肠溃疡
 - E. 胃癌
85. 女, 35 岁。身高 1.62cm, 体重 56kg, 近 3 个月来觉口渴、多饮, 查空腹血糖 6.8mmol/L, 无糖尿病家族史。为确定有无糖尿病最有意义的实验室检查是
- A. 餐后 2h 血糖
 - B. 血谷氨酸脱羧酶抗体
 - C. 口服葡萄糖耐量试验
 - D. 糖化血红蛋白
 - E. 24h 尿糖定量
86. 女, 40 岁。在心理治疗过程中, 医生让该患者打消顾虑, 想到什么就说什么, 按照原始的想法讲出来。这种方法属于
- A. 支持疗法
 - B. 认知疗法
 - C. 行为主义
 - D. 精神分析
 - E. 人本主义
87. 女, 39 岁。呕血、黑粪 1 天。既往肝炎病史 20 年。查体: P102 次/分, BP 90/60mmHg。贫血貌, 巩膜轻度黄染, 腹胀, 脾肋下 8cm, 移动性浊音 (+)。需要立即实施的措施不包括
- A. 输血、输液
 - B. 静脉滴注血管升压素
 - C. 腹腔穿刺
 - D. 应用止血药
 - E. 急诊胃镜检查止血
88. 女, 50 岁, 3 个月来发作性头晕, 头痛伴面色苍白, 心悸, 冷汗。其发作 3 次, 每次持续 20 分钟到 2 小时。发作时测 BP 180 ~ 210/110 ~ 130mmHg, 平素测血压正常。查体: BP 120/80mmHg, 体型偏瘦, 皮肤微潮。心率 90 次/分, 律齐, 四肢末梢凉。该患者首先考虑的诊断是
- A. 原发性高血压
 - B. 原发性醛固酮增多症
 - C. 嗜铬细胞瘤
 - D. 甲状腺功能亢进症
 - E. 围绝经期综合征
89. 男, 23 岁。因发热 3 周, 心悸、不能平卧 1 天就诊。3 周前体温 38℃, 伴流涕, 经治疗好转, 近 1 天出现心悸、气促, 不能平卧。既往体健。查体: BP110/70mmHg, 双肺底可闻及细小水泡音。心率 110 次/分, 心律齐, 未闻及杂音。血清肌钙蛋白水平升高。心电

图提示窦性心动过速。该患者最可能的诊断是

- A. 结核性心包炎
- B. 扩张型心肌病
- C. 肥厚型心肌病
- D. 风湿性心脏病
- E. 病毒性心肌炎

90. 女, 38 岁。车祸上腹撞击伤 4 小时, 呕血 1 次。查体: P105 次/分, R 24 次/分, BP 90/85mmHg, 上腹偏右 10cm × 3cm 横行皮肤淤斑, 全腹压痛(+), 肌紧张, 移动性浊音(+), 肝浊音界存在, 肠鸣音消失, 腹腔穿刺证实有大量不凝血。首选考虑的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 陈旧性宫外孕
- D. 肾破裂
- E. 肠破裂

91. 有恐怖分子在人员拥挤, 空气流通差的地铁站喷洒液态毒素, 造成人员经呼吸道吸入毒物, 引起急性中毒。对中毒人员现场急救的首要措施是

- A. 人工呼吸
- B. 给予急救药物
- C. 立即将患者转移脱离现场
- D. 保持正确体位
- E. 吸氧并给予中和剂雾化吸入

92. 女, 22 岁。心悸、胸闷 1 周。3 周前曾发热、咽痛。查体: BP 90/70mmHg, 叩诊心界不大, 心率 110 次/分, 心律齐, 心尖部可闻及 2/6 级收缩期杂音, 无心包摩擦音。血清肌钙蛋白水平增高。最可能的诊断是

- A. 急性心包炎

- B. 先天性心脏病
- C. 肥厚型梗阻性心肌病
- D. 病毒性心肌炎
- E. 扩张型心肌病

93. 女, 68 岁, 双下肢及颜面水肿 1 周, 尿蛋白 8.8g/24h, 肾活检病理诊断为膜性肾病, 对其主要治疗应是

- A. 泼尼松足量足疗程治疗
- B. 泼尼松联合环磷酰胺治疗
- C. 硫唑嘌呤治疗
- D. 静脉输注白蛋白
- E. 口服血管紧张素转换酶抑制剂

94. 男, 62 岁。8 天前爬楼时突发胸痛, 持续约 6 小时后缓解, 心电图示 II、III、aVF 可见病理性 Q 波, T 波倒置。下列检查结果对明确诊断意义最大的是

- A. 乳酸脱氢酶水平
- B. 天门冬氨酸氨基转移酶水平
- C. CK-MB 水平
- D. 肌酸激酶水平
- E. 肌钙蛋白水平

95. 男, 49 岁。近 1 年逐渐出现失眠、记忆力下降、话少、淡漠、反应迟钝, 有时出现不自主哭笑, 行走时步态不稳, 大小便失禁, 生活不能自理。觉得家里总丢东西。脑脊液无异常。CT 示轻度脑萎缩, 脑室扩大, 中线结构正常。首先要考虑的诊断是

- A. 阿尔茨海默病
- B. 颅脑损伤后痴呆
- C. 血管性痴呆
- D. 正常压力性脑积水
- E. Lewy 体痴呆

96. 女, 68 岁。高血压病史 20 年, 血压最

高 170/80mmHg。体检未见明显异常。化验：血常规、尿常规、肾功能、空腹血糖、血脂等均正常。心电图正常。该患者的收缩压控制目标值为

- A. 130 mmHg
- B. 120 mmHg
- C. 160 mmHg
- D. 150 mmHg
- E. 140 mmHg

97. 男, 15 岁, 贫血伴尿色黄 6 年, 未诊治。其弟弟有类似表现。查体: 巩膜轻度黄染, 脾肋下 2cm 检查: Hb70g/L, MCV70fl, MCHC29%, 网织红细胞 0.09, 尿胆红素(-), 尿胆原强阳性。下列检查对诊断最有帮助的是

- A. 酸溶血试验
- B. 自体溶血试验
- C. Coombs 试验
- D. 血红蛋白电泳
- E. 红细胞脆性试验

98. 男, 45 岁。低热、干咳 2 周, 经胸部 X 线片诊断为浸润性肺结核。既往有高血压病史 5 年, 通风病史 3 年, 口服药物治疗。在患者进行抗结核治疗时, 应避免使用的药物是

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 链霉素

99. 女, 20 岁, 主诉自初中毕业后, 越来越不能与陌生人接触, 近 1 年来发展为见到熟人与之说话也紧张, 且一说话就脸红。对于该患者, 首选的心理治疗方法是

- A. 生物反馈
- B. 系统脱敏
- C. 自由联想
- D. 催眠治疗
- E. 人本主义

100. 女, 40 岁。既往健康。5d 前无明确诱因出现发热、恶心、食欲缺乏伴尿黄, 明显乏力。实验室检查: ALT 740U/L, 总胆红素 (TBil) 58 μ mol/L。该患者诊断应考虑为

- A. 瘀胆型肝炎
- B. 急性黄疸型肝炎
- C. 急性重型肝炎
- D. 亚急性重型肝炎
- E. 急性无黄疸型肝炎

101. 女, 33 岁。胃溃疡穿孔非手术治疗 24 小时, 拟行手术治疗。1 年前因为溃疡穿孔行修补术。其手术过程中处理错误的是

- A. 从原切口进入
- B. 全身麻醉
- C. 胃大部切除术
- D. 甲硝唑及生理盐水灌洗腹腔至清洁
- E. 放置腹腔引流管

102. 女, 23 岁。2 个月来时有心悸、易出汗, 体重减轻约 3kg。查体: BP126/68mmHg, 中等体型, 皮肤微潮, 双手轻度细颤, 无突眼, 甲状腺 I 度大, 未闻及血管杂音, 心率 94 次/分, 律齐。为证实是否为甲状腺功能亢进症, 应检查

- A. 血 TSH、FT、FT4
- B. 甲状腺¹³¹I 摄取率
- C. 甲状腺核素扫描

- D. 抗甲状腺抗体
E. 甲状腺刺激免疫球蛋白
103. 女, 54 岁。肝硬化 20 年。腹部 B 型超声检查: 腹腔积液最大液深 18cm。化验检查: 血清钠 142mmol/L, 钾 6.3mmol/L, BUN23mmol/L, 血肌酐 224 μ mol/L。治疗措施错误的是
A. 10% 葡萄糖酸钙 20ml 缓慢静脉注射
B. 口服螺内酯
C. 输清蛋白
D. 控制液体入量
E. 葡萄糖加胰岛素静点
104. 男, 58 岁。因突发胸痛, 以急性心肌梗死收入院。查体: 平卧位, BP120/80mmHg, 双肺底可闻及少量湿啰音。该患者的心功能分级为
A. I 级 (NYHA 分级)
B. II 级 (NYHA 分级)
C. III 级 (NYHA 分级)
D. II 级 (Killip 分级)
E. III 级 (Killip 分级)
105. 男, 30 岁, 反复黏液脓血便 3 年, 加重 2 个月、抗生素治疗无效。肠镜显示较多糜烂及浅表小溃疡, 最可能诊断的是
A. 溃疡性结肠炎
B. 克罗恩病
C. 细菌性痢疾
D. 阿米巴痢疾
E. 肠结核
106. 女, 26 岁。右下腹痛, 腹泻 3 个月, 伴低热, 结肠镜检查在回盲部见环形溃疡。X 线钡剂结肠造影可见回盲部“跳跃征”。最可能诊断的是
A. 溃疡性结肠炎
B. 肠淋巴瘤
C. 肠结核
D. 克罗恩病
E. 阿米巴肠病
107. 男, 30 岁。上腹痛 4 年, 加重 5 天, 4 小时前呕血 200ml, 伴心慌、乏力。查体: P110 次/分, BP 90/60mmHg, 贫血貌。错误的处理方式是
A. 急诊胃镜
B. 禁食
C. 静脉注射奥美拉唑
D. 口服凝血酶
E. 静脉注射生长抑素
108. 男, 65 岁。因咳嗽、咳痰、伴发热 2d 入院, 痰为脓臭痰, 下列与患者此次发病关系最密切的病史是
A. 1 周前接种流感疫苗
B. 2 周前下肢皮肤化脓性感染
C. 近期牙周炎发作
D. 长期大量吸烟
E. 反流性食管炎病史
109. 男, 42 岁。腹胀血便 1 个月。便呈黏液脓血样, 最有助于鉴别诊断的检查是
A. 便潜血试验
B. 腹部 CT
C. 腹部 B 型超声
D. 结肠镜
E. 血 CEA
110. 男, 60 岁。咳嗽、咳痰 20 余年, 近 1 周来感冒后病情加重, 伴憋气, 1 天来意识模糊。查体: 不能正确回答问题

- 题，颜面潮湿暗红，口唇发绀。双肺可闻及干湿性啰音。心率 102 次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音，肝肋下 2cm，质软，双下肢水肿（+），Babinski 征（±），为明确患者意识障碍的原因，此时应首先进行的检查是
- 头颅 CT
 - 血糖、电解质
 - 血气分析
 - 脑脊液穿刺
 - 血氨
111. 男，18 岁，运动员常规体检时心电图示心室率 50 次/分，P-R 间期 0.21s，P-R 间期及 R-R 间期恒定不变，QRS 波群形态和时限正常。最可能的诊断为
- 二度 II 型房室传导阻滞
 - 三度房室传导阻滞
 - 心房颤动伴差异性传导
 - 一度房室传导阻滞
 - 二度 I 型房室传导阻滞
112. 男，40 岁。10h 前搬重物时突发上胸部疼痛，呈撕裂样，并逐渐向下胸部和腹部延伸。高血压史 15 年。查体：T36.3° C，BP170/100mmHg（左上肢），BP140/75mmHg（右上肢）。心率 105 次/分，心律齐。腹平软，Murphy 征阴性，CK-MB 正常。心电图：正常。胸部 X 线片显示主动脉明显增宽。该患者胸痛最可能的病因是
- 急性心肌梗死
 - 变异型心绞痛
 - 主动脉夹层
 - 急性胆囊炎
 - 急性心包炎
113. 男，45 岁。低热、干咳 2 周，经胸部 X 线片诊断为浸润型肺结核。既往有高血压病史 5 年，痛风病史 3 年，口服药物治疗。在患者进行抗结核治疗时，应避免使用的药物是
- 异烟肼
 - 利福平
 - 乙胺丁醇
 - 吡嗪酰胺
 - 链霉素
114. 男，14 岁。因阵发性心悸 3 年，再次发作 2 小时入院。查体无异常发现。心电图示心率 180 次/分，节律规整，QRS 波群时限 0.11 秒，可见逆行 p 波，该患者最可能的诊断为
- 阵发性室上性心动过速
 - 阵发性室性心动过速
 - 窦性心动过速
 - 心房扑动
 - 非阵发性房室交界区心动过速
115. 男，18 岁。自觉胸闷、气促 10 天，活动后加重。查体：左侧呼吸音明显减弱。胸部 X 线片示左侧气胸，左肺压缩 40%，肋膈角可见小液平面。既往无类似病史。首选处理方法是
- 吸氧观察
 - 胸腔闭式引流
 - 胸腔镜探查
 - 腹腔镜探查
 - 开胸探查
116. 女，54 岁。肝硬化 20 年。腹部 B 型超声检查：腹腔积液最大液深 18cm，化验检查：血清钠 142mmol/L，钾 6.3mmol/L，BUN23mmol/L，血肌酐 224μmol/L。治疗措施错误的是