

# 傷寒類編自序

漢張仲景撰著傷寒。實爲後世醫家之祖。惟經歷魏晉。書多散佚。今所傳者。幸賴有王叔和之采錄耳。成氏無已。首爲論註。厥功甚偉。獨惜其雜入傷寒例一篇。蓋誤以爲出自叔和。而混同註釋。致使後之攻擊該例者。並攻叔和。甚且以攻擊叔和。而並攻及傷寒之舊論。是何誕妄之甚也。仲景原序本謂撰用素問九卷。八十一難。今按素問熱論篇云。熱病者皆傷寒之類。又云人之傷於寒也。則爲病熱。又云凡病傷寒而成溫者。先夏至日爲病溫。後夏至日爲病暑。難經又云傷寒有五。有中風。有傷寒。有濕。溫有溫病。有熱病。是仲景本合論五者。以成書。而固非獨言寒冷之爲病也。俗醫不察。反謂該論祇合於北方之風寒。而不適於南方之溫熱。此蓋第觀卷首之桂麻二方耳。其於全書。固未深考也。且嘗觀傷寒論之註釋。總計百數十家。而終覺其變亂支離。愈多愈晦者。果何故歟。蓋以其不知傷寒論命名之義。實本於傷寒。有五而熱病者。固皆傷寒之類也。今惟以本論之六經爲綱。再以五種之傷寒爲目。類而次之。庶知仲景之所謂撰用素難與叔和之所謂錄取真方以防世急者。固自分明切實。而並無須於後人之註解也。至如近譯諸書。有以論腸窒扶斯病爲新傷寒論者。究之所道者。起而商訂之也。

張仲景傷寒論原序

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震懼。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。齎百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身以斃。神明消滅。變爲異物。幽潛重泉。徒爲啼泣。痛夫舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知己。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。憇若遊魂。哀乎趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者三分有二。傷寒者十居其七。感往昔之淪喪。傷橫夭之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脈辨證。爲傷寒雜病論。合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。

元冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝岐伯。高雷公少俞少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶。及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知決診。九候曾無髮鬚。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。漢長沙守南陽張機著。

# 攷定王叔和傷寒序論

傷寒之病。逐日淺深。以施方治。今世人得傷寒。或始不早治。或治不對病。或日數久淹。困乃告醫。醫又不知次第而治之。則不中病。皆宜臨時消息。制方無不效也。今搜采仲景舊論錄其證候。診脉聲色。對病真方。有神驗者。擬防世急也。又土地高下。寒溫不同。物性剛柔。餐居亦異。是故黃帝興四方之間。岐伯舉四治之能。以訓後賢。開其未悟。臨病之工。宜湏兩審也。

(見外臺秘要第一卷)

此當屬叔和采錄傷寒之自序。

夫表和裏病。下之而愈。汗之則死。裏和表病。汗之而愈。下之則死。夫如是。則神丹不可以誤發。甘遂何可以妄攻。表裏之治。相背千里。吉凶之機。應若影響。然則桂枝下咽。表和則斃。承氣入胃。裏平則亡。此表裏虛實之交錯。發汗吐下之相反。其禍至速。而醫術淺狹。爲治乃誤。使病者隕沒。自謂其分。至令冤魂塞於冥路。死尸盈於曠野。仁者鑒此。豈不痛歟。(見千金方第九卷外臺秘要第一卷)

凡兩感病俱作。治有先後。發表攻裏。本自不同。而執迷妄意者。乃云神丹甘遂合而服之。且解其外。又除其內。言巧似是。於理實違。安危之變。豈可詭哉。夫病發熱而惡寒者。發於陽。無解。此當屬叔和采錄傷寒之緒論。

熱而惡寒者。發於陰。發於陽者。可攻其外。發於陰者。宜溫其內。發表以桂枝。溫裏宜四逆。  
(見外臺秘要第一卷)

此當屬叔和采錄傷寒之緒論。

謹按成無己傷寒論註次卷載傷寒例一篇。俗以爲出自叔和。而實則不知何人所僞託。今攷例中諸條。多見於千金方第九卷及外臺秘要第一卷。惟前後割截文義乖違。而又雜以斗歷占算之法。蓋皆隨意鈔撮而成者耳。(或以爲千金外臺同采序例實則該例鈔自千金外臺而已)成氏不察。混加註釋。致起方氏中行喻氏嘉言程氏郊倩之駁斥。而王氏樸莊。陸氏九芝。又以爲研究傷寒者。斷不可不讀此序例。是皆誤以該例爲叔和。所自著。遂致聚訟紛紜。而反無以明。叔和搜采舊論之本意也。若取千金外臺。一比勘之。即見該例之錯雜無倫。茲故於該例中錄存叔和之序論。並加攷定。而凡非出自叔和者悉除去之。庶幾傷寒之大義可明。而叔和亦不致受誣於千載矣。

又按成註傷寒卷首載有運氣圖解。既不著撰者姓名。又不知緣何附入。蓋實與傷寒本論絕無關係者也。茲故削去之而不復多辯焉。

# 傷寒類編總目

## 自序

張仲景傷寒論原序  
攷定王叔和傷寒序論

太陽病通論

太陽中風病

太陽傷寒病

太陽濕溫病

太陽熱病

太陽溫病

太陽與陽明少陽合併諸病  
太陽不可發汗諸病

太陽汗後諸病

太陽吐後諸病

太陽下後諸病

太陽汗吐下後諸病

太陽火逆諸病

太陽水療後諸病

附太陽熱入血室病

附結胸臟結辨

附痙病

附陽明可下不可下辨

陽明病通論

陽明中風病

陽明傷寒病

陽明濕溫病

陽明熱病溫病

陽明與少陽及三陽合併諸病

少陽病通論

少陽中風病

少陽傷寒病

少陰病通論

少陰中風病

少陰宜清宜下宜溫諸病

厥陰病通論

厥陰中風病

附厥利嘔噦及瘥後諸病

## 傷寒類編

## 總目

陳氏家塾附設圖書館發刊



# 傷寒類編方目

桂枝湯	桂枝二麻黃一湯
白虎加人參湯	桂枝去桂加茯苓白朮湯
瓜蒂散	大青龍湯
十棗湯	五苓散
麻黃湯	小柴胡湯
小青龍湯	茯苓甘草湯
大承氣湯	黃連湯
白虎湯	小建中湯
炙甘草湯(一名復脉湯)	甘草乾姜湯
芍藥甘草湯	桂枝附子湯
四逆湯	調胃承氣湯
桂枝去桂加白朮湯	桂枝附子湯
桃核承氣湯	甘草附子湯
抵當丸	抵當湯
葛根加半夏湯	葛根湯
黃芩加半夏生姜湯	黃芩湯
桂枝麻黃各半湯	桂枝加附子湯
桂枝加芍藥生姜人參新加湯	桂枝甘草湯
眞武湯	茯苓桂枝甘草大棗湯
厚樸生姜甘草半夏人參湯	芍藥甘草附子湯
大柴胡湯	麻黃杏仁甘草石膏湯
生姜瀉心湯	桂枝加葛根湯
桂枝加芍藥湯	桂枝加大黃湯
大陷胸湯	大陷胸丸
小陷胸湯	大黃黃連瀉心湯
附子瀉心湯	桂枝人參湯
甘草瀉心湯	桂枝去芍藥湯
梔子厚樸湯	桂枝加厚樸杏仁湯
葛根黃連黃芩湯	桂枝去芍藥加附子湯
赤石脂禹餘糧湯	柴胡加龍骨牡蠣湯
桂枝去芍藥加附子湯	茯苓四逆湯
梔子甘草豉湯	梔子生姜豉湯

旋覆花代赭石湯

柴胡桂枝乾姜湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

文蛤散

吳茱萸湯

梔子檗皮湯

豬苓湯

豬膽汁方

柴胡桂枝湯

理中丸

四逆加猪膽汁湯

四逆散

苦酒湯

桔梗湯

麻黃附子細辛湯

附子湯

白通湯

桃花湯

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾姜黃連黃芩人參湯

枳實梔子豉湯

竹葉石膏湯

傷寒類編

方目

二

陳氏家塾附設圖書館發刊

當歸四逆加吳萸生姜湯

白頭翁湯

燒棍散

牡蠣澤瀉散

共一百一十三方

# 傷寒類編

番禺陳慶保編述

## 太陽病通論

凡病之由外入內者類皆先犯太陽而後傳及於陽明少陽太陰少陰厥陰者也仲景論述傷寒雖有五種之不同而其借徑於太陽者一也故開始卽曰太陽之爲病蓋謂善治太陽則凡中風傷寒濕溫熱病溫病均可不傳入於他經否則一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰病旣按日而遞深證亦循經而遞進矣太陽篇中所述五種傷寒之病脉證治而復歷言合病併病與夫汗吐下後火逆水療諸法蓋以此也學者其可不盡心乎。

太陽之爲病脉浮頭項強痛而惡寒。

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日以陽數七陰數六也。

病人身大熱反欲近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也。

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳也頗欲吐若躁煩脉數急者爲傳也傷寒二日三日陽明少陽證不見者爲不傳也。

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也傷寒六七日無大熱其人煩躁者此爲陽去入陰也。

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈。

太陽病欲解時從巳至未上。

## 太陽中風病

中風者五種傷寒之一也中風多由太陽入故太陽篇以中風爲首也前人每以桂枝治中風麻黃治傷寒大青龍治風寒兩傷營衛俱病竊謂其說尙有未妥今類列各條當知桂枝固爲治中風無熟之主劑大青龍則爲治中風挾熱之劑十棗五苓及瓜蒂散則又爲治中風挾有痰濕水飲之劑也至於類似桂枝證及服桂枝湯後而或有變證者又當

隨。證。施。治。而。不。能。以。一。例。拘。之。今。特。取。附。桂。枝。湯。後。庶。幾。條。理。分。明。而。脈。絡。貫。通。矣。

太。陽。病。發。熱。汗。出。惡。風。脈。緩。者。名。爲。中。風。

太。陽。中。風。陽。浮。而。陰。弱。陽。浮。者。熱。自。發。陰。弱。者。汗。自。出。嗇。嗇。惡。風。翕。翕。發。熱。鼻。鳴。

乾。嘔。者。桂。枝。湯。主。之。

### 桂枝湯方

桂枝三兩 苓藥三兩 甘草二兩炙 生羌三兩 大棗十二枚擘

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾。數熱稀粥一升。餘以助藥力溫覆令一時許遍身熱。微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除。若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服。若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物。

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳。

按本論一百一十三方謹依次第載明其複引者不贅惟用方或有加減法者則再列。

之以便觀覽。

又按古方分兩與今不同王樸莊攷正古方權量說謂古方一兩實卽今之七分六釐。古方一升實卽今之六勺七抄而已茲故附記於此後當準以爲例用藥者慎毋濫發重劑也。

### 附桂枝湯禁

桂枝本爲解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也當須識此勿令誤也。若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也。

服桂枝湯吐者其後必吐膿血也。

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之。

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯。

太陽病外證不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯。

太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯。

病常自汗出者此爲營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脈中衛

行脉外復發其汗則愈宜桂枝湯。

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯。

附服桂枝湯後諸病

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈。

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯。

桂枝二麻黃一湯方

桂枝一兩十七銖去皮芍藥一兩六銖甘草一兩二銖杏仁十六枚去皮尖

麻黃十六銖去節生羌一兩二銖大棗五枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服。

一云桂枝湯二升麻黃湯一升合爲三升分再服。

服柱枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之。

白虎加人參湯方

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服。

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下微滿痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

芍藥三兩甘草二兩炙生姜茯苓白朮各三兩大棗十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈

附病如桂枝證

病如桂枝證頭不痛項不強脉微浮胸中痞硬氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐之宜瓜蒂散。

瓜蒂散方

瓜蒂熬黃赤小豆各一分

右二味各別擣篩爲散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去渣。

和散頓服之。不吐者。稍稍加得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞶。此爲逆也。

### 大青龍湯方

麻黃六兩 桂枝二兩去皮 甘草二兩炙 杏仁四十枚去皮尖 生姜三兩 大棗十二枚 石膏碎如雞子大一塊

右七味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。服汗者。停後服。汗多亡陽。遂虛。惡風。煩躁。不得眠也。太陽中風。下利。嘔逆。表解者。乃可攻之。其人。繁。汗出。發作有時。頭痛。心下痞。鞕滿。引脅下痛。乾嘔。短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。十棗湯主之。

### 十棗湯方

芫花熬 甘遂 大戟等分 大棗十枚

右三味。各別擣爲散。以水一升半。先煮大棗肥者。取八合。去滓。內藥末。強人服一錢七。

羸人服半錢。得快下利。後糜粥自養。平旦溫服。若下少。病不除者。明日更服。中風發熱。六七日不解。而煩有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。

### 五苓散方

猪苓十八銖去皮 澤瀉一兩六銖 白朮十八銖 桂枝半兩去皮 茯苓十八銖

右五味爲末。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲。緩水。汗出愈。

風家解表而不了者。十二日愈。

### 太陽傷寒病

難經五十八難言。傷寒有五。而二曰傷寒。卽素問所言。冬傷於寒之病也。仲景撰用素難。故首言中風。而次言傷寒。後人每謂傷寒論專論寒邪所傷。而不知此特爲五種傷寒之一。故其注每難貫通也。今類列太陽傷寒病脉證治。其專主太陽傷寒者。惟麻黃湯一方耳。若脉微弱而不可發汗者。改用桂枝二越婢一湯。或桂枝麻黃各半湯。蓋因其脉證而變通之也。若小青龍湯。茯苓甘草湯等。治外傷寒而內挾水飲。承氣黃連湯等。治外傷寒而內有邪熱。建中復脉四逆湯等。又治外傷寒而裏不足。固不能以一例拘也。至於證象。

陽旦一則。病情錯雜。每多誤治。而後如師言。病卒可愈者。蓋又學者所宜詳究也。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脉陰陽俱緊者。名曰傷寒。

太陽病。頭痛。發熱。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗。而喘者。麻黃湯主之。

### 麻黃湯方

麻黃三兩去節 桂枝三兩去皮 甘草一兩炙

杏仁七十枚去皮尖

右四味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜渴。餘如桂枝法將息。

太陽病。脉浮。緊。無汗。發熱。身疼。痛。八九日。不解。表證。仍在此。當發其汗。服藥已微除。其人。發煩。目瞑。劇者。必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重。故也。麻黃湯主之。

傷寒。脉浮。緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。

太陽病。脉浮。緊。發熱。身無汗。自衄者。愈。

太陽病。十日已去。脉浮。細。而嗜。臥者。外已解也。設胸滿。脅痛。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃。

湯。

### 小柴胡湯方

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩 生姜三兩 半夏半升洗 大棗十

二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。

脉浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。

傷寒。脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。

此條證輕藥險。恐有誤。

傷寒。表不解。心下有水。氣乾嘔。發熱。而咳。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯方。主之。

### 小青龍湯方

麻黃去節 荀藥 細辛 乾姜 甘草 桂枝去皮各三兩 五味子半斤 半夏半

升湯洗。

右八味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。若微利者。去麻黃。加蕡花如雞子大。熬令赤色。若渴者。去半夏。加括蒌根三兩。若噎者。去麻黃。加附子一枚。炮。若小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓四兩。若喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。

傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒氣欲解也。小青龍湯主之。傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。

茯苓甘草湯方

茯苓二兩 桂枝二兩 甘草一兩炙 生姜三兩

右四味。以水四升。煮取二升。分溫三服。

傷寒不大便。六七日頭痛有熱者。與承氣湯其小便清者。知不在裏。仍在表也。當湏發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。

大承氣湯方

傷寒類編

太陽篇

九

陳氏家塾附設圖書館發刊

大黃四兩酒洗 厚朴半斤炙去皮 枳實五枚炙 芒消二合

右四味。以水一斗。先煮二物取五升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒消。更上微火一兩沸。分溫再服。得下餘勿服。

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。

黃連湯方

黃連 桂枝去皮 乾姜 甘草炙各三兩 人參二兩 半夏半升洗

大棗十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。溫服一升。日三服。夜二服。

傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。

白虎湯方

知母六兩 石膏一斤碎 甘草二兩 粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。白虎加人參湯主之。

傷寒。脉浮。發熱無汗。其表不解者不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者白虎加人參湯主之。  
傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。

小建中湯方

桂枝去皮 甘草炙 生姜各三兩 芍藥六兩 膠飴一升 大棗十二枚擘  
右五味以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。

傷寒脉結代心動悸。炙甘草湯主之。

炙甘草湯方（一名復脉湯）

炙甘草四兩 生姜三兩 桂枝三兩去皮 人參三兩 阿膠二兩 麥冬半升 生地一斤 麻仁半升 大棗三十枚

右九味以清酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠。烊消盡。溫服一升。日三服。

附結代脉

脈按之來緩而時一止。復來者名曰結。又脈來動而中止。更來小數。中有還者。反動名曰結。陰也。脈來動而中止不能自還。因而復動者名曰代。陰也。得此脉者必難治。

傷寒類編

太陽篇

十

陳氏家塾附設圖書館發刊

傷寒。脉浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯以攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾煩躁吐逆者。作甘草乾姜湯與之。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。

甘草乾姜湯方

甘草四兩炙 乾姜二兩炮

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

芍藥甘草湯方

芍藥四兩 甘草四兩

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

調胃承氣湯方

大黃四兩去皮 甘草二兩炙 芒硝半斤

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更上火微煮令沸。少少溫服之。

四逆湯方

甘草二兩炙 乾姜一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味。㕮咀以水三升。煮取一升二合。去滓分溫再服。強人可大附子一枚。乾姜三兩。問曰。證象陽旦。按法治之而增劇。厥逆。咽中乾。兩脰拘急而譖語。師言夜半手足當溫。兩脚攀。病證象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。厥逆咽中乾。陽明內結。譖語煩亂。更飲甘草乾姜湯。夜半陽氣還。兩足當溫。脰尙微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脰伸。以承氣湯微滯。則止其譖語。故知病可愈。

## 太陽濕溫病

脾主濕。胃主溫。濕溫爲病。繫在太陰。陽明其有繫在太陽者。特其借徑耳。故太陽篇第言。濕。痺。及。風。濕。之。爲。病。而。已。濕。痺。宜。利。其。小。便。風。濕。宜。散。其。外。風。此。爲。一。定。之。治。法。也。若。痺。久。而。成。溫。濕。久。而。化。熱。則。濕。溫。之。治。又。當。於。陽。明。內。求。之。而。不。可。以。太。陽。內。括。之。矣。太。陽。病。關。節。疼。痛。而。煩。脉。沈。而。細。者。此。名。濕。痺。其。候。小。便。不。利。大。便。反。快。但。當。利。其。小。便。濕。家。之。爲。病。一。身。盡。疼。發。熱。身。色。如。薰。黃。

濕家。病。身。疼。痛。發。熱。面。黃。而。喘。頭。痛。鼻。塞。而。煩。其。脈。大。自。能。飲。食。腹。中。和。無。病。病。在。頭。中。寒。濕。故。鼻。塞。內。藥。鼻。中。則。愈。

濕家。其。人。但。頭。汗。出。背。强。欲。得。被。覆。向。火。若。下。之。早。則。噦。或。胸。滿。小。便。不。利。舌。上。如。苔。者。以。丹。田。有。熱。胸。上。有。寒。渴。欲。得。水。而。不。能。飲。則。口。燥。煩。也。

濕家。下。之。額。上。汗。出。微。喘。小。便。利。者。死。若。下。利。不。止。者。亦。死。

病者。一身。盡。疼。發。熱。日。晡。所。劇。者。此。名。風。濕。此。病。傷。於。汗。出。當。風。或。久。傷。取。冷。所。致。也。

問。曰。風。濕。相。搏。一。身。盡。疼。法。當。汗。出。而。解。值。天。陰。雨。不。止。醫。云。此。可。發。汗。汗。之。病。不。愈。者。何。也。答。曰。發。其。汗。汗。大。出。者。但。風。氣。去。濕。氣。在。是。故。不。愈。也。若。治。風。濕。者。發。其。汗。但。微。似。欲。汗。出。者。風。濕。俱。去。也。

傷寒。八。九。日。風。濕。相。搏。身。體。疼。煩。不。能。自。轉。側。不。嘔。不。渴。脉。浮。虛。而。濇。者。桂。枝。附。子。湯。主。之。若。其。人。大。便。鞶。小。便。自。利。者。去。桂。枝。加。白。朮。湯。主。之。

桂枝附子湯方

桂枝四兩去皮

生姜二兩切

大棗十二枚擘

甘草二兩炙

附子三枚炮去皮破八斤

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服。

桂枝附子去桂加白术湯方

白术四兩 甘草二兩 附子三枚炮 生姜三兩 大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服初服其人身如痺半日許復服之三服盡其人如冒狀勿怪此以术附併走皮內逐水氣未得除故使之爾法當加桂四兩此本一方二法以大便輒小便自利去桂也以大便不輒小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之

風濕相搏骨節煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出氣短小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

甘草附子湯方

甘草二兩 附子二枚炮去皮 白术二兩 桂枝四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗而解能食汗出復煩

者服五合恐一升多者宜服六七合爲始

## 太陽熱病

太陽中熱太陽中渴皆中暑也暑病者熱極重於溫也內經云凡病傷寒而成溫者先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑蓋謂凡病外感而成溫者先夏至而受溫邪則爲溫病後夏至而受暑邪則爲暑病義最明瞭自有妄爲序例者糾纏冬傷於寒春必病溫之說乃曰寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病一若暑由寒變其義遂迂晦而難明今按仲景傷寒本論中暑卽中渴中渴卽中熱中熱爲五種傷寒之一固可以傷寒稱之而不必謂其定由傷寒所變也中熱中渴重在陽明而開始仍在太陽故仲景於太陽內三言之獨惜其方治未詳耳金匱癰濕喝篇主以白虎加人參湯及一物瓜蒂湯此固爲暑熱傷津暑熱夾濕之正治法也然觀此而傷寒論之有闕文蓋可知矣

太陽中熱者渴是也其人汗出惡寒身熱而渴也（金匱主以白虎加人參湯）

太陽中渴者身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水行皮中所致也（金匱主以一物瓜蒂湯用瓜蒂十四枚水一升煮五合頓服）

太陽中渴者。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細而遲。小便已。洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開前板齒燥。若發其汗。則惡寒甚。加溫鍼。則發熱甚。數下之。則淋甚。

## 附 太陽熱入血室病

五種傷寒之病類皆由衛及營。由營入血。至於入血。則爲瘀。熱在裏。而表散不可用矣。婦人中風傷寒。多有熱入血室者。蓋以經水適來。經水適斷。而病邪易入耳。若太陽隨經瘀。熱入裏。則固不限於婦人之經來經斷也。昔人謂男子有熱入血室者。其即指此也乎。血證直諦。固宜詳審也。

婦人中風發熱。惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脉遲。身涼。胸脅下滿。如結胸狀。譫語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實而瀉之。

婦人中風七八日。續得寒熱發作。有時經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作。有時小柴胡湯主之。婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀者。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。必自愈。

### 桃核承氣湯方

桃核五十枚去皮尖 桂枝二兩去皮 芒硝二兩 甘草二兩炙 大黃四兩

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尙未可攻。當先解外。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯。

### 抵當湯方

水蛭三十个熬 蟲蟲三十个熬去翅 大黃四兩酒浸 桃仁三十个去皮尖

右四味爲末。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下再服。

太陽病六七日。表證仍在。脉微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當硬。滿小便。自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經瘀熱在裏故也。抵當湯主之。

太陽病身黃脉沈。結少腹。鞭小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。

傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。當下之。不可。餘藥宜抵當丸。

### 抵當丸方

水蛭三十個 蟲蟲三十五個 大黃三兩 桃仁二十個去皮尖

右四味杵分爲四丸。以水一升。煮一丸。取七合服之。暉時當下血。若不下者更服。

### 太陽溫病

成氏無已傷寒論註曰。溫病者陽明也。斯言可謂獨得其要矣。然溫病之內發者繫在陽。明而溫邪之外受者則仍繫在太陽。蓋太陽實爲感受六氣之門戶也。自喻嘉言移其病於少陰腎。周禹載移其病於少陽膽。舒馳遠移其病於太陰脾。顧景文移其病於太陰肺。并移其病於厥陰心包。吳鞠通移其病於上焦。陳素中楊栗山又移其病爲雜氣。張介賓戴天章又移其病爲瘟疫。張石頑更移其病爲夾陰。議論日益多而條理日益紊殊不知陽明爲成溫之藪。太陽爲受溫之原。一按諸傷寒本論而羣言淆亂可哀。諸聖矣。至於方治多在陽明太陽篇中第舉其證狀及其治逆者耳。溫病條辨以桂枝湯爲開始之第一方。此蓋承喻氏之誤也。桑菊銀翹僅可治俗稱最小之傷風病耳。惟本篇葛根黃連黃芩。

湯既爲太陽陽明合病之主方。其即爲溫病風溫初起之正方也乎。

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病。若發汗已身灼熱者名曰風溫。風溫爲病。脉陰陽俱浮。自汗出身重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時瘺瘻。若火熏之一逆尙引日再逆促命期。

### 太陽與陽明少陽合併諸病

五種傷寒之病。旣類列於前矣。然其病固有不限於一經者。若一經病而連及別經。則所謂合病。併病也。柯韻伯曰。合則一時並見。併則以次相乘。大抵病在一經者易治病及二三經者難治。至於陰陽俱病。如素問熱論篇云。兩感於寒者。一日巨陽與少陰俱病。則頭痛。口乾而煩滿。二日陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譖言三日少陽與厥陰俱病。則耳聾。囊縮而厥。水漿不入。不知人。至六日而必不免於死矣。今傷寒論祇言陽與陽合併。病未言陰與陰合併。病及陽與陰合併。病書缺有間歟。抑陽病合併之猶有可治歟。此固學者所宜究心也。

### (二)太陽與陽明合病併病