

00097


子氏医案續編卷之八

卷之八

Horny Jing jih

小引

余承世業幼讀醫書而閱歷三十年愈覺斯道之難精竊謂宋元以來名家夥矣無不立言有所偏倚若薛立齋張會卿趙養葵李士材之派則其尤甚者也國朝一切著述莫不邁越前古醫林自喻氏崛起之後羣賢迭出於斯為盛然張路玉精於論溫而勞損之陰陽不別徐靈胎通乎古今之變而拘守柴胡以治瘧雖尺有所短而瑕不掩瑜彼柯韻伯之辨而好為穿鑿黃坤載陳修園之博而偏於溫燥坐而言則可起而行則礙以吳鞠通之明而混痰於溫致招章虛谷之議更不知霍亂有寒熱之分則尤陋矣此孟英霍亂論之所由迷也余讀其書神交數載幸一葷可杭復蒙寄示回春醫案二卷展繹之餘益信其抱有猷有為有守之才故能鑄古鎔今隨機應變可以坐而言可以起而行不愧為一代之名家今春來越視樗里王姓之證始得把臂快慰平生賞奇析疑別聆妙悟翻恨相見太遲致余聞道之晚也且知尚有仁術志一書乃張趙諸君輯其近案猶未梓行余不敢不步塵續采以當執鞭之忻慕乎



王氏醫案續編卷四

原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

丁未春金朗然今臺陡吐狂血肢冷自汗。孟英切脈絃復發難瘳。予丹參、丹皮、茺蔚、旋覆、苓、庵、柏葉、橘梗、金海蛇吐竟不起。

張孟臯少府令堂年踰古稀患氣逆腹屎煩躁不寐。孟英切脈沉而澀體冷自汗。宛似虛症。

承氣湯下之霍然。踰年以他疾終。

王致青齋尹令正。患痰喘。胡某進補腎納氣及二陳三子諸方。證瀕於危。顧昇庵參軍令延孟英診之。脈沈而澀體冷自汗。宛似虛脫之證。惟二便不通。脘悶苔膩。是痰熱為補藥所遏。一身之氣機窒痹而不行也。與妻薤旋赭杏貝、庵茺、兜鈴、海蛇、竹瀝等以開降。覆杯即減再服而安。王滙涵室年踰六旬。久患痰嗽。食減形消。夜不能眠。寢汗古絳廣服補劑。病日以增。孟英視之曰。固虛證之當補者。想未分經辨證而囫圇頽頹翻與證悖。是以無功。投以熟地、從容坎板、胡桃、百合、石英、茯苓、冬蟲夏草等藥一劑。知旬日愈。以其左脈絃細而虛右尺寸皆數為陰虧氣不潛納之候。及閱前服方。果雜用耆木以助氣。二陳故紙附桂等以刱陰也。宜乎愈補而愈劇矣。

王致青齋尹令正。患痰喘。胡某進補
英診之脈沈而澀體冷自汗。宛似虛症。
王滙涵室年踰六旬。久患痰嗽。食減形消。
夜不能眠。寢汗古絳廣服補劑。病日以增。
孟英視之曰。固虛證之當補者。想未分經
辨證而囫圇頽頹翻與證悖。是以無功。投
以熟地、從容坎板、胡桃、百合、石英、茯
苓、冬蟲夏草等藥一劑。知旬日愈。以其左
脈絃細而虛右尺寸皆數為陰虧氣不潛
納之候。及閱前服方。果雜用耆木以助氣。
二陳故紙附桂等以刱陰也。宜乎愈補而愈劇。

張荒百之室患感連服溫散繼遷顧聽采診之云有驟變須延孟英商治渠之不信。旬日後倏然昏厥自寅正至辰初不甦病者之兄吳次歐速孟英視之脈伏而絃滑與大劑犀羚知母花粉元參銀花調局方至寶丹灌下即安。

趙子樞患喉痺求笛樓用大劑生軍下之而藥不能入孟英以錫類散吹之即開與白虎法而瘥。

王雪山令媳患心悸眩暈廣服補劑初若甚效繼乃日劇時時出汗肢冷息微氣逆欲脫灌以參湯稍有把握延踰半載大費不貲莊芝階舍人令延孟英診視脈沉絃且滑舌絳而有黃膩之苔口苦溲熱汎事仍行病屬痰熱轉輶誤補則氣機壅塞與大劑清熱滌痰藥石當歸龍骨丸服之漸以向安仲夏即受孕次年二月誕一子惜其娠後停藥去疾未盡娩後復患悸暈眠氣短不饑或作產後血虛治不效仍請孟英視之脈極滑數曰病根未剗也與蠲瘡清氣法果應。

許子雙今堂梁宜人仲春之杪偶患微感醫與溫散熱已漸退孟英偶過說右寸脈促數不調因謂子雙曰此風溫證其誤表乎恐有驟變求復質之前醫以為妄論仍用溫燥越二日即見雜熱亂投卒至軀睡而死。醫家病家兩俱茫然益英此業可為仲

此證雖經仲景指出而人多不識往往雜熱亂投卒至軀睡而死。醫家病家兩俱茫然益英

然况在高年殊難救藥果浹旬而瘳。

京之功臣矣

食鵝片之
津液素虧
受溫邪較
人倍重非
標本并治
創必不救

姚某年未三旬烟癮甚大適伊母病溫而殞勞瘵悲哀之際吸受溫邪。腸痛筋掣氣逆痰多。熟
壯神昏益縮自汗。醫皆束手。所親徐麗生囑其速孟英診之。脈見芤數舌絳無津有陰虛陽越。
熱熾液枯之險。况初發即爾。其根蒂之不堅可知。與犀羚元參知母壯水息風。旋荅標實鼠矢
石英。潛陽鎮逆沙參。冬石斛。藏蕤益氣充津花粉。卮子銀花絲瓜絡。蠲痰清熱一劑知四劑
安隨以大劑養陰而愈。

周光遠無疾而逝。其母夫人年踰七旬。遭此慘痛。漸生咳嗽。氣逆痰鹹。夜多澀溺。口苦不饑。孟
英曰。根蒂虛而兼怫鬱也。與沙參甘草麥冬熟地。龜板石斛貝母蛤殼小麥大棗而安。迨夏間
吸暑而患腹痛滯下。小溲熱澀。其嗽復作。脈仍虛絃略加更數。但於前方增滑石。杏仁。連丸而
瘳。因平昔畏藥既愈。即停至仲秋嗽又作。惟口不苦而能食。因於前方去沙參。加高麗參五味
石。英牛膝。熬膏頻服而痊。十月下旬天氣驟冷。陡患吐瀉腹痛肢冷。音嘶急邀孟英視之。脈微
為寒邪直中。亟與大劑理中。加吳萸橘皮杜仲。故紙石脂餘糧而瘥。其夫人亦因怫鬱而患崩
漏。面黃腹脹。寢食皆廢。孟英用龜板海螵蛸女貞旱蓮貝母柏葉青蒿白蘿小麥茯苓。糯肉蓮
子心而康。次年夏其母夫人患溫邪痰嗽。脘悶汙多。孟英投石膏竹茹知母花粉旋覆貝母。姜
仁紫苑等藥三十劑而愈。聞者無不歎異。

胡季權令正許子雙之女弟也。初於乙巳患乳房結核。外科雜投。溫補核漸增而疼脹日甚。副
腫外邪者。斷其本若少。則其外邪者。亦可外除。故加五味。津液素虧。此因不兼外。人倍重非
可用。一膝等藥。徑

脈至細數則
陰竭陽亢不
拘何病均忌
此脈而虛勞
為尤甚

溫散惟宜於
傷寒何可亂
投且既已見
疹則肺胃之
熱已現於外
矣與柴胡湯
有何干涉此
醫直是不通

致形消沉愆夜熱減餐骨痿於牀孟英診曰營損情懷徒補藥益初以羸疾開鬱之劑吞當歸龍骨丸痛脹遞減賴退能餐月事乃行改投虎潛加減法服半年餘而起凡前後計用川貝母七八斤他藥稱是今春因哭母悲哀陡然發厥與甘麥大棗加龍牡龜鰐磁硃金箔龍眼而安懇治於孟英脈甚細數舌絳無津聞有謔語乃真陰欲匱外候雖較輕於康然不能收績矣再四求疏方與西洋參元參二地二冬知母花粉茹貝竹瀝葱鬚等藥三劑而橐腫全消舉家忻幸孟英以脈象依然堅辭不肯承手尋果不起

朱敦書令愛患感冒醫投溫散服二劑遍身麻痺汎事適來醫進小柴胡湯遂狂妄莫制乞援於孟英脈至洪滑絆數目赤苔黃大渴不寐是瘡因溫邪而發所以起病至今時時大汗何必再攻其表汎行為熱迫於營胡反以薑棗溫之參柴升之宜其燎原而不可遏也與大劑犀角元參生地石膏知母花粉銀花竹葉貝母白薇以清衛涼營服後即眠久而未醒或疑為昏沈也屢為呼喚病者驚寤即令家人啓醫易脈穿鞋梳髮告別父母云欲往花神廟歸位人莫能攔舉家痛哭急迓孟英復視脈象依然囑其家靜守勿哭仍以前方加重和以竹瀝童溲灌下即安經用養陰清熱而愈

瞿頴山仲媳許培之之妹也患舌糜沈悅亭知其素稟陰虧虛火之上炎也與清涼滋降之法

及硃黃等敷藥而不愈乃兄延孟英往視舌心糜腐黃厚邊尖俱已無皮湯飲入口痛不可當此服藥所不能愈者令將錫類散移之果即霍然或疑喉藥治舌何以敏捷如斯孟英曰此散擅生肌蝕腐之長不但喉舌之相近者可以借用苟能隔反未可言醫貴用者之善悟耳且糜腐厚膩不僅陰虛要須識此自知其故

高祿卿室吳濂仲之妹也孟夏分娩發熱初疑蒸乳數日不退產科治之知扶溫邪進以清解而大便溏泄遂改溫燥其泄不減另招張某視之因謂專科誤用婁仁所致與參耆薑木鹿角肉果等藥泄鴻愈甚連服之熱壯神昏汗出不止勢頗於危醞杳李廉徐夫人病者之從母也心慈似佛有子十人皆已出聞其殆竄夜命四郎李眉請援於孟英按脈洪數七至口渴苔黃洞瀉如火小溲不行因謂李眉曰病猶可治第藥太驚人未必敢服李眉堅欲求方且云在此監服乃疏白頭翁湯加石膏犀角銀花知母花粉竹葉梔子桑葉與之次日復診脈證較減仍用前方而病家羣譁以為產後最忌寒涼况洞泄數日乎仍招張某商之張謂幸我屢投溫補在前否則昨藥下嚥頃刻亡陽復定者木之方業已煎矣所親張芷舟孝廉聞之飛告於醞杳處汾伯昆季即馳至病家幸未入口奪璣傾之索孟英方煎而督灌且囑羣李輪流守視免致再投別藥孟英感其情誰快舒所長大劑涼解服至七帖瀉全止熱盡退乃去白頭翁湯加生地元參茹貞服半月始解黑色燥矢而眠食漸安第府藏之邪雖已清滌而從前溫補將熟邪矣

方遺古法並
不驚人特讀
立齋景岳書
看見之未免
吃驚耳
不意浙省名
手狃於溫補
如此真不能
不歸咎於景
岳立齋諸公矣

壅滯於膜絡之間者復發數癰於胸乳之間孟英令其恪守前法複入蒲公英絲瓜絡橘葉菊葉等藥服至百劑始告全愈而天癸亦至孟英曰世俗泥於座後宜溫之謬說況兼泄瀉即使溫補而死病家不怨醫者無憾也或具隻眼其誰信之此證苟非汾伯昆仲篤信於平時而力排眾論於危難之間余雖見到不疑亦惡能有濟耶余嘗曰病不易識尤不易患醫不易薦尤不易任藥不易用尤不易服誠宇宙間第一難事也而世人淺視之可不悲哉

趙秋齡進士去秋患左半不遂伊弟笛樓暨高弟許芷卿茂才王清熱蠲痰治之未能遽效邀孟英診之脈甚遲緩苔極黃膩便祕多言令於藥中和入竹懸一枕且以龍鬚滾痰二丸相間而投二丸各用片許證始向愈今春出廢眠食已復而素嗜厚味不戒肥甘孟夏其病陡發孟英診之脈形滑駛如蛇斷其不起秋初果效

吳澑門年踰花甲素患腕痛以為虛寒輒服溫補久而益劇孟英診曰肝火宜清彼不之信延至仲夏形已消瘦倏然浮腫脇背刺痛氣逆不眠心辣如焚喜嗔畏熱大便時瀉飲食下嚥即吐諸醫束手乃懇治於孟英脈絃硬而數與竹茹黃連枳杷葉知母厄棟旋赭等藥而吐止飲食雖進各恙未已投大劑沙參生地龜板鼈甲女貞旱蓮桑葉丹皮銀花茅根茹貝知柏枳杷葉菊花等藥出入為方二三十劑後周身發疥瘡而腫漸消右耳出粘稠膿水而瀉止此諸經之伏熱得以宣泄也仍以此藥令其久服迨秋始愈冬間能出門矣

所現諸證俱屬疾熱與弦數之脈相合但更則根柢不堅初方乃惠則治標之法次方乃顧及根本亦不顧

易之次第也。

比邱尼心能體厚踰跚偶患眩悸醫以為虛久服溫補漸至發腫不飢仲夏延孟英視之脈甚絃滑舌色光絳主清痰熱盡撤補藥彼不之信仍服八味等方至季夏再屈孟英診之脈數七至眠食盡廢不可救藥矣果及秋而卒。

金葉仙大令病其媳剗股以進因無效也悲哀欲絕遂發熱胡某治以傷寒藥而神迷自汗驚惕畏冷改換補藥乃氣逆不進水穀矣孟英視之七情有傷痰因火迫堵塞空靈之所也與沙參元參丹皮茯苓麥冬連翹竹茹竹葉蓮心小麥加以川貝母一兩投之數劑而瘥李竹虛令郎初秋患感醫聞便溏而止之乃至目赤譫妄舌絳苔黃溲澀善嘔粒米不能下咽孟英先與犀角石膏竹葉竹茹杞杞葉茅根知母花粉卮子以清之嘔止神清熱亦漸緩繼以承氣湯加減三下黑矢黃苔始退即能啜粥以其右關尺遲緩有力故知有燥矢也續投甘涼調理而痊

朱養之令弟媳初患目赤服藥後漸至滿面紅腫壯熱神昏醫者束手孟英切脈洪實滑數舌絳大渴腹微脹以酒洗大黃犀角元參滑石甘草知母花粉銀花黃芩連翹薄荷葛花丹皮兩下之徑愈。

都城售透土長壽丹極言其功之大能治諸疾而價甚廉人皆稱之孟英謂勿論其所用何藥執一方以療百病無此治法每以票賦不齊證因有別勸人切勿輕嘗况以綠豆湯為引必有

熱毒之品在內不可不慎也。繼而張孟臯少府餌之患疽廣寧亭司馬服之咽爛。孟英投多劑甘寒而愈。王雪山久患下部畏冷，吞未百丸齒痛目赤諸恙蜂起。孟英察脈絃滑與多劑石膏藥兼以當歸龍鬚丸頻服新疾既瘳，腿亦漸溫。令其常飲柿餅湯以杜將來之患。伊弟患腹脹而喜服溫補久而不效。孟英曰：溼熱也。宜清化。彼不信，因服透王丹。初頗應已而血大溢，始得悔悟。志此數則以為世之好服奇藥者戒。

廣孔愚司馬之公子仲秋間患瘧寒少熱多面目甚黃苔膩大渴腹脹溺亦仍能納穀且素嗜肥甘不能撙節。孟英按其脈滑實而數與承氣加知苓半貝翹連滑石膏大腹花粉之類二十餘劑而始愈。是膏梁拔暑濕熱之治也。

王瘦石稟屬陰虧。卒聞驚嚇之聲而氣逆肢冷自汗息微速。孟英視之身面皆青綠之色。脈沈絃而細乃素傷憂慮而風陽徒動也。與牡蠣四兩、鼈甲二兩、蛤殼一兩、石英五錢、龍齒小麥辰砂參冬辰神貝母竹茹為方。一劑知二劑已續以滋養而瘳。

陳書伯庶常令弟保和年未冠患失音咽痛。孟英與犀羚石膏元參豆根牛蒡射干等大劑清肅之藥。音開而咽糜吹以錫類散糜愈而疹點滿布。左目及耳後皆腫。方中加以鮮菊葉二兩。瘡愈痰嗽不已仍主前法服三十餘帖而痊。此證脈滑且數口大渴初終未曾誤藥故能愈其庶母同時患喉糜而頭偏左痛心悸欲嘔。壯熱煩躁脈絃細數。孟英曰此兼陰虧風動也。初以

凡陰虛之體
血不足以養
肝則肝陽易
發用大劑鎮
逆養陰開鬱
治法絲絲入
扣宜乎應手
驗效也
變證雖多不
外肺胃二經
積熟得其主
腦尚非難愈
之證

犀羚元參菊花丹參危子桑葉馬勃散之外吹錫類散咽愈熱退續用二至一冬生地石英粉容龜板旋冷滋陰潛陽而瘳又其二令妹亦患喉痺汎事適行四肢痠痛略難舉動氣塞於咽孟英診脈絃滑以犀羚旋赭始見燒鈴牛蒡射干豆根花粉銀花海蛇竹澤絲瓜絡等出入為方兼吹錫類散而瘥

吳爾純八月下旬患滯下腹痛異常伊外祖許仲廉延孟英往診形瘦脈數而弦口渴音微澀澀乃陰分極虛肝陽熾盛伏暑為痢治法不但與寒痢迥異即與他人之伏暑成痢者亦當分別用藥也與白頭翁湯加知母花粉銀花丹皮金鈴延胡沙參各連服之次日復視痢減音闇而右腹疼痛拒按為加冬瓜子烏藥鼠矢三劑而消滯下亦愈惟薄暮火升面赤自汗重加介類滑陽而痊

楊某患感冒初則便溏醫與溫散瀉止熱不退晝夜靜卧飲食不進孟英診脈遲緩浮取甚微目眵舌色光紅口不渴溲亦行胸腹無所苦語懶音低尋即睡去是暑濕內伏而有燥矢在胃機關為之不利也先與清營通胃藥二劑熱退舌淡而脈證依然加以酒洗大黃省頭草即下堅黑燥矢甚多而睡減啜粥繼以涼潤旬日而痊

陳春湖令郎子莊體素弱李秋患腹痛自汗肢冷息微咸謂元虛欲脫孟英診之脈雖沈伏難尋而苔色黃膩口乾渴亦當從證也與連樸林危元胡蠶砂醒頭草等藥而康次年患感復誤

此溼勝於熱
之著證也以
其溼勝故不
甚現熱證最
足肚人斷為
著溼足微卓
識

死於補又夏溫宋延孟英視錢姬腹痛欲絕證因見絃滑之脈與當歸龍骨丸而安

朱湘槎令媳患小溲澀痛醫與參利反發熱頭疼不饑口渴夜不成眠孟英診之脈細數乃陰虛肝鬱化熱生風津液已爍豈容再利與白薇卮子金鈴知母花粉紫苑麥冬石斛菊花服之即愈其姪新泉之室懷娠患病醫投溫燥止澀腹痛甚而偏身發黃飲食不思孟英視之暑溼也與芩連銀花茅根桑葉危棟竹葉茵陳冬瓜皮而愈

吳醞香大令仲媳汎愆而崩之後脫痛發厥自汗肢冷孟英脈之細而絃滑口苦便澀乃素體多痰風陽內鼓雖當崩後病不在血與旋赭羚如意貝薤裹蛤殼為方痛乃漸下厥亦止再加全鈴延胡從蓉龍矢服之而愈迨季冬因卒驚發狂笑罵不避親疎孟英察脈絃滑而數與犀羚元參丹皮丹參危子菖蒲竹葉鼈甲竹瀝吞當歸龍骨丸息風陽以滌痰熱果數劑而安然平時喜服補藥或有眩暈不知為風痰內動益疑為元氣大虛孟英嘗諫阻之而彼不能從至次年季春因傷感而狂證陡發毀器登高更甚於昔孟英視之苔黑大渴與前方加真珠牛黃服之苔色轉黃絃滑之脈略減而狂莫可制改以石膏硃砂鐵落菖蒲青黛知母膽星鼈甲金鈴旋覆元參竹瀝為大劑送礞石滾痰丸四服而平繼而脚氣大發腹痛便祕上衝於心肢冷汗出昏暈欲厥與連棟危始小麥百合旋貝元胡烏藥雪羹石英龍矢黃柏鴉等藥而安

徐氏婦懷妊患痢醫投溫補胸腹痛極昏厥咽糜水飲礙下孟英診之脈洪數舌絳燥亟吹錫

凡藥中用硃砂者宜另研入煎劑不可同

類散灌以犀角元參海蛇姑貝危範知斛豆根射干銀花棟實諸藥胎下已折咽腹之疾隨愈續用甘涼清熱存津調之

許培之令祖母年踰七旬久患淋漏屢發風斑孟英持其脈絃而滑舌絳口乾母以犀角生地二至芩蒿白薇元參砕板海螵之類息其暴甘露飲增損調其常人皆疑藥過涼孟英曰量體裁衣稟屬陽旺氣血有餘察其脈色治當如是病者乃云十餘年前偶患崩而廣服溫補遂成此恙始知先天陽氣雖充亦由藥釀為病秋杪患寒熱如瘧喜怒不眠苦渴易餓不能納食孟英察脈絃數倍常與清肺蠲痰柔肝充液之法漸以向安今冬有薦吳古年診治者詢知病原作高年脫營論而以血脫益氣裁方初服三四劑飲食驟增舉家忻幸已而血漏甚多眠食欲廢復延孟英視之仍主前議果得漸康

王天成牙行一婦年五十餘初患左目赤漸至發熱醫投溫散便泄而厥進以補劑少腹宿瘕攻痛勢極危殆丐孟英診之脈甚絃硬舌絳而渴與旋朮橘核當歸元胡砕板石英螵蛸茯苓危棟萸連數服而安踰年以他病卒

何新之令愛適湯氏孟冬分娩次日便瀉一次即發熱痙攣語昏狂舉家惶惶乃翁邀孟英審之脈絃滑惡露仍行曰此胎前伏暑乘新產血虛瘀滯而發也與大劑犀羚元參竹葉知母花粉危棟銀花投之偏身得赤疹而痘止神清乃翁隨以清肅調之而愈

有是病則有
是藥不拘拘
於此明醫之
謂也

疾大為患十
人常居八九
而醫書所載
皆治寒疾之
法十投而十
不效今得孟
英大治熱
疾之法真可
謂獨標精義

胡秋穀今愛年甫笄歲患眩暈。孟英切其脈滑作痰治服一二劑未愈。更醫謂虛進以補藥頗效。渠信為實。然今冬復病。徑服補藥。半月後。眠食皆廢。聞聲驚惕。寒顫自汗。肢冷如冰以為久虛欲脫。乞援於孟英。脈極細數。目赤便祕。胸下痞塞如杵。力辨其非虛證。蓋痰飲為患。乍補每若相安。具隻眼者。始不為病所欺也。投以旋赭。茹貝。蛤殼花粉。桑卮。薤連枳等藥數服。即安而暈不能止。乃去赭薤。枳加元參。菊花二至三甲之類。服匝月始能起稿。

汪氏婦自孟秋患病之後。大解溏泄未愈。已而懷娠。恐其墮也。投補不輟。延至仲冬。兩目赤障。滿遮氣逆。礙眠。脘疼拒按。痰嗽不食。苦渴無溺。屈孟英診之。脈甚滑數。曰此溫補所釀之疾也。夫秋間滯下。原屬暑溼。熱為病既失清解。逗留而為溏泄。受孕以來。業經四月。慮其墮而補益峻。將肺胃下行之令。皆挽以逆行。是以胸次堵塞而疼痛。嗽不能卧。又恐其上喘下泄而脫也。補之愈力。治節盡廢。溲閉不機。濁氣壅至清竅。兩目之所以蒙障而瞽也。與沙參。蛤殼。杞杞葉。冬瓜子。海石。旋覆。蘇子。杏仁。黃連。枳實。海蛇黃芩。危子。重加貝母。服二劑。即知機下稿。目能睹物矣。

黃履吉患痛吐。孟英已為治愈。冬仲復發。他醫藥之。已七日不進穀矣。二便祕。澀形肉遂消。再託孟英診之。與旋赭。茹苓。連柿。蒂棟。實延。胡等藥一劑。知三劑愈。

許仲筠患腹痛。不饑。醫與參。木蠶。附諸藥。疼脹日加。水飲不沾。沈沈如寐。孟英診脈。絃細苔色

黃膩投以枳樸萸連危棟香附菟藜延胡等藥二劑便行脈起苔退知餓而愈

畢方來室患疾嗽礙眠醫與補攝而至涕洟全無耳閉不饑二便澀滯乾嗽無痰氣逆自汗孟英切脈右寸沈滑左手細數而絃乃高年陰虧溫邪在肺未經清化率為補藥所綱宜開其癆而通其胃與婁雍紫苑兜鈴杏貝冬瓜子甘桔旋如之劑而安踰二年善後以他疾終

賴炳也令堂年近古稀患左半不遂醫與再造丸暨補劑服二旬病如故孟英按脈緩而滑顧赤苔黃音微舌蹇便澀無痰曰此痰中也伏而未化與犀羚茹貝菖夏花粉知母白薇豆卷桑枝絲瓜絡等藥服三劑而苔化音漸清明六七劑腿知痛痰漸吐便亦通既而腿痛難忍其熱如焰孟英令塗葱蜜以吸其熱痛果漸止半月後眠食漸安二旬外手能握月餘可扶液以行矣

胡季權令郎珍宦右額偶發紫斑一塊時當季冬孟英與犀角石膏涼解之藥二三帖後始發熱斑漸透犀角服二十帖始撤素有目疾餘熱復從目發令以石膏藥久服居然漸愈竟能食肌充略無他患聞者莫不異之

趙春山司馬尚患疾嗽自秋仲以來屢發寒熱吳古年從伏暑化瘧治頗為應手而一旬半月之後病必復至延至季冬董蘭癥瘕尹囑其質於孟英按脈滑數舌絳苔黃渴飲溲赤動則喘逆夜不成眠痰多畏冷自問不能起矣孟英曰無恐也不過膏梁釀痰溫補助熱是為病根迨

夏吸暑邪互相轉轄秋半而發勢頗類瘧古年雖識其證惜手段小耳因與羚羊豆豉連翹薄
荷知母花粉竹茹貝母旋覆海蛇元參危子醒頭草梨汁等藥服五劑熱退不畏冷去前四味
加沙參麥冬葳蕤杞杞葉漸能安寐各恙遞減再加生地服匝月而體健勝昔登高不喘司馬
云余昔曾服參茸大補之藥而陽痿今服君方而沈疴頓起乃知藥貴對證不貴補也