

XIN BIAN ZHONG CAO YAO
SHI BIE YU YING YONG CAI SE TU PU

依据2010版
中国药典编写

新编中草药 识别与应用彩色图谱

■ 潘超美 主编



全国百佳图书出版单位


中国中医药出版社

ISBN 7-117-10392-0

定价：40.00元

新编中草药

识别与应用彩色图谱



人民卫生出版社
人民卫生出版社

XIN BIAN ZHONG CAO YAO
SHI BIE YU YING YONG CAI SE TU PU


新编中草药 识别与应用彩色图谱

主 编 潘超美

编 写 赖珍珠 夏 静 梁钻姬 郑芳昊

吴 波 刘 欣 黄崇才 黄昌杰

摄 影 潘超美 (署名的图片除外)



中国中医药出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中草药识别与应用彩色图谱 / 潘超美主编. — 北京 : 中国中医药出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5132-0502-3

I . 新… II . 潘… III . 中草药-图谱 IV . R282.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 101212 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易享大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京亚通印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 18.875 字数 570 千字
2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5132-0502-3

*

定价 56.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版社部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

编写说明

1. 本书共收集了临床上治疗常见病症广泛应用的中药300种，主要以中华人民共和国药典以及全国中医药类高等院校规划教材《中药学》列出的常见中药为主，加入部分现代临床广泛应用的天然植物药种类。依据功效进行归类，分为解表药、清热药、泻下药、祛风湿药、化湿药、利水渗湿药、温里药、理气药、消食药、驱虫药、止血药、活血化瘀药、化痰止咳平喘药、安神药、平肝息风药、补虚药、收涩药、抗肿瘤药等。

2. 每种植物药配有文字和彩色照片两部份。每一种药以2010版《中国药典》、《中药大辞典》的药名为正名。文字内容包括中草药中文名称、别名、基原植物中文名和拉丁学名、识别特征、药材性状特征、性味与功用、常见病配伍、验方精选、使用禁忌和其他功用等内容。每种药只描述3个常见的别名，形态特征着重描述肉眼能鉴别到的特征。植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中国高等植物图鉴》、《中国植物志》、《全国中草药汇编》等。

3. 凡有毒植物药，不论毒性大小，均在性味功效中注明“有毒”二字，无毒性的植物药则不再标明“无毒”。

4. 性味功效包括了性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时须根据具体情况灵活掌握，对有毒性药尤其要慎重。

5. 本书后附有中草药的中文名称笔画索引和南北方常用中药基原对照表。

目

录

一、解表药

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 生姜 / 002 | 香薷 / 016 | 木贼 / 030 | 淡豆豉 / 044 |
| 西河柳 / 004 | 桂枝 / 018 | 牛蒡子 / 032 | 葛根 / 046 |
| 防风 / 006 | 麻黄 / 020 | 升麻 / 034 | 蔓荆子 / 048 |
| 苍耳子 / 008 | 葱白 / 022 | 柴胡 / 036 | 薄荷 / 050 |
| 辛夷 / 010 | 紫苏 / 024 | 桑叶 / 038 | 天花粉 / 052 |
| 细辛 / 012 | 鹅不食草 / 026 | 浮萍 / 040 | |
| 胡荽 / 014 | 藁本 / 028 | 菊花 / 042 | |

二、清热药

- | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 决明子 / 054 | 黄连 / 084 | 青果 / 114 | 野菊花 / 144 |
| 芦根 / 056 | 土茯苓 / 086 | 苦瓜 / 116 | 绿豆 / 146 |
| 谷精草 / 058 | 大血藤 / 088 | 败酱 / 118 | 紫花地丁 / 148 |
| 青箱子 / 060 | 大青叶 / 090 | 委陵菜 / 120 | 蒲公英 / 150 |
| 知母 / 062 | 山豆根 / 092 | 金荞麦 / 122 | 锦灯笼 / 152 |
| 栀子 / 064 | 千里光 / 094 | 金银花 / 124 | 漏芦 / 154 |
| 夏枯草 / 066 | 马齿苋 / 096 | 鱼腥草 / 126 | 玄参 / 156 |
| 鸭跖草 / 068 | 木蝴蝶 / 098 | 绵马贯众 / 128 | 地黄 / 158 |
| 淡竹叶 / 070 | 四季青 / 100 | 南板蓝根 / 130 | 赤芍 / 160 |
| 密蒙花 / 072 | 白头翁 / 102 | 鸦胆子 / 132 | 牡丹皮 / 162 |
| 白鲜皮 / 074 | 白花蛇舌草 / 104 | 重楼 / 134 | 白薇 / 164 |
| 关黄柏 / 076 | 白薇 / 106 | 穿心莲 / 136 | 青蒿 / 166 |
| 苦参 / 078 | 半边莲 / 108 | 积雪草 / 138 | 银柴胡 / 168 |
| 秦皮 / 080 | 地锦草 / 110 | 射干 / 140 | 大黄 / 170 |
| 黄芩 / 082 | 连翘 / 112 | 拳参 / 142 | |

三、泻下药

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 千金子 / 172 | 甘遂 / 178 | 京大戟 / 184 |
| 火麻仁 / 174 | 芦荟 / 180 | 牵牛子 / 186 |
| 巴豆 / 176 | 郁李仁 / 182 | 商陆 / 188 |

四、祛风湿药

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 丁公藤 / 190 | 路路通 / 203 | 络石藤 / 214 | 五加皮 / 226 |
| 木瓜 / 192 | 飞天蜈蚣 / 205 | 秦艽 / 216 | 狗脊 / 228 |
| 伸筋草 / 195 | 丝瓜络 / 206 | 海桐皮 / 218 | 桑寄生 / 230 |
| 松节 / 197 | 老鹳草 / 208 | 雷公藤 / 220 | 鹿衔草 / 232 |
| 草乌 / 199 | 防己 / 210 | 豨莶草 / 222 | 落马衣 / 234 |
| 威灵仙 / 201 | 穿山龙 / 212 | 千年健 / 224 | 红豆蔻 / 236 |

五、化湿药

苍术 / 238
佩兰 / 240

草豆蔻 / 242
厚朴 / 244

砂仁 / 246
藿香 / 248

六、利水渗湿药

广金钱草 / 250
车前草 / 252
冬瓜皮 / 254
玉米须 / 256
田基黄 / 258
石韦 / 260

灯心草 / 262
鸡骨草 / 264
苘麻子 / 266
虎杖 / 268
垂盆草 / 270
泽泻 / 272

泽漆 / 274
枳椇 / 276
珍珠草 / 278
茵陈 / 280
荠菜 / 282
香加皮 / 284

海金沙 / 286
篇蓄 / 288
薏苡仁 / 290
瞿麦 / 292

七、温里药

丁香 / 294
八角茴香 / 296

小茴香 / 298
花椒 / 300

荜茇 / 302
荜澄茄 / 304

胡椒 / 306
高良姜 / 308

八、理气药

刀豆 / 310
川楝子 / 312
广陈皮 / 314
天仙藤 / 316

化橘红 / 318
乌药 / 320
佛手 / 322
沉香 / 324

青皮 / 326
玫瑰花 / 328
荔枝核 / 330
柿蒂 / 332

香附 / 334
桂花 / 336
檀香 / 338

九、消食药

山楂 / 340

鸡矢藤 / 342

莱菔子 / 344

稻芽 / 346

十、驱虫药

土荆芥 / 348
苦楝皮 / 350

使君子 / 352
南瓜子 / 354

蛇床子 / 356
榧子 / 358

槟榔 / 360

十一、止血药

大蓟 / 362
小蓟 / 364
艾叶 / 366
仙鹤草 / 368

白及 / 370
白茅根 / 372
地榆 / 374
羊蹄 / 376

苎麻根 / 378
降香 / 380
茜草 / 382
紫珠 / 384

槐花 / 386
蒲黄 / 388
槲木 / 390

十二、活血化瘀药 / 392

儿茶 / 392
川芎 / 394

马钱子 / 396
牛膝 / 398

丹参 / 400
北刘寄奴 / 402

延胡索 / 404
血竭 / 406

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 红花 / 408 | 鸡血藤 / 414 | 骨碎补 / 420 | 桃仁 / 426 |
| 苏木 / 410 | 郁金 / 416 | 姜黄 / 422 | 凌霄花 / 428 |
| 连钱草 / 412 | 泽兰 / 418 | 莪术 / 424 | 益母草 / 430 |

十三、化痰止咳平喘药

| | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 天南星 / 432 | 竹茹 / 442 | 胖大海 / 452 | 旋覆花 / 462 |
| 白果 / 434 | 皂荚 / 444 | 前胡 / 454 | 紫菀 / 464 |
| 白前 / 436 | 枇杷叶 / 446 | 洋金花 / 456 | 矮地茶 / 466 |
| 半夏 / 438 | 罗汉果 / 448 | 桔梗 / 458 | 满山红 / 468 |
| 百部 / 440 | 胡颓子叶 / 450 | 黄药子 / 460 | |

十四、安神药

| | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 合欢皮 / 470 | 远志 / 472 | 灵芝 / 474 | 柏子仁 / 476 |
|-----------|----------|----------|-----------|

十五、平肝息风药

| | | |
|-----------|-----------|----------|
| 刺蒺藜 / 478 | 罗布麻 / 480 | 钩藤 / 482 |
|-----------|-----------|----------|

十六、补虚药

| | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 人参 / 484 | 北沙参 / 504 | 沙棘 / 524 | 黄精 / 544 |
| 大枣 / 486 | 南沙参 / 506 | 补骨脂 / 526 | 菟丝子 / 546 |
| 山药 / 488 | 仙茅 / 508 | 核桃仁 / 528 | 银耳 / 548 |
| 女贞子 / 490 | 白术 / 510 | 枸杞 / 530 | 淫羊藿 / 550 |
| 天冬 / 492 | 白扁豆 / 512 | 韭菜子 / 532 | 续断 / 552 |
| 太子参 / 494 | 冬虫夏草 / 514 | 绞股蓝 / 534 | 楮实子 / 554 |
| 巴戟天 / 496 | 百合 / 516 | 党参 / 536 | 黑芝麻 / 556 |
| 玉竹 / 498 | 麦冬 / 518 | 铁皮石斛 / 538 | 墨旱莲 / 558 |
| 甘草 / 500 | 杜仲 / 520 | 益智 / 540 | |
| 龙眼肉 / 502 | 何首乌 / 522 | 黄芪 / 542 | |

十七、收涩药

| | | |
|-----------|-----------|----------|
| 山茱萸 / 560 | 肉豆蔻 / 568 | 莲子 / 576 |
| 五味子 / 562 | 诃子 / 570 | 椿皮 / 578 |
| 乌梅 / 564 | 鸡冠花 / 572 | |
| 石榴皮 / 566 | 金樱子 / 574 | |

正别名索引 580

南北方常用中药基原对照表 592


新 编

中草药识别



与

应用彩色图谱




- ▼ 理气药
- ▼ 温里药
- ▼ 利水渗湿药
- ▼ 化湿药
- ▼ 祛风湿药
- ▼ 泻下药
- ▼ 清热药
- ▼ 解表药
- ▼ 消食药
- ▼ 驱虫药
- ▼ 止血药
- ▼ 活血化瘀药
- ▼ 化痰止咳平喘药
- ▼ 安神药
- ▼ 平肝息风药
- ▼ 补虚药
- ▼ 收涩药

一、解表药

(一) 发散风寒药

生姜



生姜根茎

干姜



【来源】为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的新鲜根茎。

【野外识别特征】多年生草本，高50～80cm。根茎肥厚，断面黄白色，有浓烈的辛辣气味。叶互生，排成2列，无柄，有长鞘，抱茎；叶片披针形至线状披针形。花葶自根茎中抽出，长15～25cm；穗状花序椭圆形，长4～5cm；苞片淡绿色，边缘淡黄色，先端有小尖头；花冠黄绿色，裂片3，唇瓣的中间裂片较花冠裂片短，有紫色条纹和淡黄色斑点，两侧裂片黄绿色，具紫色边缘。蒴果3瓣裂，种子黑色。花期7～8月。我国中部、东南部至西南部各省有栽培。

【药材性状】呈不规则块状，略扁，具指状分枝。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。

【性味功效】辛，温。解表散寒，降逆止呕，化痰止咳，解诸毒。内服煎汤3～9g。

【常见病配伍】

1. 外感风寒 常与桂枝配伍使用。
2. 胃寒呕吐 常与半夏配伍使用。
3. 风寒咳嗽 常与杏仁、紫苏、陈皮、半夏配伍使用。

【验方精选】


1. 外感风寒，头痛发热，汗出恶风 生姜、桂枝、芍药各9g，甘草6g，大枣12枚。水煎服。
2. 胃寒呕吐 生姜18g，半夏15g。水煎服。
3. 风寒咳嗽 生姜、制半夏、苏叶、陈皮、前胡、杏仁、桔梗、茯苓、炙甘草各6g。水煎服。

【其他功用】干燥根茎（干姜）能温中散寒，回阳通脉，温肺化饮；根茎外皮（生姜皮）能行水消肿；茎叶（姜叶）能活血散结。

【使用禁忌】

阴虚内热及实热证禁服。



西河柳



药材饮片



药材饮片



西河柳花

【别名】三春柳、垂丝柳。

【来源】为柽柳科植物柽柳 *Tamarix chinensis* Lour. 的嫩枝叶。

【野外识别特征】灌木或小乔木，高3~6m。幼枝柔弱，开展而下垂，红紫色或暗紫色。叶鳞片状、钻形或卵状披针形，长1~3mm，半贴生，背面有龙骨状脊。每年开花2~3次；春季在去年生小枝上侧生总状花序，花稍大而稀疏；夏、秋季在当年生幼枝顶端形成总状花序组成顶生大型圆锥花序，常下弯，花略小而密生，花5数，粉红色。蒴果长约3.5mm，3瓣裂。花期4~9月，果期6~10月。常生于河流冲积地、海滨、滩头、潮湿盐碱地和沙荒地。野生于河北、辽宁、江苏、安徽、山东、河南等地；我国东部至西南部各地有栽培。

【药材性状】枝细圆柱形，直径0.5~1.5mm，表面黄绿色，节较密，叶鳞片状，钻形或卵状披针形，长1~3mm，背面有龙骨状脊。质脆，易折断，断面黄白色，中心有髓。气微，味淡。

【性味功效】甘、辛，平。疏风，解表，透疹，解毒。内服煎汤10~15g，外用适量，煎汤擦洗。

【常见病配伍】

1. 麻疹初期 常与牛蒡子、荆芥、蝉蜕等配伍使用。
2. 风寒痹痛 常与秦艽、独活等配伍使用。

【验方精选】

1. 麻疹透发不出 西河柳、玄参各6g，荆芥穗、干葛、炒牛蒡各4.5g，蝉蜕、薄荷、知母、甘草各3g，麦冬9g，淡竹叶5g。水煎服。
2. 风湿痹痛 西河柳、虎杖根、鸡血藤各30g。水煎服。
3. 痧疹发不出，喘嗽，烦闷，燥乱 西河柳叶12g，研末。以水调服。

【使用禁忌】

麻疹已透及体虚多汗者禁服。

防风



【别名】铜芸、回云、屏风。

【来源】为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的根。

【野外识别特征】多年生草本，高30~80cm。根粗壮，有分枝，淡红棕色，根头处密生纤维状叶柄残基及明显的环纹。茎单生，二歧分生。基生叶丛生，有扁长的叶柄，基部有宽叶鞘，稍抱茎；叶片长圆形，二至三回羽状分裂。复伞形花序多数，生于茎顶和分枝顶端。双悬果狭圆形。花期8~9月，果期9~10月。生于草原、丘陵和多石砾山坡上。分布于华北、东北及山东、陕西、甘肃、宁夏等地。

【药材性状】呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细。表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔及点状突起的细根痕。根头部有明显密集中环纹，有的环纹上残存棕褐色毛状叶基。体轻，质松，易折断，断面不平坦，皮部浅棕色，有裂隙，散生黄棕色油点，木部浅黄色。气特异，味微甘。

【性味功效】辛、甘，微温。祛风解表，胜湿止痛，止痉，止痒。内服煎汤4.5~9g。

【常见病配伍】

1. 外感风寒 常与荆芥配伍使用。
2. 风热壅盛，表里俱实 常与荆芥、大黄、连翘等配伍使用。
3. 风寒湿痹 常与羌活、细辛、苍术等配伍使用。

【验方精选】

1. 感冒、支气管炎、皮肤瘙痒 防风、荆芥、羌活、独活、柴胡、前胡、枳壳、茯苓、桔梗、川芎各5g，甘草3g。水煎服。

2. 偏头痛、习惯性便秘 防风、川芎、当归、芍药、大黄、薄荷叶、麻黄、连翘、芒硝各6g，黄芩、桔梗各12g，滑石20g，甘草10g，荆芥、白术、栀子各3g。水煎服。

3. 流行性感冒、风湿性关节炎 防风、苍术各6g，羌活10g，细辛2g，川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草各3g。水煎服。

4. 风毒阻痰之破伤风 防风、胆南星、白芷、天麻、羌活、白附子各6g。水煎服。

【其他功用】叶可用治中风热汗出；花可用治心腹痛，四肢拘急，行履不得，骨节间疼痛。

【使用禁忌】

血虚发痉及阴虚火旺者慎服。

苍耳子



【别名】牛虱子、苍耳实、只刺。

【来源】为菊科植物苍耳子 *Xanthium sibiricum* Patr. 的成熟带总苞的果实。

【野外识别特征】一年生草本，高20～90cm。全株被灰白色糙伏毛。叶互生；具长柄，叶片三角状卵形，近全缘，或有3～5不明显浅裂，基出三脉。头状花序近无柄，聚生，单性同株。瘦果2，倒卵形，包在有刺的总苞片内。花期7～8月，果期9～10月。生于丘陵、低地、荒野、路边、沟边、田边、草地等。分布于全国各地。

【药材性状】呈纺锤形或卵圆形，长1～1.5cm，直径0.4～0.7cm。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺，顶端有2枚较粗的刺，分离或相连，基部有果梗痕。质硬而韧，横切面中央有纵隔膜，2室，各有1枚瘦果。瘦果略呈纺锤形，气微，味微苦。

【性味功效】苦、甘、辛，温，有毒。散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痒。内服煎汤3～9g。

【常见病配伍】

1. 外感风寒 常与白芷、防风、羌活等配伍使用。
2. 风寒犯鼻致鼻渊 常与辛夷、白芷等配伍使用。
3. 风疹瘙痒、疥癣 常与地肤子、白鲜皮等配伍使用。

【验方精选】

1. 风邪上攻之鼻渊、鼻塞 苍耳子5g，辛夷6g，白芷9g，薄荷叶3g。研末，每次6g，以茶调服。
2. 急性毛囊炎、急慢性湿疹 苍耳子120g，苦参、野菊花各60g。水煎，洗渍患处。
3. 阴囊湿疹 苍耳子、蛇床子、甘草各10g。水煎，外洗阴囊。

【其他功用】根可清热解暑，利湿；花可祛风散热，除湿解毒。

【使用禁忌】

本品有毒，剂量过大可致中毒，故不宜过量服用。