

1988~2011

The background of the cover features a stack of several books in various colors (yellow, orange, grey, and blue). A black graduation cap with a tassel is placed on top of the books. The text is overlaid on this background.

1988~2011

西医综合
历年试题解析

研究生入学考试用书专家组 | 主编



人民卫生出版社

全国硕士研究生入学统一考试辅导用书

1988~2011 西医综合历年试题解析

研究生入学考试用书专家组 主编
卫生部教材办公室

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

1988~2011 西医综合历年试题解析/研究生入学考试
用书专家组主编. —北京:人民卫生出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-117-14217-5

I. ①1… II. ①研… III. ①现代医药学—研究生—
入学考试—题解 IV. ①R-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 085800 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医 师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

1988~2011 西医综合历年试题解析

主 编: 研究生入学考试用书专家组

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E-mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京人卫印刷厂(万通)

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 34

字 数: 1151 千字

版 次: 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-14217-5/R·14218

定 价: 69.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前 言

本书是根据教育部考试中心《2011年全国硕士研究生入学考试大纲》编写的

该书囊括了自1988年全国硕士研究生入学考试西医综合统考以来的所有真题，内容以历年试卷的形式展现，针对每道真题（除个别概念题或记忆性题目外）都给出了答案解析，并根据学科的进展情况对有关题目做出了注释。

对于该书的使用有如下建议供读者参考：

1. 西医综合经过24年的统考后真题几乎涉及了大纲要求的所有考点，每年的试卷中都会出现大量与过去真题完全相同或相似的题目已是不争的事实。反复演练真题不仅可以“抓住”考场上出现的完全相同或相似的题目；更重要的是，历年真题是一面镜子，可以映射出西医综合考试的重点在哪里考什么如何考即西医综合的命题规律。结合历年真题，读者可以更好地理解与把握考纲所要掌握的知识点。

2. 真题是否过时不应以其出现的年份为判断标准。西医综合统考已经举行24年了，可谓时间很“久”了，考试大纲所涉及的知识点也时有更新，因为有些知识点不要说是24年，就是一年内都可能有所调整，比如临床学科涉及治疗指南的知识点；但我们不要忘记了，相对于医学发展的历史长河而言，24年对于绝大多数知识点来说还只是“一瞬”。所以对于个别真题，尽管是近年刚考的真题，教材中相应的知识点也有可能调整了，但对于大多数真题，即使是1988年考过的题目，在近年的考试中也会不时重现。总体来讲，基础学科的题目过时的很少；临床学科的题目过时的相对多一些，其主要集中于治疗方面的相关考题。

3. 注重教材和真题的联系。教材是历年真题命题的依据，真题中使用的语句有不少是教材原话的摘录，有些真题之所以在有的教材中找不到直接的依据，主要的原因是在不同的教材版本间，对同一知识点的描述有所不同。这从另一个侧面提醒读者在复习的过程中尽可能结合权威的新版教材（比如目前的“第7版”教材）来学习。

编 者

2011年4月

目 录



1988 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	1
1988 年试题答案及解释	12
1989 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	21
1989 年试题答案及解释	32
1990 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	41
1990 年试题答案及解释	53
1991 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	63
1991 年试题答案及解释	75
1992 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	86
1992 年试题答案及解释	97
1993 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	107
1993 年试题答案及解释	119
1994 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	127
1994 年试题答案及解释	138
1995 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	147
1995 年试题答案及解释	159
1996 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	167
1996 年试题答案及解释	179
1997 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	188
1997 年试题答案及解释	200
1998 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	209
1998 年试题答案及解释	220

1999 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	229
1999 年试题答案及解释	241
2000 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	250
2000 年试题答案及解释	262
2001 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	272
2001 年试题答案及解释	283
2002 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	293
2002 年试题答案及解释	304
2003 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	314
2003 年试题答案及解释	324
2004 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	335
2004 年试题答案及解释	346
2005 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	357
2005 年试题答案及解释	368
2006 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	379
2006 年试题答案及解释	390
2007 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	401
2007 年试题答案及解释	416
2008 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	434
2008 年试题答案及解释	446
2009 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	459
2009 年试题答案及解释	472
2010 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	487
2010 年试题答案及解释	500
2011 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合科目试题	512
2011 年试题答案及解释	525

1988 年全国硕士研究生入学统一考试 西医综合科目试题

一、A 型题：1~69 小题。每小题 1 分，共 69 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

- 下列哪一疾病的上腹痛可采取左侧卧位而缓解
A. 消化性溃疡 B. 钩虫病 C. 慢性胃炎
D. 胃黏膜脱垂症 E. 十二指肠炎
- 下列哪一疾病的门脉高压最显著（注：此题过时）
A. 血吸虫性肝硬化 B. 肝炎后肝硬化 C. 酒精性肝硬化
D. 原发性胆汁性肝硬化 E. 原发性肝癌
- 肝性脑病患者的治疗，为了取代脑部假性神经递质，应选用
A. 多巴胺 B. 谷氨酸钾 C. 精氨酸盐
D. 去甲肾上腺素 E. 以上都不是
- 溃疡性结肠炎病变多位于
A. 回肠末段及升结肠 B. 升结肠 C. 降结肠
D. 全结肠 E. 直肠及乙状结肠
- 心房扑动时，转律首先选用
A. 毛花苷 C B. 电复律 C. 奎尼丁
D. 胺碘酮 E. 普罗帕酮
- 哌唑嗪的降压作用机制是（注：该题过时）
A. 排钠增多，使血容量减少 B. 同时阻滞 α_1 和 α_2 受体
C. 使交感神经末梢去甲肾上腺素耗竭 D. 阻滞 α_1 受体而不阻断 α_2 受体
E. 干扰肾素-血管紧张素系统
- 治疗自发性心绞痛最有效的药物是（注：名词“自发性心绞痛”已弃用）
A. 硝苯地平 B. 阿替洛尔 C. 硝酸甘油酯口服
D. 普萘洛尔 E. 维拉帕米
- 下列哪种药物可能使变异型心绞痛加重（注：此题过时）
A. 硝酸甘油 B. 亚硝酸异戊酯 C. 硝苯地平
D. 普萘洛尔 E. 维拉帕米
- 支气管哮喘持续状态很重要的治疗方法是
A. 应用抗生素 B. 应用祛痰药物 C. 补液纠正失水
D. 应用支气管扩张药物 E. 应用肾上腺皮质激素



10. 浸润型肺结核主要是由于
- 原发病灶进展而来
 - 血行播散扩散形成
 - 隐性菌血症潜伏在肺内的结核菌重新繁殖
 - 肺门淋巴结结核破溃形成
 - 与患者接触引起的感染
11. 肺心病患者测血 pH 7.25, PaCO₂ 60mmHg, BE -10mmol/L, PaO₂ 50mmHg. 诊断是
- 失代偿呼吸性酸中毒
 - 代偿呼吸性酸中毒
 - 代谢性碱中毒
 - 呼吸合并代酸
 - 正常
12. 使纤维蛋白分解成纤维蛋白降解产物的因素是
- 第Ⅵ因子
 - 活化素
 - 凝血酶
 - 纤维蛋白单体
 - 纤溶酶
13. 对急性白血病进行诱导缓解治疗的目的是
- 完全杀灭白血病细胞
 - 使体内白血病细胞减少到 10¹²
 - 使体内白血病细胞减少到 10¹⁰
 - 使体内白血病细胞减少到 10⁹
 - 以上都不是
14. 下列激素中, 哪一种为肽类激素
- 醛固酮
 - 睾酮
 - 促肾上腺皮质激素
 - 雌二醇
 - 皮质醇
15. 甲状腺功能亢进症患者用硫脲类或咪唑类药物治疗后, 症状好转, 甲状腺较以前增大, 下列哪项处理最适宜
- 加用普萘洛尔
 - 停止用药
 - 加用甲状腺片
 - 加用碘剂
 - 外科手术
- 16~18 题为传染病学知识点 (略)
19. 一个临床表现为“肾病综合征”的 15 岁患者, 经 4 周足量泼尼松治疗后, 症状明显改善, 其肾脏病理表现最可能为
- 增殖性肾炎
 - 局灶性肾小球硬化
 - 膜性肾病
 - 肾小球囊壁层上皮增生新月体形成
 - 光镜下所见肾小球基本正常
20. 给尿毒症患者含必需氨基酸为主的低蛋白饮食, 主要目的是
- 改善机体一般状况
 - 辅助提高二氧化碳结合力, 改善酸中毒
 - 利用体内非蛋白氮合成蛋白质
 - 改善肾小球的滤过功能, 使尿毒症好转
 - 以上都不是
21. 传导躯体痛觉的第二级神经元在
- 周围神经末梢
 - 脊髓丘脑束
 - 丘脑外侧核
 - 脊髓后角
 - 后根神经节
- 22~24 题为精神病学知识点 (略)
25. 无菌手术后手套未破, 连续施行一手术时应
- 直接更换手套、手术衣
 - 不必更换手套、手术衣
 - 按规定方法重新浸泡酒精 5 分钟后穿手术衣、戴手套
 - 不必重新刷手, 仅浸泡酒精 5 分钟穿手术衣、戴手套



- E. 以上都不是
26. 有效循环血量是指
- 维持正常代谢所需血量
 - 包括存于肝、脾和淋巴窦及停滞于循环中血量
 - 全身血容量
 - 单位时间内通过心血管系统进行循环的血量
 - 以上都不是
27. 深部感染体表症状哪项最重要
- 局部红热
 - 局部波动感
 - 局部肿胀
 - 局部皮肤凹陷性水肿
 - 表面皮肤过敏
28. 四岁小儿头颈部和右下肢全部烧伤, 其面积为
- 20%
 - 40%
 - 30%
 - 25%
 - 36%
29. 下列不能列为甲状腺大部切除术适应证的是
- 继发性甲亢或高功能腺瘤
 - 中度以上的原发性甲亢
 - 青少年甲亢患者
 - 有压迫症状或胸骨后甲状腺肿伴甲亢
 - 抗甲状腺药物或碘治疗后复发者
30. 下列乳房肿块可能发生 6%~8% 恶变的是
- Paget 乳头病
 - 乳房囊性增生病
 - 乳房纤维腺瘤
 - 乳管内乳头状瘤
 - 乳癌
31. 细菌性肝脓肿, 哪项是正确的
- 起病急骤, 体温可高达 39~40℃
 - 70% 为血源性
 - 大部分病例, 细菌沿门静脉入肝
 - 肝区部有剧烈的绞痛
 - 胸部有左胸腔积液
32. 大隐静脉曲张, 高位结扎手术用于
- 静脉血栓形成
 - 静脉石形成
 - 交通支瓣膜闭锁不全
 - 大隐静脉上端瓣膜闭锁不全
 - 深静脉梗阻
33. 在骨折愈合过程中, 哪项是错误的
- 血肿机化演进期约需两周方能初步完成
 - 内、外骨痂由膜内化骨而来, 环状及腔内骨痂由软骨内化骨而来
 - 原始骨痂形成期, 骨痂不断加强, 能抗拒一定应力, 即达临床愈合
 - 骨痂由血肿机化而来, 血肿较大骨痂多
 - 骨痂改造塑形期在临床愈合以后
34. 腰椎间盘突出在神经根的外侧, 则
- 腰椎凸向健侧
 - 腰椎凸向患侧
 - 腰椎无侧凸
 - 腰椎前凸消失
 - 腰椎前凸增加
35. 早期滑膜结核与类风湿关节炎最可靠的鉴别诊断是
- 单一关节肿痛
 - 血沉高于正常
 - X 线照片关节间隙变窄
 - 经组织切片检查
 - 结核菌素试验
36. 一般良性骨肿瘤
- 生长慢有症状
 - 生长快无症状
 - 生长慢无症状
 - 生长快有症状
 - 生长慢有疼痛

- 4



- C. 胰高血糖素促进生长抑素的分泌
D. 生长抑素抑制胰岛素的分泌
E. 胰高血糖素促进胰岛素的分泌
52. 以下关于月经周期的描述, 错误的是
- A. 在 FSH 作用下, 卵巢的卵泡期开始
B. 排卵前血中雌激素逐渐增多, 形成第一次高峰
C. 月经前半期, 由于雌激素负反馈作用, 出现 LH 分泌高峰
D. 在 LH 高峰作用下, 卵泡排卵, 卵巢进入黄体期
E. 黄体发育, 雌激素、孕激素大量分泌, 子宫内膜进入分泌期
53. 在下列检测蛋白质的方法中, 哪一种取决于完整的肽键
- A. 凯氏滴定法
B. 双缩脲反应
C. 280nm 紫外吸收法
D. 茚三酮反应
E. 纳氏试法
54. 真核生物 mRNA 的 5' 末端的帽子结构是
- A. $-mGpppXm$
B. $-m^2CpppXm$
C. $-m^2ApppXm$
D. $-m^7GpppXm$
E. $-m^7ApppXm$
55. 酶抑制作用的研究有助于了解一些方面的内容, 例外的是
- A. 酶活性中心功能基团的组成与性质
B. 酶的专一性及其类型
C. 酶的作用机制
D. 药物和毒物的作用机制
E. 活细胞内酶活性的调节方式
56. 下列何种营养成分缺乏可造成体内丙酮酸积累
- A. 吡哆醇
B. 硫胺素
C. 叶酸
D. 维生素 PP
E. 生物素
57. 下列哪种物质不是高能化合物
- A. 3-磷酸甘油醛
B. 磷酸肌酸
C. 1, 3-二磷酸甘油酸
D. 乙酰 CoA
E. 磷酸烯醇式丙酮酸
58. DNA 复制是按半保留方式进行的。如将一个完全放射标记的双链 DNA 分子放入不含有放射标记物的溶液中, 进行两轮复制, 如此所产生的四个 DNA 分子的放射活性将会
- A. 半数分子没有放射性
B. 所有分子都有放射性
C. 半数分子的两条链都有放射性
D. 一个分子的两条链都有放射性
E. 四个分子都不含放射性
59. 关于核蛋白体上的移位, 下列哪种陈述是正确的
- A. 空载 tRNA 的脱落发生在 A 位上
B. 肽酰-tRNA 的转位要求 EF-G 和 GTP
C. 核蛋白体沿 mRNA 3' → 5' 方向相对移动
D. 核蛋白体与 mRNA 相对移动距离相当于 1 个核苷酸的长度
E. 肽酰-tRNA 由 P 位转向 A 位
60. 有关变构酶的叙述哪项是错误的
- A. 能接受变构调节的酶常是两个以上的亚基组成的聚合体
B. G-6-P 是己糖激酶的抑制变构剂
C. AMP 是磷酸果糖激酶的激活变构剂
D. ATP 是柠檬酸合酶的激活变构剂
E. 乙酰 CoA 是丙酮酸羧化酶的激活变构剂
61. 关于未结合胆红素在肝内的转变, 下列哪种说法是正确的

- A. 不经过转变直接由胆道排出
- B. 正常情况下主要与 1 分子葡萄糖醛酸形成复合物
- C. 胆红素-硫酸酯约占总结合胆红素 30%
- D. 葡萄糖醛酸的半缩醛基与胆红素上羟基形成苷
- E. 葡萄糖醛酸的半缩醛基与胆红素丙氨酸的羧基形成酯

62. 从下列患者动脉血样的血化分析结果分析最可能的情况, $\text{pH}=7.46$, $\text{PCO}_2=27\text{mmHg}$, $\text{PO}_2=98\text{mmHg}$, $[\text{HCO}_3^-]=23\text{mmol/L}$, $[\text{Cl}^-]=110\text{mmol/L}$, $[\text{Na}^+]=140\text{mmol/L}$, $[\text{K}^+]=3.5\text{mmol/L}$, $[\text{Glu}]=5\text{mmol/L}$

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性(高氯性)酸中毒
- D. 代谢性(高乳酸性)酸中毒
- E. 代谢性(高酮性)酸中毒

63. 患者,男,40岁,腹胀、食欲不振3个月,颈部有两个蜘蛛痣,肝肋下4cm,质硬,腹水中抽出淡红色腹水少许,比重1.013。诊断可能是

- A. 肝硬化
- B. 门静脉血栓形成
- C. 结核性腹膜炎
- D. 原发性肝癌
- E. 胰源性腹水

64. 胸腔积液患者,液检查:比重1.018,蛋白2.7g/dl,利凡他试验(+),红细胞200/mm³,白细胞300/mm³,淋巴细胞82%,细菌阴性,应首先考虑为

- A. 漏出性胸腔积液
- B. 血性胸腔积液
- C. 渗出性胸腔积液
- D. 乳糜性胸腔积液
- E. 化脓性胸腔积液

65. 女,18岁,两个月来脸色苍白,月经过多,肝、脾未触及,血红蛋白7g/dl,白细胞 $2.9 \times 10^9/\text{L}$,血小板 $21 \times 10^9/\text{L}$,分别在髂前上棘及髂后上棘骨髓穿刺未取得骨髓,胸骨片显示骨髓增生尚活跃,粒、红二系成熟停滞于晚期,全片未见巨核细胞。诊断为

- A. 缺铁性贫血
- B. 原发性血小板减少性紫癜
- C. 急性白血病
- D. 再生障碍性贫血
- E. 脾功能亢进症

66 题为传染病学知识(略)

67. 女,30岁,三天前不慎扭伤腰部,次日感畏寒、高热(39.5°C)伴恶心,腰痛及尿频、尿急。检查:左腰部轻叩痛。为明确诊断应首选下列哪项检查

- A. 腹部平片
- B. 血培养
- C. 核素肾扫描
- D. 尿常规
- E. 静脉肾盂造影

68. 急性粘连性肠梗阻3天患者,中度缺水,血压90/70mmHg,血清钠140mmol/L、钾3.5mmol/L、二氧化碳结合力35mmol/L,应先输下列哪种液体

- A. 0.3%氯化钾液
- B. 5%碳酸氢钠液
- C. 平衡盐液
- D. 5%氯化钠溶液
- E. 5%葡萄糖溶液

69. 男性,42岁,餐后上腹隐痛4年,此次饱餐后突发上腹刀割样剧痛2小时,疼痛很快扩散到全腹。体检:脸色苍白,出冷汗,体温 36.5°C ,脉搏96次/分,血压110/80mmHg,全腹压痛、反跳痛、肌紧张,以中上腹最明显,肠鸣音消失,白细胞 $12\,000/\text{mm}^3$,中性80%。为协助诊断,首先应作哪项检查

- A. 急查淀粉酶
- B. 急症胃镜检查
- C. 急症钡餐检查
- D. 腹部站立位X线透视
- E. 急查尿淀粉酶

二、B型题:70~87小题。每小题1分,共18分。A、B、C、D、E是其下两道小题的备选项,每小题只能从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 硝普钠
- B. 胺咪啉
- C. 异丙基肾上腺素

- 上面分别表示嘌呤环结构中各原子的编号, 下面各题所述化合物分别提供哪些原子



87. 天冬氨酸

三、C 型题：88~97 小题。每小题 1 分，共 10 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，每小题只能从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 出血坏死型胰腺炎
B. 隐性心肌梗死
C. 两者都是
D. 两者都不是
88. 可发生猝死
89. 可伴有休克
A. 起病急骤、寒战、高热
B. 经治疗后肺部病变完全消退，肺组织恢复正常
C. 两者都有
D. 两者都无
90. 肺炎球菌肺炎
91. 干酪性（结核性）肺炎
A. 代谢性碱中毒
B. 代谢性酸中毒
C. 两者均可
D. 两者均否
92. 等渗性缺水可发生
93. 高渗性缺水可发生
A. 起源于肌肉本身
B. 整体中受中枢神经系统和体液因素的调节
C. 两者均是
D. 两者均不是
94. 胃肠平滑肌的自律性运动
95. 胃肠平滑肌的基本电节律
A. 交感神经支配
B. 副交感神经支配
C. 两者均有
D. 两者均无
96. 肾上腺髓质受
97. 一般汗腺受

四、X 型题：98~150 小题。每小题 1 分，共 53 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有一项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。

98. 可用于十二指肠溃疡的药物是
A. 西咪替丁
B. 安定
C. 前列腺素 E₂
D. 延缓释放型甘珀酸
99. 结核性腹膜炎腹水检查中，不正确的是
A. 偶见乳糜样腹水
B. 其比重一般超过 1.018，蛋白含量在 30g/L 以上
C. 合并肝硬化时其腹水性状接近漏出液
D. 腹水浓缩多能找到结核杆菌
100. 肝细胞性黄疸时胆红素变化的特点是
A. 血清非结合胆红素增高
B. 血清结合胆红素增高
C. 血清凡登白试验（注：该实验现已淘汰）呈双相反应
D. 尿中胆红素阳性

- 9



- C. 视网膜微血管病 D. 冠状动脉粥样硬化症
114. 用普通显微镜检查涂片能确定诊断的病原体是 (注: 目前大纲没有要求)
- A. 皮肤瘀点涂片查脑膜炎双球菌 B. 粪便涂片查痢疾杆菌
- C. 粪便涂片查阿米巴原虫 D. 咽拭子涂片查溶血性链球菌
- 115~116 题为传染病学知识点 (略)
117. 肾脏产生的内分泌激素包括
- A. 肾素 B. 促红细胞生成因子
- C. 前列腺素 D. 降钙素
118. 慢性肾炎的主要病理类型有
- A. 系膜增生性肾炎 B. 膜性肾病
- C. 局灶节段性肾小球硬化 D. 膜性增生性肾炎
119. 关于高血压性脑出血正确的是 (注: 该题不严谨)
- A. 内囊附近出血最多见 B. 脑干出血以脑桥最多见
- C. 病因以高血压和动脉硬化多见 D. 脑室积血多为脑实质出血破入脑室所致
- 120 题为精神病学知识点 (略)
121. 输血发生溶血反应时应
- A. 减慢输血速度 B. 肌注肾上腺素
- C. 静滴 0.3% 氯化钾液 D. 静注 5% 碳酸氢钠液
122. 神经干阻滞麻醉的特点
- A. 麻醉剂量小而产生较大的麻醉区 B. 无生理干扰
- C. 效果好而安全 D. 施麻醉后不致产生并发症与副损伤
123. 基底细胞癌
- A. 恶性程度较低 B. 手术切除效果好
- C. 呈鼠咬状溃疡 D. 隆起呈菜花状
124. 腹外疝的组成包含
- A. 疝环 B. 疝内容物
- C. 疝外被盖 D. 疝囊
125. 急性腹膜炎的患者, 取半卧位的目的是什么
- A. 使脓液集中盆腔便于引流 B. 避免膈肌压迫、有利呼吸和循环
- C. 减少毒素吸收 D. 减少肠粘连的发生
126. B 超扫描诊断胆道疾病, 方法上不足之处为
- A. 肥胖患者难以判断病变 B. 肠腔胀气过多难以判断病变
- C. 病灶过小时难以发现 D. 肝内胆管 $< 4\text{mm}$ 常不显示
127. 下列哪种情况反映急性胰腺炎的病情严重
- A. 休克 B. 血糖增高
- C. 血钙降低 D. 血、尿淀粉酶明显升高
128. 经软骨内化骨形成的原始骨瘤是
- A. 外骨瘤 B. 环状骨瘤
- C. 内骨瘤 D. 腔内骨瘤
129. 骶 1 神经根受压可出现
- A. 小腿上外侧皮肤感觉减退 B. 外踝部皮肤感觉减退
- C. 趾根部皮肤感觉减退 D. 足背外侧皮肤感觉减退



130. 急性化脓性关节炎的治疗原则是
- A. 早期足量有效抗生素肌注或静滴 B. 局部固定
- C. 关节内注入抗生素 D. 关节切开引流
131. 肾、输尿管结石手术治疗指征 (注: 该题过时)
- A. 直径大于 1cm B. 引起梗阻, 影响肾功能
- C. 非手术疗法无效 D. 引起急性无尿
132. 肾损伤血尿停止后再次出血是由于
- A. 未用止血剂 B. 过早活动
- C. 未用抗生素 D. 局部感染
133. 腹腔镜胆囊切除术的适应证是
- A. 慢性胆囊炎、胆囊结石 B. 急性胆囊炎
- C. 胆囊息肉 D. 胆管结石
134. 缩窄性心包炎的主要临床表现
- A. 肝脏肿大, 腹水 B. 心界不大或稍大
- C. 奇脉 D. 多伴有心脏杂音或肺气肿
- 135~136 题为神经外科的知识点 (略)
137. ABO 血型系统的抗体是
- A. 天然抗体 B. 多是 IgM
- C. 不透过胎盘 D. 温抗体
138. 急性失血时, 交感神经的调节作用可引起
- A. 阻力血管收缩 B. 容量血管收缩
- C. 心率加快 D. 心输出量增加
139. 肺顺应性
- A. 在平静呼吸范围内大于在深吸气量范围内
- B. 30 岁时大于 10 岁时
- C. 大于肺和胸廓的总顺应性
- D. 在肺充满生理盐水时大于肺充满空气时
140. 调节胰液分泌的神经体液因素有
- A. 迷走神经兴奋 B. 胃泌素
- C. 促胰液素 D. 支配胰的内脏大神经
141. 营养不良患者肾的浓缩功能减弱, 这是由于
- A. 肾小球滤过率增加 B. 抗利尿激素分泌减少
- C. 血浆胶体渗透压下降 D. 尿素生成减少
142. 突触后抑制
- A. 是通过抑制性中间神经元实现的
- B. 突触后膜呈超极化
- C. 回返性抑制和交互性抑制均属突触后抑制
- D. 由一个兴奋性神经元直接引起下一个神经元的抑制
143. 类固醇激素作用机制 (注: 该题相关的知识点已经更新)
- A. 启动 DNA 转录 B. 促进 mRNA 形成
- C. 诱导新蛋白质生成 D. 也可直接作用于细胞膜
144. 使变性 DNA 复性的条件是