

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣目錄

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

妄言見鬼發狂證治

妙香散

小調經散

虛煩證治

人參當歸湯

當歸補血湯

失笑散

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

四物湯

欬證治

旋覆花湯

麥冬地黃湯

加味佛手散

六味地黃湯

衄血證治

人參澤蘭葉湯

痢證總括

痢疾證治

柳連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

四物湯

十全大補湯

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

四物湯

瘡疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

生化湯

二陳湯

葶勞虛羸總括

葶勞虛羸證治

三合散

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

大便秘結

小便淋閉

加味四物湯

四物湯

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

補中益氣湯

六味地黃湯

大便出血

加味芩連四物湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯

敗血成癰

加味生化湯

生化湯

產後虛實宜審

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

大和國

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

產後血虛心氣弱驚悸恍惚不安寧養心須用茯神散參耆地
芍桂茯神琥珀龍齒歸牛膝憂思歸脾砂齒靈

註

產後血虛心氣不守神志怯弱故令驚悸恍惚不寧也宜

用茯神散其方乃人參黃耆熟地白芍桂心茯神琥珀龍

齒當歸牛膝也若因憂愁思慮傷心脾者宜歸脾湯加珠

砂龍齒治之

歸脾湯

方見首卷

妄言見鬼發狂證治

妙香散

產後譫狂見鬼神敗血冲心小調經心虛悶亂妙香散二挾參
耆遠志辰甘桂木麝山藥末歸地煎調效若神

註

產後敗血冲心狂亂見鬼譫言妄語者宜服小調經散若

因心血虛神不守舍而悶亂者則用妙香散卽茯苓神
人參黃耆遠志辰砂甘草桔梗木香麝香山藥爲散以當
歸熟地煎湯調服卽愈其效如神

虛煩證治

人參當歸湯

產後血虛煩短氣人參當歸湯最良參麥歸芍熟地桂瘀血衝心失笑方去血過多煩躁甚須用當歸補血湯

產後血虛心煩短氣者宜人參當歸湯卽人參麥冬當歸白芍熟地肉桂也若因敗血冲心者宜服失笑散若去血過多煩而躁者乃亡血證也宜當歸補血湯

當歸補血湯

失笑散

方俱見首卷

發渴證治

後集醫宗金鑑卷四十八
參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

氣虛津短參麥飲血虛四物粉麥煎渴甚竹葉歸耆效參耆
耆竹葉甘

註

產後氣虛津液不足而渴者宜參麥飲卽人參麥冬五味
子也血虛而渴者宜四物湯加花粉麥冬若渴甚不解者
用竹葉歸耆湯其方乃人參白朮當歸黃耆竹葉甘草煎
服也

四物湯

方見首卷

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黃湯

加味佛手散

產後欬嗽感風寒旋覆花湯荆穗前麻杏牛苓赤芍藥五味甘草棗薑煎虛火上炎冲肺嗽麥味六黃滋化源瘀血入肺佛手散加入桃紅杏貝延

註

產後欬嗽若因起動太蚤感冒風寒者用旋覆花湯即荆芥穗前胡麻黃杏仁半夏茯苓赤芍藥五味子甘草旋覆棗薑也若因陰虛火炎上燥肺金而嗽者宜六味地黃加

麥冬五味子名麥味地黃湯滋其化源若因瘀血上冲入肺而嗽者宜佛手散加桃仁紅花杏仁川貝母延胡索以破其瘀其嗽自愈

六味地黃湯

佛手散

方俱見首卷

衄血證治

人參澤蘭葉湯

產後口鼻黑而衄胃絕肺敗藥難醫參蘭丹膝生熟地童便多

冲薑萬一

詩

產後惡露不下虛火載血上行溢出血竅不循經脈變黑

色見於口鼻為熱極反兼水化故曰胃絕肺敗藥難醫也
或用人參澤蘭葉湯即人參澤蘭葉丹皮牛膝生地熟地
煎湯多冲童便飲之間有得生者然亦希冀於萬一者耳

痢證總括

產後痢名產子痢飲食生冷暑寒干裏急後重有餘病日久滑
脫不足看赤黃稠黏多是熱清散鴨澹定屬寒寒熱溫清調補
澁虛實新久要詳參

註

產後痢者名產子痢多因飲食不調貪食生冷或起居不
慎衝寒受暑所致若腹中病痛裏急後重者屬有餘之證
若日久虛寒滑脫者屬不足之證痢色黃赤稠黏多屬於

熱清稀澄澈如鴨糞者則屬於寒治之之法熱者清之寒者溫之冷熱不和者調之虛者補之實者瀉之虛實新久之間宜細心詳察也

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

熱痢槐連四物效冷熱有餘芍藥湯芍藥苓連歸木草枳桂墜
枳痛大黃虛寒滑脫參朮桂芍藥訶藟廣木香甘草粟殼名養
藏日久十全大補良

註
熱者清之故熱痢宜槐連四物湯即四物湯加槐花黃連
以清熱而堅腸也冷熱不和者調之故宜芍藥湯即白芍
藥黃芩黃連當歸木香甘草肉桂枳榔墜者倍加枳榔痛
加生大黃也若虛寒滑脫則宜溫補而固澁之宜真人養
藏湯即人參白朮白芍藥肉桂肉豆蔻訶子木香甘草罌
粟殼同煎服也若日久不止氣血大虛宜十全大補湯補
之

四物湯

十全大補湯 方俱見首卷

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

有表痢用敗毒散羌獨枳梗共柴前參苓芍草薑葱引暑濕成痢用香連血滲大腸成血痢四物膠榆餘鰓添

註

外感風寒成痢者宜人參敗毒散即羌活獨活枳殼桔梗柴胡前胡人參茯苓川芎甘草薑葱引也若因暑濕致痢宜香連丸即黃連木香爲丸也若敗血滲入大腸成血痢者宜四物加阿膠地榆血餘烏鰓魚骨服之

四物湯

方見首卷

瘧疾