

時疫辨卷三

侯官林慶鈺藥叟述

男象樞校刊

新會區德森子靜箋

瘟有九種

疙瘩瘟

即今之鼠疫也。邪毒分布三焦，有推墻倒壁之猛。

瓜瓢瘟

此症與疙瘩病相同，治亦相同。近來呼為標蛇者，即此。

林藥樵曰：疙瘩、瓜瓢二症，內非不病，而特現于外耳。吳又可曰：瓜瓢瘟、疙瘩瘟，緩者朝發夕死，急者頃刻而亡。此又諸疫之最重者。

時疫辨

卷三

疙瘩瘟 瓜瓢瘟

紫雪丹為核
症要藥羊城
廣芝館有之
若起惡核者
脈多不對証
當從核治不
可從脈治
子靜補箋

按溫邪本五行之毒，鬱結成精，事詳于文帝全書，非妄誕無稽之談也。故其毒之發，直搗三焦，五液立竭，病家手足荒亂，往往兩誤于藥，或誤于藥之雜投，或誤于藥之遲進。有心救世者，擇其安方，配定藥料，施送與人，茲將三辨分詳于後。

辨脈：或急數，或雀喙，或寸口熱如火灼，或六脈沉伏不見。以上怪脈，確是此症。若遲緩浮緊，或夾風寒，不可錯認為此症也。

辨症：或寒熱交作，或先冷後熱，或頭痛如裂。



或譫語或狂亂。或默默不語。兩腋窩痛結核。兩胯縫痛結核。或如蚊咬風痕而後痛。或喘氣不絕。或自汗不止。或手足厥冷。或身如火熾。或目紅面赤而青慘。或腹痛不已。或大吐乾嘔。或大泄如注。或大渴思水。或煩燥如狂。或發病失音。或手足冷過節。或痰中見紅。辨舌。或極黃。或極黑。或白厚如粉。或苔如刺。生口糜。或舌心黃黑而厚。要分別下藥。庶不張冠李戴。要參看四家疫治撮要。

時疫辨

卷三

辨症辨舌 痧瘧瘧

二

此症脈象變幻無常。可據而不可據。不可據而可據。

李東垣普濟消毒飲。見上卷第六頁統治諸疫之神方。如用之

不應。宜重用解毒方法。瓜瓢瘟亦用涼膈散。方見第四卷第

二。第二卷所立八門變法中有通解五毒等方。並周

華亭六方皆可擇用。十八頁後驗方數十條。屢見功

效。不可輕視。

溫疫忌升表外。亦慮陷邪。所以紫雪丹。至寶丹。

牛黃丸。三丸爲此症之聖藥。葉天士用白虎犀角輩。

必加至寶丹幾分。卽此意也。

藥叟案治鼠疫要內外
科合參王洪緒林藥樵

喻氏治痧以解毒爲主。卽又可之專用。大黃葉氏之金汁銀花。同用松峰之青蒿綠荳。皆此意也。子靜補箋

用以開竅使經絡無痰瘀。難留。阻礙則疫氣

第二卷所製
通解五毒飲
與入面通飲
等方甚妙清
熱消毒開堅
破瘀氣分血
分之熱盡解
周華亭六方
是宗又可法
將承氣為主
藥以白虎加
減亦可酌用
子靜補箋

王清任 傷寒由經絡而入太陽。溫病由口鼻而入太陰。諸書

蓋邪之入。鼻氣通於肺。口氣通於胃。肺病逆傳則為心。包上焦病。不治則傳中焦。胃與脾肺主皮毛。故毒外發。溫毒外腫。水仙花膏主之。並主治一切癰毒。按水仙花得金水之精。隆冬開花。味苦微辛。寒滑無毒。苦能降火敗毒。辛能散邪熱之結。寒能勝熱。滑能利疾。其妙用全在汁之膠粘。能拔毒外出。使毒邪不致深入臟腑傷人也。

水仙膏方

時疫辨

卷三

生核辨 吃瘡瘟 瓜瓢瘟

三

水仙花根不拘多少。剝去老赤皮與根鬚。入石臼搗如膏。敷腫處。中留一孔。出熱氣。乾則易之。以肌膚上生黍米大小黃瘡為度。

溫毒敷水仙膏後。皮間有小黃瘡如黍米者。不可再敷。

若水仙膏過敷。則痛甚而爛。急用三黃二香散主之。三黃取其峻瀉諸火。而不爛皮。二香取其透絡中餘熱。而定痛。

三黃二香散方 苦辛芳香法

三黃二香散
敷平常之瘡
則可若敷惡
核未能勝病
另有數方
子靜補箋

劉星然明府
云近有用蛇
精角吸毒一
蓋用蛇精一
個口向核處
吃毒預備人
乳一酒杯聽
俟蛇角吸毒
後將蛇口放
人乳中吐出
毒血又將蛇
角吸毒四五
次毒盡核銷
而愈查蛇角
閩粵省城藥
房皆有之

黃連

壹兩

黃柏

壹兩

生大黃

壹兩

乳香

五錢

沒藥

五錢

右爲極細末初用細茶汁調敷乾則易之繼則用香

油調敷

溫毒神昏識語者先與安宮牛黃丸紫雪

丹之屬繼以清宮湯

牛黃丸紫雪丹二方見卷二八門變法清宮湯見本卷十七頁

拔毒方

拔毒以草薺子之力最大

草薺子

葱頭

酒糟

右三味搗爛熱敷甚效

又方

熊胆

川連

梅片

牛黃

川射

毛姑

共研末用香油敷患處

時疫辨

卷三

外治諸法 疔瘡瘰

四

又外塗方

熊胆

射香

紅升丹

消毒丸

治時疫疔瘡惡症大黃牡蠣煨白礬蚕炒各壹兩右爲末蜜丸彈子大每壹丸新井水化

外治法 或用猴棗

用新頂蓋磨水塗之

或用水螬爬吸

之

法與眉頭所說蛇角治同

或用鐵鉗以鐳之

粵東溫病初有武官某用鐵鉗將鼠核鐳散活

人無

或用尖刀割之

申報載粵東有某甲生癰自料必死忍痛用刀自割生核

處出毒

以上外治之法于鼠癰多奏效如未生癰不

可亂用

光緒乙未後粵省醫疔瘡瘰新出涼膈散諸方茲

樞見

由羊城摘抄十餘則按之極有理路特補登之

雙解散

大黃式錢 芒硝式錢 羌活叁錢 蟬退十式 羌黃七分

防風壹錢 薄荷壹錢 芥穗壹錢 當歸壹錢 白芍壹錢

黃連壹錢 連翹壹錢 枝子壹錢 黃芩叁錢 桔梗式錢

石膏六錢 滑石叁錢 甘草壹錢

神解散

羌活壹錢 蟬退五個 神曲叁錢 銀花式錢 生地式錢

木通壹錢 車前壹錢 酒苓壹錢

如起核先服神解散後服

時疫辨

卷三

疔瘡瘟 瓜瓢瘟

活血解毒散

連翹叁錢 葛根式錢 生地五錢 銀花叁錢 赤芍叁錢

甘草式錢 柴胡叁錢 桃仁八錢 只壳壹錢 當歸式錢

紅花五錢 車前叁錢

溫病陰枯血燥邪熱不退養陰熱自退

又方

生蚌 茶仔 春爛外敷此核 另春蚌汁飲之即

時見紅氣暈開喉內似有虫行狀口氣更臭異常俟

大便瀉出如痰涎

又茶仔少許加黃糖煎水飲之

草菓 叁錢 知母 叁錢 川朴 叁錢 山甲 叁錢 黃芩 叁錢

龜板 叁錢 甘草 壹錢 鱉甲 叁錢 大黃 五錢

又起核用 水浮蓮 卽豬蓮 艾碎葉搗到極爛加 雄

黃精末 硫黃末 火水 此味最緊要

以上五味和勻再加正大梅片末同敷毒核留小孔
出毒敷後極痛兩點鐘久換藥一次大半日起無數
小泡一日小泡貫成大泡切勿自行刺穿再敷藥一
天其毒盡出轉了白色皮起皺紋不用敷藥再以拔

時疫辨

卷三

疔瘡癰瓜瓢瘡

毒生肌膏藥貼之加梅片末射香做膏藥心孕婦除
去射香自愈

以上新出諸方極驗

着核生十二經穴部位加用引經藥治之甚妙但街上所賣太醫院錢鏡湖所繪人身形經穴圖不甚分明丹溪經絡圖亦簡而未詳用之不準余所試洞天奧旨身形經穴圖爲驗亦甚簡便易曉然惡核在陽

穴用藥易愈在陰穴用藥多難愈若用引經藥又藥勝其病亦或可愈子靜補箋

察看核生部位加藥引經法

案十二經脈流注腧穴一定不易之理。察核所生之部分。知某經受病最重。加以某味。則用藥較捷。因內外循脈會穴太多。不勝枚舉。今特刪繁就簡。但採十二經行度部分列後。以備施用。手之三陰從藏走手。手之三陽從手走頭。足之三陰從頭走足。足之三陽從足走腹。此內經本文也。人之經絡分布一身。太陽少陰在身之後。陽明太陰在身之前。少陽厥陰在身之側。此丹溪心法也。

時疫辨

卷三

引經腧穴經絡辨

分經絡辨加藥導之去病較速

腰背顛頂連及風府。脹痛難忍。病在足太陽膀胱經。兩目赤腫。唇乾鼻燥。腹中絞痛。病在足陽明胃經。脇肋腫脹。痛連兩耳。病在足少陽膽經。腹脹板痛。不能屈伸。四肢無力。泄瀉不已。病在足太

陰脾經

心胸中痛。身重難移。作腫作脹。病在足厥陰肝經。痛連腰腎。外腎也。小腹脹硬。病在足少陰腎經。咳嗽聲啞。氣逆發哈。病在手太陰肺經。

半身疼痛麻木左足不能屈伸病在手太陽小腸經
半身痛脹廢俛仰右足不能屈伸病在手陽明大腸
經。

病重昏沉或狂言不省人事病在手少陰心經。
或醒或寐或獨語一二句病在手厥陰心胞經。
胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極病在手少陽三焦經。
按十二經受病見症隨症施治其引經藥亦不可少今
通列手足經脈後。
手少陰心循手小指內側出其端。

時疫辨

卷三

經絡辨 吃瘡虛 瓜瓢瘡

手太陽小腸起手小指端循外側上行

手少陽三焦起手無名指端

手厥陰心胞絡又名手心主出中指端

手陽明大腸起手食指端

手太陰肺出手大指端

足厥陰肝起足大指翹毛上

足太陰脾起足大指端

足陽明胃起足次指外間又一支亦入大指端又一

支入中指外間

足少陽膽。起足四指間。
足太陽膀胱。起足小指外側端。
足少陰腎。起足小指下。

閱此便於針刺

若溫病不可用羌芷柴葛以其發散而耗津液也此六條論引經酌加不可多用若氣上逆不可用枯梗乃藥之舟楫載藥上行

行不能下降也

太陽寒水。手太陽小腸丙火。藥本黃柏羌活少用。
少陽相火。手少陽三焦甲木。柴胡青皮川芎丹皮。
陽明燥金。手陽明大腸庚金。葛根石膏厚朴。
太陰濕土。手太陰脾己土。酒白芍。葱白桔梗。
少陰君火。手少陰心丁火。獨活細辛。
厥陰風木。手厥陰心胞相火。鹽酒。

時疫辨

卷三

經絡考 疔瘡溫風熱


厥陰風木。手厥陰心胞相火。乙木。

引藥同三焦胆

區氏子靜六經圖說

太陰肺分出中府在雲門之下一寸由右手陰便
行按手太陰用藥須觀此

手太陰肺經



此圖照洞天奧旨繪若沈氏
尊生亦有此圖


時疫辨

卷三

六經圖說


手陽明經由右手商陽食指內側邊上行手陽便
若按手陽明經用藥須觀此

手陽明大腸經



足陽明胃經

由右目下承泣起行身右便右足之陽
便經穴之名太繁不及悉登祇繪足陽
明行度便可按經用藥




時疫辨

卷三

六經圖說

十一

足太陰脾經



由左足大指端內側隱白陰便上行至左脇經穴
之名不及悉登祇繪足太陽行度便可按經用藥

手少陰心經



手少陰由左手極泉陰便直行 經穴之名不及
悉登祇繪手少陰行度便可按經用藥

時疫辨

卷三


六經圖說

三

手太陽由左手小指端外少澤在手陽便上行至頭
經穴之名不及悉登祇繪手太陽行度便可按

經用藥


手太陽小腸經



足少陰 足少陰腎由左足掌心中湧泉穴上行在左腎經 足陰便上行至胸前左便 經穴之名不及

悉登祇繪足少陰行度便可按經用藥

足少陰腎經



時疫辨


卷三

六經圖說

三

足太陽由目內眦角睛明起循脊背下行至足陽便經穴之名不及悉登祇繪足太陽行度便可按經用藥

足太陽膀胱經



手厥陰心包絡經



手厥陰起自天池行右

中衝

手陰便經穴之名不及悉登祇繪手

厥陰行度便可按經用藥


時疫辨

卷三

六經圖說

古

手少陽三焦經



關冲

手少陽無名指外端次近小指之關冲行臂之陽
便上至頭顱 經穴之名不及悉登祇繪手少陽
行度便可按經用藥

足少陽膽經



足少陽起自瞳子膠下行循腹脇左便下至左足
陽便 經穴之名不及悉登祇繪足

少陽行度便
可按經用藥

時疫辨


卷三

六經圖說

五

足厥陰起足大指端大敦行間大指縫中由右足
之陰便行 經穴之名不及悉登祇繪足厥陰行
度便可按經用藥

足厥陰肝經



督脈經

督脈起唇端中央之兌端



時疫辨


卷三

六經圖說

素

任脈經

任脈起會陰兩陰間



鍼法

據洋醫說。曾剖病核者。藏腑觀之。見生核處。有血暈一條。直透心窩。嗟乎。時毒中人。如是之深。焉能不速其死。吳又可所謂膜原。王清任所謂血管者是也。按此症治法。必要內外夾攻。宜兼用靈素經鍼法。刺出毒血。邪有去路。然後再敷拔毒之藥。內服熟藥。乃有功效。古言東南卑濕。利用砭以針刺放毒血。卽砭之道也。惟症重者。經鐵難解。當用銀針。銀性無毒。針以銀製。約長二寸。上寸半爲柄。下五分爲刃。刃要三隅利。而

時疫辨

卷三

鍼法 疔瘡瘰 瓜瓢瘰

七

且銳。易於出血。瀉毒或用銀牙鍼刺之。亦可不可用鐵。視患處肌肉厚薄。以定分數。以出血爲度。如刺頭面部。則用小銀針。抽出血可也。不可太深。

鋒鍼式



清宮湯

元參心

叁錢

連子心

五分

竹葉捲心

式錢

犀角尖

式錢
磨沖

連翹心

式錢

連心麥冬

叁錢

邪入心包識
語本卷第四頁
說用牛黃丸
紫雪丹後繼
用此湯或用鍼
去毒血後餘
邪未清亦可
用此湯