

王成五

卷七
卷八

醫宗必讀

雲間李中梓士材父著

水腫脹滿

門人包時化象蕃父參
姪孫李廷芳蘅伯父訂

邪盛則大邪實則堅流者氣血虛而不流也
之脉陰氣必衰堅強之脉胃氣必損故大堅以薄病

陰為藏陽為腑
病在陽則脈在腑
病在陰則脈在臟
夫脈者皆在於藏府之外排藏府而郭胸脇腹皮膚故命曰脈胸腹者藏府

之郭也。臚中者，心王之宮城也。胃者，太倉也。哕，噎小腸者，傳送也。小腸傳送者，自下而出，胃之五竅者，閭里門戶也。

比為關蓋二十五家也。五家為軌十軌為異蓋五十家也。吉胃之五家如關里門戶。唐王安老注。汜之注。七俱

[illegible]

欬肝脹者脇下滿而痛引小腹脾脹者善噯四肢煩悵音美悵體重不能勝衣卧不安腎脹者腹滿引背央央然腰髀

痛之脹也。五臟胃脹者，腹滿胃脘痛，聞焦臭妨於食，大便難。大腸脹者，腸鳴而痛，濯濯冬重感於寒，則飧泄不化。小腸

脹者少腹脹音脹引腰而痛膀胱脹者少腹滿而氣癢三焦脹者氣滿于皮膚中輕輕然而不堅臍脹者脇下痛脹口

中苦善太息此云膈也。肝氣鬱結，勝於肺氣，則水不流通也。

厥氣在下營衛留止，寒氣逆上，真邪相攻，兩氣搏乃合，為脹也。

氣自下

邪相攻而含為脹也
 帝曰人與畜長短腸胃可不同乎岐伯曰不可
 同也人與畜長短不同而經脈之數一也人足
 下長而手短故足經脈數多手經脈數少手經
 脈之氣少於足經脈之氣也

黃帝曰才與腎肝肺脾肝聖石疝石不仁以易之山仁亡才女走也胃寒一宿用女桑自走二卵者而女同產也

而起如覆水之狀此其候也。月重月如覆水之狀此其候也。
 腫脹者寒氣客于皮膚之間。鬱鬱然不堅。腹大身盡腫。皮厚。腫脹者寒氣客于皮膚之間。鬱鬱然不堅。腹大身盡腫。皮厚。
 皮厚。皮厚。

間陽氣不行，病在氣分。故有聲如鼓，氣本無形，鼓不堅，氣無按，其腹胃而不起，腹色不變，此其候也。按散則不能，瘳之驗。

故胃而不^起其皮厚故腹色不變也。按此上兩條以按其腹隨手而起者屬水而不起者屬氣。此固然也。然氣亦有隨手而起者。水亦有宿而不起者。未可以起與不起為的。辨但當察皮厚色蒼或一身盡腫或自下者多屬氣。或自下而上者多屬水。鼓脹者腹脹身皆大與膚脹等也。色蒼黃腹筋起此其候也。內傷脾腎食中腹脹滿下食則急其象如鼓故名鼓脹。其狀與上文膚脹無異。但腹有筋起為別。膚脹布而生也。寒氣與衛氣相搏則蓄積不^起其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之著惡氣乃起瘰肉乃生。行留於腸外所有繫著故癢搔起瘰肉生也。其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移。月事以時下此其候也。雖歲越歲也。寒邪客于腸外不在胞中故無妨。胞中寒氣客於子門子門閉寒氣不得通惡血當寫不寫血以留止日以益大狀如懷子。月事不以時下皆生於女子可導而下。^{堅如石故曰石瘕}血也。子門閉塞則血留止也。

帝曰其有不從毫毛生。^{病生於內}五藏陽以竭也。津液充郭其魄獨居。孤精於內氣耗於外。內不可與衣相保此四極急而

動中是氣拒於內而形施於外治之奈何。^{氣為陽竭則不能通調水道故津液充滿于皮郭肺主氣而魄藏焉無氣}

形大而岐伯曰平治於權衡去宛陳莖微動四極溫衣絛刺其處以復其形。開鬼門潔淨府精以時服五陽以布疎滲

五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平。^{權衡四極者運動四肢也。溫則水氣易行故頭溫衣不拘腰穴名曰經刺}

膝理謂之鬼門。勝脫謂之淨府。問者發汗也。潔者淨利也。陽氣既和陰精時服由是五陽宣布陰水盡滲精血自生。形

肉自盛。骨肉與氣相保。大氣平矣。此章言胃土陽虛不能制水溢之陰也。○岐伯無石水之對必有缺文陰陽別論曰

陰陽結多陰少陽多。陰陽當沉。愚按內經之論腫脹五藏六府靡不有之。詳考全經如脉要論曰胃脉寒則脹病形篇曰胃病

者腹脹。木神篇曰脾氣實則腹脹。淫漫不利。應象論曰濁氣在上則生脹。此四條皆實脹也。太陰陽明論曰飲食

起居失節入五脹則填滿閉塞。師傳篇曰足太陽之別公孫虛則鼓脹。此二條皆虛脹也。經脉篇曰胃中寒則脹滿。方

宜論曰藏寒生滿病風論曰胃風禹寒不通失衣則腹脹。此三條皆寒脹也。六元正紀至真要等論有云太陰所至為

附腫及土鬱之發太陰之初氣太陰之勝復皆木勝之腫脹也。或曰水運太過或曰寒勝則浮或曰太陽司天太陽勝

復皆寒勝之腫脹也。或曰少陰司天少陰勝復少陽司天少陽勝復或曰熱勝則腫皆火勝之腫脹也。或曰厥陰司天

在泉厥陰之復或曰陽明之復皆木邪侮土及金氣反勝之腫脹也。由是則五運六氣亦各有腫脹矣。然經有提其綱

者曰諸濕腫滿皆屬於脾。又曰其本在腎其末在肺皆聚水也。又曰腎者胃之關也。閨門不利故聚水而從其類也。可

見諸經雖皆有腫脹無不由於脾肺腎者。蓋脾土主運行肺金主氣化腎水主五液凡五氣所化之液悉屬於腎五液

所行之氣悉屬於肺轉輸二臟以制水生金者悉屬於脾故腫脹不外此三經也但陰陽虛實不可不辨大抵陽証必熱熱者多實陰証必寒寒者多虛先脹於內而後腫於外者為實先腫於外而後脹於裡者為虛小便黃赤大便秘結為實小便清白大便溏泄為虛滑數有力為實弦浮微細為虛色紅氣粗為實色悴聲短為虛凡諸實証或六淫外客或飲食內滯陽邪急速其至必暴每成于數日之間若是虛證或情志多勞或酒色過度日積月累其來有漸每成於經月之後然治實頗易理虛恒難虛人氣脹者脾虛不能運氣也虛人水腫者土虛不能制水也水雖制于脾實則統於腎腎本水藏而元氣寓焉命門火衰既不能自制陰寒又不能溫養脾土則陰不從陽而精化為水故水腫之証多屬火衰也丹溪以為溼熱宜養金以制水使脾無賊邪之患滋水以制火使肺得清之之權夫制火固可保金獨不慮其害土乎惟屬熱者宜之若陽虛者豈不益其病哉更有不明虛實專守下則脹已之一法難得少寬於一時真氣愈衰未幾而腫脹皆作遂致不救殊可嘆也余于此証察其實者直清陽明反掌收功苟涉虛者溫補脾腎漸次康復其有不實亦不大虛者先以清利見功繼以補中調攝又有標實而本虛者瀉之不可補之無功極為危險在病名有鼓脹與蠱脹之殊鼓脹者中空無物腹皮絢急多屬于氣也蠱脹者中實有物腹形充大非虫即血也在女科有氣分與血分之殊氣分者胸心堅大而病發于上先病水脹而後經斷血分者血結胞門而病發于下先因經斷而後水脹在治法有理肺與理脾之殊先喘而後脹者治在肺先脹而後喘者治在脾以上諸法此其大畧也若夫虛實混淆陰陽疑似貴在臨証之頃神而明之其免于實實虛虛之害乎

四肢不腫位腹脹者名單腹脹難愈

兌證腹脹者身熱者死 腹脹寒熱如瘧者死 腹大脹四末清脫形洩甚為逆 腹脹便血脈大時絕者死

以上

唇黑或腫肝傷 缺盆平心傷 臍突脾傷 足心平腎傷 背平肺傷

五傷者死

陰囊及莖腫腐者死 瀉後腹脹而有青筋者死 大便滑泄水腫不消者死 水腫先起于腹後散四肢者可治先起于四肢後歸於腹者死

以上水腫

脉法盛而緊 大堅以瀉 遲而滑皆脹滿 沉而滑 浮而遲 弦而緊皆水腫 二病之脉實大者可治虛微者難治

醫案

太學何宗夏月好飲水一日太宗師發放自早起候至未申為炎威所逼飲水計十餘碗歸寓便脹悶不能食越旬日

腹如抱甕氣高而喘余視之曰皮薄而光水停不化也且六脉堅實其病暴成法當利之遂以舟車丸每服三錢香薷湯送再劑而二便湧決如泉復進一錢五分腹減如故用六君子十貼即愈

蘇州和方大大怒之後復大醉至明日目下如卧奄居七日而肢體皆腫不能轉側二便不通煩悶欲絕余診之脉堅且

大當逐其水用疎鑿飲子一服而二便快再服而四肢寬更以五皮飲服三日隨愈水腫上二案証

武林文學錢賞之酒色無度秋初腹脹冬杪遍體腫急臍突背平在法不治迎余治之舉家叩首求救哀迫余曰我非

有起死金丹但當盡心力而圖之耳即用金匱腎氣丸料大劑煎服兼進理中湯服五日無效余欲辭歸矣其家曰自

知必死但活一日則求一日之藥即使不起安敢歸咎乎勉用人參一兩生附子三錢牛膝茯苓各五錢三日之間小

便解下約有四十餘碗腹有絢文舉家拜曰皆再造之恩也約服人參四觔附子一觔薑桂各一觔餘半載而瘥此水腫之

都憲李來吳積勞多鬱肢體脹滿以自知醫輒用胃苓湯加枳殼三月以來轉加痞悶余診其脉沉濡而軟視其色黃

白而枯此虛證也宜大溫大補始猶不信爭之甚力僅用參二錢稍覺寬舒欲加桂附執不肯從余曰證坐虛寒喜行

攻伐已見既堅良言不納雖有扁倉豈能救耶越兩月果歿此氣脹之虛者

錦衣太傅徐擔寔稟質素壯病餘肥甘過度腹脹氣粗余診之脉盛而滑按之不甚虛宜以利氣之劑少佐參末惑于

多歧之說旦暮更醫余復診曰即畏參不用攻擊之劑決不可投也後與他醫商之仍用理脾疎氣之劑而安此氣脹之不實

亦不大虛者

光祿卿吳伯玉夫人患腹滿而痛喘急異常大便不通飲食不進醫者用理氣利水之劑二十日不效余診之脉大而

數右尺為甚令人按腹手不可近余曰此大腸癰也脉數為膿已成用黃耆皂刺白芷之類加參根一兩煎一碗頓服

之未申痛甚至夜半而濃血大下昏暈不支即與獨參湯稍安更與十全大補一月而愈此似脹而實非者

五皮飲治脾肺不能運行氣滿皮膚水停不利

大腹皮沈赤茯苓皮生薑皮陳皮桑白皮錢炒各一分水鍾半煎八分日三服

胃苓湯沈方見

香蘇散 治水氣虛腫小便赤澀

橘紅二錢 防己一錢 木通一錢 紫蘇葉一錢

水鍾半薑三片煎八分服

實脾飲 治陰水發腫用以實脾厚朴一錢 白朮一錢 木瓜一錢 大腹皮一錢 附子一錢 木香一錢 草果一錢 白茯苓一錢 乾薑一錢

復元丹 治脾腎俱虛通身水腫小便不通

吳茱萸一錢 桂心一錢 澤瀉一錢 肉果一錢 檳榔一錢 附子一錢 木香一錢 茴香一錢 川椒一錢 厚朴一錢 獨活一錢 白朮一錢 橘紅一錢

金匱腎氣丸 治肺脾腎俱虛通身水腫小便不通

山藥一錢 牡丹皮一錢 熟地黃一錢 白茯苓一錢 附子一錢 川牛膝一錢 肉桂一錢 澤瀉一錢 車前子一錢 山茱萸一錢

補中益氣湯 治通身水腫喘滿小便不通

導水茯苓湯 治通身水腫喘滿小便不通

瓜一錢 大腹皮一錢 陳皮一錢 砂仁一錢 木香一錢

小水漸利

沉香琥珀丸 治水腫

己一錢 琥珀一錢 杏仁一錢 紫蘇一錢 赤茯苓一錢 澤瀉一錢 葶藶一錢 郁李仁一錢 沉香一錢 陳皮一錢 防己一錢

疏鑿飲子 治通身水腫喘滿小便不通

扶苓皮一錢 檳榔一錢 水鍾半薑五片煎九分服

敷藥 治腹滿如石或陰囊腫大先用甘草嚼後用此

麴和藥攤綿紙上覆貼腫處以軟綿裹住

小胃丹 治花一錢 內炒一錢 一宿一錢 瓦器一錢 甘遂一錢 長流水一錢 浸半一錢 大戟一錢 長流水一錢 煮再用一錢 大黃一錢 濕紙一錢 裹切酒一錢 黃蘗一錢 炒一錢 三一錢

以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥白湯送下一錢 服一錢

十棗湯見陽寒

舟車神佑丸 去一切水濕痰飲如神

甘遂
芫花
大戟各一兩
大黃二兩
輕粉錢
黑牽牛四兩
青皮
木香

檳榔錢谷五

為末水丸。椒目大空。心服五丸。日三服。痞悶者多服。反煩滿。宜初服二丸。每服加二丸。快利為度。

截人每令病者先服百餘粒繼以洛川等藥投之五藥雖峻急為效極神弱者當依河間實者依戴更當下種種病出輕者一二度重者五六度方愈

六聖濬川散

大黃煨 牽牛取乳 郁李仁各一兩 木香三錢 芒硝三錢 甘遂五分 評曰諸濕為土火熱能生濕土故夏熱

濕秋涼則燥，膏致戴人治法，假令肝木乘脾土，土不勝木，求教於子，巳土能生庚金，味辛者為金，大加生薑，便

肝木然不開脾土無由行也先以舟車凡通其閉塞之路瀉其所不勝後以薑汁調瀉川散大下之是瀉其所

也戴人每言導水丸必用禹功散繼之舟車丸必以濬川散繼之

神弓導水丸
治一切因熱積聚

黃芩兩一
黃連
川芎
薄荷錢各五
大黃二兩
滑石
黑丑頭末各四兩
為末

九有血積者加桂枝五錢

加味枳朮湯

治氣為疾飲所隔心
堅張名曰氣分
枳殼炒
官桂去
紫蘇
陳皮
檳榔
桔梗
白朮炒
五靈脂炒
木香各

半夏是薑天

甘草各四
水二鍾生薑三煎一服

叔仁丸

因經水斷後至四肢
叔仁
甘遂
續通子去皮
附子
泡
郁李仁
黑牽牛炒
五靈脂研

歸
吳

玄胡索 五元花 浸洗青 十枚 去頭 解蘆 十枚 製 但 言 訖 各一 石 膏 二 為 朱 胡 九 隴

母良一用馬皮易下為難愛萬所利不多要而不取有養病善順之理

天豐去

無灰子西二碗煎至乾。薑又上五錢。煎飲。則復烏。反口。子二三。次黑水。次

美翼子微無子女

凡有魚

魚肝油 每用一匙 四十歲者

雞金黃

金塔
真沙香金石門香林五錢
去腐妙黃豆炒五錢
刀之妙一錢

滿分消

治中滿壅脹不寢者忌服
黃芩一兩 黃連錢 薑黃 白朮 人參 鹿 甘草 桂枝 一錢

白茯苓皮

大每服百

白湯下

中藥分注湯

治中滿寒膈者忌用
黃耆 吳茱萸 厚朴 製草豆蔻 黃蘗 分 益壽仁 牛黃 枳

木香 升麻 人參 青皮 當歸 黃連 澤瀉 生薑 麻黃 柴胡 乾薑 川烏 單澄 加各二
水二鍾煎一鍾服

禹餘糧丸 此方為水腫之聖藥 蛇含石 大者三兩而飲誠疏通紅細取 禹餘糧石 三兩而真針砂五兩而煎于炒乾用

青皮 京三稜 白蔞 藜蘆 當歸 五錢 為末入前三味拌勻蒸餅丸如桐子大食前白湯下三十丸至五

十丸前三味味甘遂芫花之比又有各項藥扶持虛人老人亦可服也最忌鹽一毫入口發疾愈甚服藥後即于

小便內旋去不動藏府每日三服 更以溫補真神方也

土狗一名螻蛄 乾為末用上半節即消上身之水下半身即消

積聚

靈樞曰喜怒不節則傷藏藏傷則病起于陰也清淫襲虛病起于下風雨襲虛病起于上 喜怒不節內傷于藏故起于

邪之在表也故起于上虛邪之中人也始于皮膚腠理開邪從毛髮入着孫絡之脉往來移行腸胃之間灌濯有音寒

則脹滿雷引故時切痛 孫絡脉之細者有寒則雷鳴相引不動亦得也 若陽明之經挾臍而居臍則大飢則小飢 胃大飢則小也

若于緩筋飽則痛飢則安 故與陽明之積同著于腸胃之募原痛而外連于緩筋飽則安飢則痛 若于伏衝

之脉揣之應手而動發手則熱氣下手兩股如湯沃之狀 伏衝即衝脉之在脊者以其最深故曰伏衝其上行者循背

而動起于手則熱氣下行也者于腎筋在腸後者飢則積見飽則不見按之不得 腎筋在脊內故居腸胃之後飢則腸空

也者于輸之脉者閉塞不通津液不下孔竅乾壅 凡諸輸穴皆經氣聚會之處所以通氣于上而積生也 積之始生

得寒乃生厥乃成積也厥氣生足惋生脛寒脛寒則血脉凝滯寒氣上入于腸胃則腹脹腹脹則腸外之汁沫迫

聚不得散日以成積 厥者逆也寒逆于下故生足惋言肢痛而不刺也血受寒則凝 卒然多食飲則腸滿起居不節

用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢于腸外

腸外有寒汁液與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣 食傷腸胃汁液溢膜外與血相搏乃成食積又或用力傷陰陽

有之 卒然外中於寒苦內傷于憂怒則氣上逆六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液滯滲著而不去而積皆

成矣寒邪中于外喜怒傷其內氣因寒逆則六經之輸不通溫暖之氣不行陰血凝聚血因氣逆而成積此性清率底者多有之積之始生節寒氣下逆而成積卒然多食節飲食起居而成積卒然外中節痛志外陽拔寒成積合三邪而起于下而成積也

難經曰積者五臟所生其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者六腑所成其始發無根本上下無所留止其痛無常處肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯令人嘔逆或兩脇痛引小腹足寒轉筋肺之積名曰息贍在右脇下如覆杯氣逆背痛久則喘咳心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久則令人煩心脾之積名曰痞氣在胃脘大如覆杯痞塞吐泄久則飲食不為肌膚腎之積名曰責脈發于少腹上至心若豚狀上下無時久則喘逆骨疼少氣癥者按之應手亦如五積之不移癥者假物成形如無鼈石瘕之類瘕皮厚也在肌肉之間而可見者也癖者僻也內結于隱僻外不可見也

愚謂積之成也正氣不足而後邪氣踞之如小人在朝由君子之衰也正氣與邪氣勢不兩立若低昂然一勝則一負邪氣日昌正氣日削不攻去之喪亡從及矣然攻之太急正氣轉傷初中末之三法不可不講也初者病邪初起正氣尚強邪氣尚淺則任受攻中者受病漸久邪氣較深正氣較弱任受且攻且補末者病魔經久邪氣侵凌正氣削殘則任受補蓋積之為義日積月累匪一朝夕所以去之亦當有漸太亟則傷正氣正氣傷則不能運化而邪反固矣余嘗製陰陽二積之劑藥品稍峻用之有度補中數日然後攻伐不問其積去多少又與補中待其神壯則復攻之屢攻屢補以平為期此余獨得之訣百發百中者也經曰大積大聚其可犯也衰其半而已故去積及半純與甘溫調養使脾土健運則破殘之餘積不攻自走必欲攻之無餘其不遺人天殃者鮮矣經曰壯者氣行即愈怯者著而為病潔古云壯盛人無積虛人則有之故當養正則邪自除譬如滿座皆君子一二人自無容身之地雖然此為輕淺者言耳若大積大聚不搜而逐之日進補湯無益也審知何經受病何物成積見之既確終直入之兵以討之何患其不愈兵法云善攻者敵不知其所守是亦醫中之良將也夫

脉候堅強者生虛弱者死細沉附骨者積脉也沉而有力為積脉沉緊者有寒積脉浮而牢積聚也

醫案

襄陽郡守于鑑如在白下時每酒後腹痛漸至堅硬得食輒痛余診之曰脉浮大而長脾有大積矣然兩尺按之軟不

可峻攻令服四君子湯七日投以自製攻積丸三錢但微下更以四錢服之下積十餘次皆黑而靱者察其形不倦又進四錢于是腹大痛而所下甚多服四君子湯十日又進丸約四錢去積三次又進二錢而積下遂至六七碗許脉大而虛按至關部豁如矣乃以補中益氣調補一月全愈

親家工部

王漢

鬱怒成痞形堅而痛甚攻下太多遂泄瀉不止一晝夜計下百餘次一月之間肌體骨立神氣昏亂舌

不能言已治終事侍斃而已余診之曰在証雖無活理在脉猶有生機以真藏脉不見也舉家喜曰諸醫皆曰必死何法之治而可再起耶余曰人虛之候法當大溫大補一面用枯礬龍骨栗殼檇根之類以固其腸一面用人參二兩熟附五錢以救其氣三日之間服參半觔進附二兩瀉遂減半古轉能言更以補中益氣加生附子乾薑倍五貼為一劑一日飲盡如是者一百日精旺食進瀉減十九然每日夜猶下四五行兩足痿廢用仙茅已戟丁附等為丸參附湯並進計一百四十日而步履如常痞瀉悉愈向使委信不專有一人參以他說有片語畏多參附安得有再生之日哉詳書之以為信醫不專者之藥石

社友

姚元

之內久患痞積兩年之間凡攻擊之劑無遺用矣而積未盡除形體尪羸余聞之而告其友曰稍消其半不

可伐已但用補湯元氣一復病祟全去耳元長信之遂作補丸服畢而痞果全消踰三年調理失宜胸腹痛甚醫者以痛無補法用理氣化痰之藥痛不少衰余診之大而無力此氣虛也投以歸脾湯加人參三錢其痛立止

給諫

孫啟

腹中嘈痛余按其左脇手不可近凡飲食到口喉間若有一物接之者然余曰脉大而數腹痛嘔涎面色痿

黃此虛而有濕濕熱相兼虫乃生焉當煎人參湯送檳黃丸以下虫積虫若不去雖服補湯何益豫瞻先生過畏不敢投終莫能起

倒倉法

肥嫩牡黃牛肉三十觔切小塊去筋膜長流水煮爛濾去滓取汁入鍋中慢火熬至琥珀色則成矣先令病

人斷慾食淺前一日不食夜飯設一室明快而不通風置穢桶瓦盆貯吐下之物另磁盆盛所出之溺病者入室飲

汁積至一二十杯寒則重湯溫而飲之飲急則吐多飲緩則下多先急後緩吐利俱多因病之上下而為之活法也以

去盡病根為度吐下後必渴不得與湯以自出之溺飲之非惟止渴抑且浣濯餘垢倦睡覺飢先與稠米湯次與淡稀

粥三日後方少與茶羹次與厚粥調養一月沉痾悉安以後忘牛肉數年積久形成依附腸胃回轉曲折處自非刮腸

殺胃

示

公

積聚

卷七

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

通 剖骨之神可以丸散犯其藩牆乎肉汁充滿流行有如洪水泛漲浮槎陳朽皆順流而下不可停留凡屬凝滯一洗而

新製陰陽攻積丸

治五積六聚七癰八瘕症瘕

吳茱萸

乾薑

官桂

去川烏

各黃連

半夏

橘紅

苓

厚朴

枳實

葛蒲

玄胡索

人參

沉香

琥珀

研桔梗

巴霜

為細末

皂角

六兩

煎汁泛為丸如菜豆大每服八分漸加一錢五分生薑湯送下

千金硝石丸

硝石

大黃

甘草

為細末

用三年苦酒三斤置器中

以竹片作準

每入一序刻

一痕先入大黃不住手攪便微沸盡一刻乃下餘藥

又盡一刻微火熬丸

梧子大每服三十丸忌風冷宜軟粥將

息

肥氣丸

治肝之積在左脇下

連五錢

黃

柴胡

黃連

厚朴

去開口者

甘草

廣茂

昆布

人參

各二錢

皂角

去皮

茯苓

川烏

乾薑

巴霜

除茯苓皂角巴豆為細末另研茯苓皂角為末和

勻方入巴豆蜜丸

初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從兩丸加服積去大半勿服

息黃丸

治肺之積

厚朴

黃連

京三稜

天門冬

陳皮

川烏

白豆蔻

青皮

巴霜

九法服法俱同肥氣丸

伏梁丸

治心之積起臍上

黃連

人參

厚朴

葛蒲

巴豆霜

九服法同肥氣丸

瘕氣丸

治脾之積在胃脘

厚朴

黃連

吳茱萸

黃芩

白朮

茵陳

砂仁

乾薑

奔豚丸

澤瀉

川烏

厚朴

黃連

苦楝子

酒煮

茯苓

澤瀉

葛蒲

玄胡索

附子

全蝎

獨活

烏頭

丁香

巴霜

肉桂

九服法同肥氣丸

三聖膏

石炭

用好醋

攪勻

丸

健

十全大補湯

補中益氣湯

見風

四君子湯

見風

歸脾湯

健

十全大補湯

健

十全大補湯

健

十全大補湯

健

十全大補湯

酒積輕者葛根神麴黃連白豆蔻甚者用甘遂牽牛

氣積輕者木香枳實厚朴橘紅甚者枳實牽牛

血積輕

者乾漆桃仁牡丹歸尾赤芍藥紅花甚者大黃蟲水怪穿山甲花蕊石

痰積輕者半夏瓜蒌甚者滾痰丸老痰

海石瓦楞子痰在皮裏膜外白芥子

水積輕者五苓散甚者商陸甘遂芫花

茶積輕者薑黃芝麻甚者茱萸

椒薑 癖積輕者三棱蓬朮甚者巴霜大黃

穀積輕者麥芽穀芽神麴砂仁甚者雞內金

肉積輕者山查

阿魏甚者硫砂硝

蛋積白豆蔻橘紅豆豉薑汁

茶積丁香肉桂麝香

麵積蘿蔔子薑酒煎

魚鱉積

紫蘇橘皮木香薑汁

治驚積

狗肉積杏仁山查

蟲積雄黃錫灰柝榔雷丸蕪荑樵子使君子

瘧積

反胃噎塞

反胃者食入不得入是有火也噎者食入不得入是有火也

內經曰三陽結謂之膈三陽者大腸小腸陽明也結者結熱也小腸結熱則血脈燥大腸結熱則後不固腸脫結

黃帝針經云胃病者膈噎不通飲食不下噎者噎物之門戶膈者心脾之分野不通者濁氣在胃愚按反胃噎膈總是血

液衰耗胃脫乾槁槁在上者水飲可行食物難入名曰噎塞槁在下者食雖可入良久復出名曰反胃二証總名為膈

故內經止有三陽結謂之膈一語潔古分吐証為三端上焦吐者皆從於氣食則暴吐中焦吐者皆從于積或先吐而

痛或先痛而吐下焦吐者皆從于寒朝食暮吐暮食朝吐巢氏浪分五噎十膈支派繁多惑人滋甚惟張難峰以為神

思間病法當內觀靜養斯言深中病情大抵氣血虧損復因悲思憂恚則脾胃受傷血液漸耗鬱氣生痰痰則塞而不

通氣則上而不下妨礙道路飲食難進噎塞所由成也脾胃虛傷運行失職不能熟腐五穀變化精微朝食暮吐食難

入胃復反而出反胃所由成也二者皆在膈間受病故通名為膈也噎塞之吐即潔古之上焦吐反胃之吐即潔古之

下焦吐王太僕云食不得入是有火也食入反出是無火也噎塞大都屬熱反胃大都屬寒然不可拘也脉大有力當

作熱治脉小無力當作寒醫色之黃白而枯者為虛寒色之紅赤而澤者為實熱以脉合証以色合脉庶乎無誤經曰

能合色脉可以萬全此証之所以疑難者方欲健脾理痰恐燥劑有妨于津液方欲養血生津恐潤劑有碍於中州審

其陰虧火旺者當以養血為亟脾傷陰盛者當以溫補為先更有憂志盤礴火鬱閉結神不大衰脉猶有力當以倉公

河間之法下之小小湯丸累累加用閉局自透膈間痰微微湧出因而治下藥勢易行設或不行蜜蠶下導始終勾

引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之權衡也或擬于金匱局方偏主辛溫或擬于玉机心法偏主清潤若是者皆

反胃噎塞

賴病合法耳。豈云治病乎。

死證年滿六旬者難治。稟厚善守禁忌尊信醫藥亦有生者。糞如羊屎者不治。口吐白沫者不治。胸腹嘈病如刀割者死。

脉候緊而滑者吐逆。小弱而濇者反胃或沉緩無力或大而弱為氣虛數而無力或濇小為血虛。弦為痰。滑為痰。

痰寸緊尺濇胸滿不能食而吐。難經曰脉革則吐逆。

醫案

邑軍張孟夫人憂怒之餘得食輒噎胸中隱隱痛余診之曰脉緊且滑痰在上腕用二陳加薑汁竹瀝長公伯元曰半

夏燥乎余曰溼痰滿中非此不治遂用四劑病尚不減改大半夏湯服四貼胸痛乃止又四貼而噎亦減服二十劑而

安若泥半夏為燥而以他藥代之豈能愈乎惟痰不盛形不肥者不宜與也

江夏大學方春和年近六旬多慾善怒患噎三月日進粉飲鍾腐漿餅且吐其半六脉細軟此虛寒之候也用理中湯加薑汁

半夏一劑便減十劑而日進糜粥蓋以十全大補加竹瀝

南都謝奉隔噎不通查質之物不能下咽惟用人乳醱酒飯吐沫不已求治于余余曰口吐白沫法在不治脉猶未敗

姑冀萬一用人參黃耆當歸白朮陳皮桃仁牛乳白蜜薑汁進十劑白沫漸少倍用參朮三月全安

嘉定錢遠二十五歲以鼓盆之戚悲哀過度不能食飯又十餘日粥亦不能食隨食隨吐二便閉澀自謂必死求余診

余曰脉按有力非死証也以酒蒸大黃加桃仁當歸砂仁陳皮蜜丸與服凡五服而下燥屎乾血甚多病若去數日之

間能食倍常

大半夏湯 治肥人痰盛胃反嘔吐

半夏湯洗 人參錢三 白蜜錢三 水三鍾和蜜揚之三百四十遍煎至八分服

香砂寬中湯 治氣滯胸痞 木香磨 白朮炒 陳皮 香附各一錢半 白豆蔻 砂仁 青皮 檳榔 半夏麴 茯苓

厚朴薑製一錢二分 甘草一分 水二鍾薑三片煎一入蜜少許食前服

補氣運脾丸 治脾虛噎塞 人參錢三 白朮錢三 橘紅 茯苓各五分 黃耆一錢 砂仁八分 甘草四分 半夏一錢 無

水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾食遠服

滋血潤腸湯 治血枯及死血在腸大便燥結 當歸 酒洗三錢 芍藥 煨生 地黃 各一錢五分 紅花 酒洗 桃仁 去皮炒 大黃 酒洗 枳殼 炒 水鍾

半煎七分入韭汁半酒鍾食前服

人參利膈丸 治血少便燥膈氣之聖藥也 木香 各七錢半 檳榔 各七錢半 人參 酒洗 當歸 酒洗 藿香 各一錢 甘草 各一錢 枳實 炒 大黃

酒厚朴二兩 為末水為丸 三錢白湯下

丁沉透膈湯 治虛寒嘔吐噎塞不通 白朮 炒三錢 香附 炒 砂仁 各一錢 人參 各一錢 丁香 各一錢 麥蘖 各一錢 木香 各一錢 肉果 各一錢 白豆

蔻 青皮各五錢 沉香 各五錢 厚朴 製 藿香 製 陳皮 各七錢 甘草 各五錢 半夏 湯洗 神麴 炒 草果 各二錢半 水二鍾薑三片裏一

枚煎八分服

秦川剪紅丸 治蟲血成膈氣 雄黃 研 木香 各五錢 檳榔 三錢 蓬木 煨 貫仲 去毛 乾漆 炒 陳皮 各一錢 大黃 各一錢

為末麵糊丸桐子大每服五十九米飲下

四生丸 治一切結熱 北大黃 去皮酒一兩 黑丑 淨去頭一兩 皂角 去皮生用一兩 芒硝 五錢 石為末水丸桐子大每服二三十丸

白湯下

昆布丸 治噎塞妨礙飲食不下 昆布 洗出 麥門冬 去心 訶梨勒 各一兩 天門冬 去心 木通 各一兩 大黃 炒 朴硝 各一兩 郁李仁

共炒 桂心 各一兩 羊角 各一兩 杏仁 各一兩 蘇子 炒 射干 各五錢 柴胡 各一兩 陳皮 各一兩 檳榔 各二錢 為末蜜丸桐子大

每服三十丸薑湯下

柿餅 燒 乾 性溫 酒服

白水牛喉 去兩頭節并筋膜節取下米醋一

甘蔗汁 研薑汁 每服一兩日三服即不吐

驢尿熟服半鍾日服二次便不吐

雄猪膽烘乾為末每服三錢酒下

猪胞一具烘乾為末水調服即效

千葉白欖花 乾為末水調服即效

蘆根 五兩水二升煎一升

枳頭糠 布包時時拭齒

補中益氣湯 中風理中湯見傷寒

凡反胃證得藥而愈者切不可便與粥飯惟以人參五錢陳皮二錢老黃米一兩作湯細啜旬日之後方可食粥倉廩未固不宜便進米穀常致不救

瘧疾

黃帝曰瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也 凡瘧皆名瘧昔人之解多岐伯對曰瘧之始發也先起于毫毛伸欠乃作

寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲 非也當者伏也起于毫毛者發寒也伸欠者伸欠也陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移

也 陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒陽入于陰則陽移于陰陰入于陽則陰移于陽陽移于陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也

巨陽虛則腰背頭痛三陽俱虛則陰氣勝骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則

喘而渴故欲冷飲也皆得之夏傷于暑熱氣盛藏于皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也令人汗空疎腠理開因得

秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍于皮膚之內與衛氣并居 陽暑陽氣其証多汗感而即發非不能留陰暑無汗或

感于寒者多為瘧內陽于陰者多為瘧也 衛氣者日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以

日作其氣之舍深內薄于陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也 其氣之舍深則邪在臟矣在府

日而邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會于風府日下一節故其作也晏此先客于腰背也每至於風府則

腰理開邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出于風府日下一節二十五日下至骹骨二十六日入于脊內注于伏

膂之內 項骨三節脊骨二十一節共二十四節邪氣自風府日下一節二十五日下至骹骨二十六日入于脊內注于伏膂之內

作日益蚤也 邪在伏膂循脊而上經腧節之阻故九日而出缺也邪氣內薄于五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不

能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也 此重中上之義也夏傷于暑其汗大出腠理開發因妻涼之水寒藏于皮膚之間

秋傷于風則病成矣 水寒者若水泉源也固暑受寒汗不得夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷于寒而後傷于風故先

先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧。其間二日者邪氣與衛氣客于六府而有時相失不能相得

故休數日乃作也。客猶會也邪在六府則氣逆會布故間二日或休數日也觀此則丹溪所謂子午卯酉日為少陰瘧

寅中則少陽矣丑未雖曰太陰而辰戌則太陽矣三日發者猶可以此為言帝曰夏傷于暑秋必病瘧今瘧不必應者

何也岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也。瘧病應四時者皆能為瘧秋病者寒其冬病者寒不甚于內也

春病者惡風夏病者多汗。溫瘧者得之冬中於風寒。偶寒門有溫瘧氣藏於骨髓至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大

暑腦髓燦肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出病藏於腎其氣先自內出之於外也如是者陰虛而陽盛陽

盛則熱矣衰則氣復返入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒瘧瘧者肺素有熱氣盛于身厥逆上衝中氣實而不

不外泄有所用力腠理開風寒舍于皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛其氣不及于陰故但熱而不寒。愚按經

言夏傷于暑秋為瘧瘧又言瘧瘧皆生於風又言風寒之氣不常又言汗出遇風及得之以浴此皆以風寒暑溼為言

也語溫瘧則曰風寒中腎語瘧瘧則曰肺素有熱夫冬寒既可以中腎則心肺脾肝四臟獨無冷氣之邪可以入客乎

肺熱既可以入瘧則肝脾心腎之氣鬱而為熱者獨不可以成瘧乎然語六氣者道其常語五臟者盡其變也須知風

與暑陽邪也寒與水陰邪也風者陽中之涼氣也暑者熱中之寒邪也由是則四者皆屬於寒夫夏傷于暑汗出腠理開

當風浴水淒滄之寒伏于皮膚及遇秋風新涼束之表邪不能外越陰欲入而陽拒之陽欲出而陰遏之陰陽相薄

而瘧作矣淺者病在三陽隨衛氣以為出入而一日一作深者病在三陰邪氣不能與衛氣並出或間日或三四日而

作作愈遲者病愈深也經之論瘧無漏義矣而仁齋丹溪又分瘧與食飲與血瘧與勞與牝此不過瘧之兼証耳非因

而咸瘧者也故治瘧者察其邪正淺深証之陰陽令其自蠱而府散而越之邪去則安古法有汗欲其無汗養正為先

無汗欲其有汗散邪為急然邪在陽者取汗易邪在陰者取汗難必使由陰而陽由晏而早乃得之也又熱多者涼藥

為君寒多者溫藥為主至于痰食血飲瘧勞與牝之七証各隨其甚者而兼理之世俗又有鬼瘧之名此為時行疫氣

投平胃散無不截者總之脈實証實者攻邪以治標脈虛証虛者補正以治本久瘧必虛惟人參生薑各一兩連投二

服于未發之前莫不應手取效貧困者白朮可代血虧者當歸可代近世不明表裏虛實輒用知母石膏苓連梔柏若

表未解而得此寒涼則寒邪愈固或用常山草果巴豆砒雄若正已虛而得此剋伐則元氣轉虛故夫綿延不已者皆

醫之罪耳。豈病之咎耶。

發散瘧疾。多因風暑寒溼。天之邪氣所傷。當分經絡而發汗。其七情痰食水血。皆兼見之。候隨証治之。

風瘧惡寒自汗煩燥頭疼。必先熱後寒。宜柴胡蘇葉細辛白芷羌活生薑之類。

溫瘧受冬月之寒。復因暑風而發。亦先熱後寒。如熱多者。胡小柴胡湯寒多者。湯小柴胡湯加桂。

寒瘧納涼之風。寒沐浴之水。寒先受于膝中。復因秋風涼肅而發。先寒後熱。宜羌活柴蘇生薑之類。散其太陽之邪。次

用柴胡湯。近來不問何經。但用柴胡者。非也。

瘧瘧肺素有熱。陰氣先絕。陽氣獨發。少氣煩冤。手足熱而嘔。此但熱而不寒。盛暑發者。人參白虎湯秋涼發者。胡小柴胡湯

涇瘧汗出溼浴。或冒雨。或溼襲。其証身體重而痛。嘔逆脹滿。胃苓湯加桂。藜藜蘆湯

乳瘧陽氣虛。當盛暑時。乘涼飲冷。陰盛陽虛。故但寒而不熱也。桂胡蘆湯

食瘧或肥甘無度。或生冷受傷。食滯痰生。其証飢而不能食。食則脹滿。嘔吐腹痛。青皮草果豆蔻砂仁神麴山查之類。

瘧瘧嶺南地方。天氣炎。山氣溼。多有風瘧之毒。發時迷悶。甚則狂妄。亦有不能言者。皆由血瘀于心。涎聚於脾。須疎通

六府。或大柴胡加黃木香

勞瘧或素有弱証。或因瘧成癆。十全大補湯

瘧母治之失宜。營衛虧損。邪伏肝經。脇下有塊。此証當以補虛為主。每見急攻塊者。多致不救。六君子湯加木香

鬼瘧俗以夜發為鬼瘧。非也。陰入邪分。發于六陰。紅花竹葉湯加知母。提起陽分。方可截之。惟時行不正之氣。直鬼瘧也。胃

散如雄黃桃仁

截瘧法。瘧發四五遍後。曾經發散者。方可截之。何首烏散久瘧大虛者。人參一兩生薑三兩若病邪初起。未經發散。遠用

酸收却止之劑。必致綿延難愈。或變成他証。不可不謹也。

脈候瘧脈自弦。弦數多熱。弦遲多寒。弦而浮大可吐之。微則為虛。代散者死。

醫案

太史楊方瘧發間日。脈見緊。兩發後。苦不可支。且不能忘口。便銀截之。余曰。邪未盡。而強截之。未必獲效。即使截住。