

蕙國葯方

卷五

配藥例言

Instructions in Dispensing.

一 凡書中配藥之數，多用分字，此分字乃份字之意，非兩錢分釐之分，如多製配，則每斤可作一分，少製配，則每釐亦可作一分，勿為所拘。

二 凡藥屬流質者，皆以量量之，每量可作一分，如水、酒、油藥等類是也，藥屬定質者，皆以秤稱之，每秤可作一分，如藥膏、藥散及五金等類是也。
藥方內間有流質不量者，必註一秤字。

三 凡藥方配製用一天者，乃一晝一夜也。

四 凡藥之通行常用者，其名高擡四頭，次則三頭，藥方之常用者，其方高擡兩頭，次則一頭，俱按英國本草定例。
拾四頭兩頭者皆在英國本草內，拾三頭一頭者間在法法中華本

內草

五 凡配藥之方其多少先後俱係一定不可疎忽錯亂

六 凡書所說寒暑表之度數俱以髮倫表數為準

七 凡猛厲藥與藥精等間有用一林士分作幾分者

因英國藥秤以林士為極小之數故欲少服藥

者必分林士為幾分如半林士一林士三分之一林士十分之一之數是也 搭配須宜謹慎如作丸用可同別藥仔

細研勻如要單服可用法化開然後分服如有成方照成方之法

化服

Comparative Table of English and Chinese Weights.

按西國藥秤 較 中國庫秤圖

號	林士		分	釐	毫	絲	半
$\frac{1}{2}$ gr	半	即			八	七	半
• 1gr	一	即		一	七	五	
•• 2gr	二	即		三	五		
••• 3gr	三	即		五	二	五	
•••• 4gr	四	即		七			
••••• 5gr	五	即		八	七	五	
•••••• 6gr	六	即	一	〇	五		
	七	即	一	二	二	五	
	八	即	一	四			
	九	即	一	五	七	五	
℥ss	十	即	一	七	五		
	十一	即	一	九	二	五	
	十二	即	二	一			
	十三	即	二	二	七	五	
	十四	即	二	四	五		
	十五	即	二	六	二	五	
	十六	即	二	八			
	十七	即	二	九	七	五	
	十八	即	二	一	五		
	十九	即	三	三	二	五	
℥j	二十	即	三	五			
	二十一	即	三	六	七	五	
	二十二	即	三	八	五		
	二十三	即	四	〇	二	五	
	二十四	即	四	二			
	二十五	即	四	三	七	五	
	二十六	即	四	五	二	五	
	二十七	即	四	七			
	二十八	即	四	九	七	五	
	二十九	即	五	〇			
℥ss	三十	即	五	二	七	五	

萬國藥方

卷五

叁

Comparative Table of English and Chinese Weights.

按西國藥秤 較 中國庫秤圖

號	林士		錢	分	釐	毫	絲
	三	即		五	四	二	五
	三	即		五	六		
	三	即		五	七	七	五
	三	即		五	九	七	五
	三	即		六	一	二	五
	三	即		六	三		
	三	即		六	四	七	五
	三	即		六	六	七	五
	三	即		六	八	二	五
Di	甲	即		七			
	甲	即		七	一	七	五
	甲	即		七	三	七	五
	甲	即		七	五	二	五
	甲	即		七	七		
	甲	即		七	八	七	五
	甲	即		八		七	五
	甲	即		八	二	二	五
	甲	即		八	四		
	甲	即		八	五	七	五
	甲	即		八	七	七	五
	甲	即		八	九	二	五
	甲	即		九	一		
	甲	即		九	二	七	五
	甲	即		九	四	七	五
	甲	即		九	六	二	五
	甲	即		九	八		
	甲	即		九	九	七	五
	甲	即	一	〇	一	七	五
	甲	即	一	〇	三	二	五
3j	甲	即	一	〇	五		
3ij	甲	即	二	一			

萬國藥方

卷五

肆

萬國藥方

卷五

汞

又名

HYDARGYRUM.

水銀

此原質出中國、西班牙、美國等處，有自然成者，又有丹砂造成者，常見者為紅汞礦，即丹砂純汞為亮白之金，體甚重，性為流質，冷至下三十九度則成軟鞣之定質，受大熱則沸而化氣，入藥先用熟鹿皮包扭去渣方合，或用硝強水潔淨者。

淨法

水銀

分一百

硝強水

五分

汽水

五分

先將硝強水與汽水和勻，共

入淺磁盤內，或淺玻璃盤內，浸三天，間時搖動，將酸水掙出，再用汽水將汞洗淨，上用綿紙提出水濕，晒乾為度。

功用

改病

動膽汁

瀉劑

生津液

純服汞者功力不效，必研之極細，分析星珠，纔能發其功力。

主治

新久炎症

肝腎積血

熱病類

楊梅類

按此病服汞類宜慎用，否則不惟無益，且使病變重。

服法 單服者少，下見汞類。凡服藥之後若見口損流涎，均宜停止。

外用 行血 作貼膏、油膏等用。外用與內服同效，但宜較多用。

汞貼

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

膏 製法 汞 三兩 洋橄欖油 五十六林士秤 硫磺粉 八林士 密陀僧貼膏 六兩 先將洋橄

欖油入鍋熬熱，漸加硫磺粉調極勻，入白加汞細研至不見星珠，再將密

陀僧貼膏化開加入，共調洽為度。治魚口瘡、骨節及吸核久炎變大。

阿麼

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRI.

慝汞貼膏 製法 汞 三兩 阿麼慝 十二兩 洋橄欖油 五十六林士秤 硫磺粉 八林士 先將橄

欖油入鍋熬熱，漸加硫磺粉調極勻，入白加汞細研至不見星珠，再將阿

麼慝化開加入，調洽為度。能散癭化瘤。治骨節變大。吸核變大。

楊梅骨瘤

汞搽

LINIMENTUM HYDRARGYRI.

油 製法 汞油膏 一分 淡阿摩尼亞水 一分 樟腦搽油 一分 先將淡阿摩

尼亞水與樟腦搽油半分調勻，再將汞油膏與樟腦搽油半分，入白研

勻，共調洽為度。治頑瘡、癭瘤、骨節變大。若用麻絨或綿花蘸搽。

PILULA HYDRARGYRI.

汞藍

腋下，其力更速，與內服汞藥同。

丸 製法 汞 二分 玫瑰糕 三分 甘草 一分 先將玫瑰糕與汞入臼，研至不

見星珠，再加甘草共搗勻作丸為度。治滯積，每服半至一林士，改

病，三至五林士。輕瀉，五至十林士。

汞尖

SUPPOSITORIA HYDRARGYRI.

丸 製法 汞油膏 六十分 得波麻油 一百二十林士 先將得波麻油化開，同汞油膏細

調勻，不須加熱 傾入模內，分作十二丸為度。功力與內服汞類同

汞油

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

膏 又名 汞藍油膏 製法 汞 十六分 煉豬油 十六分 煉羊油 一分 共入臼研至

不見星珠為度。

汞製

UNGUENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

油膏 製法 汞油膏 六分 黃蠟 三分 洋橄欖油 三分 樟腦 一分半 先將黃蠟與

洋橄欖油化勻，再加汞油膏調勻，微涼時，加樟腦細調勻為度。治瘦瘠

頑瘡 癰瘡類。

阿摩尼亞綠油膏 製法 汞油膏 十六分 阿摩尼亞綠 一分 調勻為度。治

UNGUENTUM HYDRARGYRI CUM AMMONIO.

汞

吸核變大

空丸

製法

汞油膏

五林

入空丸殼為度

納入肛門與尖丸同用

藍大黃丸

製法

汞藍丸

二林

大黃

三十林

甘草膏

酌用

共作十丸為度

治滯積

化名

汞溴

即

汞溴

此藥自銻溴與下硝強汞製出結白色之散

功用 改病 與青汞碘同力

服法 每服半林士

溴汞陰尖丸

製法

單溴汞

半林

得波麻油

六十林

化勻作一丸為度 治白帶

化名

汞溴

此藥自單溴汞與溴質製出或銻溴與硝強汞酸水製成結無色之水

功用 改病 與紅汞碘同力

HYDRARGYRI BIBROMIDI.
UM.

雙溴汞

PESUS HYDRARGYRI
BROMIDI.

單

HYDRARGYRI BROMIDUM.

單溴汞

PILULA HYDRARGYRI ET
RHEI.

汞

CAPSULÆ HYGRARGYRI.

汞

雙

PESSUS HYDRARGYRI BI-BROMIDI.

服法 每服一林士十六分之一，至四分之一

溴汞陰尖丸

製法

雙溴汞

半林士

得波麻油

二百四十林士

化勻，作四丸為度，治

白帶，

溴汞油膏

製法

雙溴汞

四林士

白油膏

一兩

調勻為度，治吸核變大，

雙碘汞

化名

汞碘

舊名

汞碘

此藥自雙綠汞與銻碘製成，結散色如銀珠，無味無臭，

化法

濃酒

三百分化一分

伊打

七十分化一分

銻碘水

鏽碘水，皆能化

甘油微化

水不化，

功用 改病 與雙綠汞同，而力較勝，宜慎服之，

服法 每服一林士十六分之一，至四分之一，加銻碘與水化勻易服，

外用 作油膏 治療癰類 楊梅類，

碘油膏

製法

紅汞碘

十六林士極細末

白油膏

一兩

調勻為度，

用黑色之罇盛

UNGUENTUM HYDRARGYRI IODIDI RUBRI.
紅汞

HYDRARGYRI IODIDUM RUBRUM.
紅汞 又名

紅汞 又名

UNGUENTUM HYDRARGYRI BIBROMIDI.
雙

貯放暗室內勿使見光 治瘰癧 楊梅骨痛 楊梅瘰子 癬病

治瘰癧宜用此膏 一分豬油 一分調洽用木刀間時搽患處在日光下

晒六點鐘但搽藥後必起水泡作疼宜忍之 治眼胞病類用此膏一

分白油膏 三分調勻搽患處效

汞碘水 製法 紅汞碘 三分 鈹碘 一分 汽水 四分 共化勻為度 每二林士內計有紅汞碘一林

士 外用治楊梅類病

碘勻水 製法 雙綠汞水 一打拉門 鈹碘 五林士 海碘酒 八林士 肉桂水 足一兩 共化

勻為度 作一服治楊梅類病

又名 單碘汞 化名 汞碘 舊名 汞碘

此藥自水銀與海碘及濃酒製成為綠色之散見光畧變黑宜新製不

宜久存久則變紅汞碘 非皆變為紅汞碘內中起紅點者是也

化法 水微化 酒 伊打均不化

HYDRARGYRI IODIDUM VIRIDE.

青汞碘

MISTURA HYDRARGYRI IODIDI.

汞

LIQUOR HYDRARGEI IODIDI.

紅

功用 改病 與單綠汞畧同 少服常服則藥力由吸核諸核內發出能解楊梅毒治瘰癧瘡

服法 每服半至三林士 小兒每服一林士六分之一至半林士

宜與鐵礞同服恐其變成紅汞能能力更大而傷人

外用 作油膏 治瘰癧類 楊梅類 久皮病類

汞碘丸 製法 青汞碘 一林士 鴉片 半林士 龍膽草膏 四林士 共和勻作二丸為度

汞碘油膏 製法 青汞碘 十林士 磺強丫刀邊糝 一林士 煉豬油 半兩 共調治

為度 治手指拘攣 因筋短而硬能治癱瘓者不洩

水 化名 汞淡養 一 硝強水 舊名 汞養淡養 一 硝強水

製法 汞 四分 硝強水 五分 汽水 一分 先用汽水與硝強水和勻入瓶加

此藥即汞淡養化於硝強水內無色味極酸性猛烈

HYDRARGYRI NITRATIS LIQUOR ACIDUS. 硝強汞酸

UNGUENTUM HYDRARGYRI IODIDI VIRIDIS. 青

青

PILULA HYDRARGYRI IODIDI VIRIDIS. 青

功用 上品丹劑 不宜內服

主治 楊梅疔毒及魚口便毒 癰疽瘡類 楊梅瘻瘤 潰瘡等症

强汞漱水 製法 硝強汞酸水 林士二 水 一兩 和勻為度 治楊梅結喉

强汞射水 製法 硝強汞酸水 林士一 水 二兩 和勻為度 治白帶 白濁

膏 又名 黃汞油膏

製法 汞 四分 硝強水 十二分 煉豬油 十五分 洋橄欖油 二十分 先將汞與硝強水

入瓶加文火消化次將煉豬油洋橄欖油入貯六倍之燙鍋內消化乘熱

至二百十二度將硝強水所化之汞亦熱至二百十二度加入共調至

冷為度 若加汞不發泡宜加文火令發泡後調至涼為度

外用 運血 改病

主治 久皮病類 癩瘡 潰瘡 頑瘡

反藥 樟腦 油膏類 豬油 按豬油一味臨用加之非甚不相宜惟日久則豬油能盜取藥內養氣即變色敗其功力

HYDRARGYRI NITRATIS UNGUENTUM. 硝強汞油
INJECTIO HYDRARGYRI NITRATIS. 硝
GARGARISMA HYDRARGYRI NITRATIS. 硝

(CUM VASELIN.)

淡硝
UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS DILUTUM.

油流汞
HYDRARGYREUM OLEATUM.

黃汞養
HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM.

又名

又方 汞四分 硝強水十二分 白花土玲七十分 先將汞與硝強水入瓶用

文火消化將花土玲入貯六倍之燙鍋熱至一百八十度加硝強水所

化之汞共調至涼為度若加汞不發泡宜用文火令發泡後調至涼為度 照此方配製藥易存配淡者

亦佳配此用白花土玲佳淡者黃花土玲亦可

強汞油膏製法 硝強汞油膏一分 軟巴喇紛二分 調勻為度 治皮類病

阿泐汞

見卷三油流類藥

汞養按化學名雖同紅汞養但製法不同故彼結冰此則結散

製法 雙綠汞四兩 鏹養水四十兩 汽水酌用 先將雙綠汞入八十兩汽水

內加火化勻再加鏹養水調洽候澄清降散擄出上面淨水取降散放

淋布上用汽水洗淨再入燙鍋焙乾為度

此藥結散色黃無臭見光色畧深

黃
UNGUENTUM HYDRARGYRI OXIDI FLAVI.

化法 水 濃酒均不化 硝強水 鹽強水全化

汞養油膏 製法 黃汞養 十分 煉豬油 七分 黃蠟 十八分 先將豬油黃蠟用

火化勻候冷再加黃汞養調勻為度 治皮類病

又方 黃汞養 士林 鯨腦油膏 六十士林士花士玲亦可 共調極勻為度 治眼胞類病

明角罩潰爛極妙

黃 汞養製散 製法 黃汞養 一分 煉白糖 九分細末 共研極細為度 用少許點

眼內能去雲翳

三仙丹 一名 紅粉 化名 汞養

製法 汞 八分秤 硝強水 四分半 水 二分 先將硝強水與水和勻加汞四分消

化入鍋加熱散氣至乾入白加餘汞研至不見星珠再入磁鍋熬煉慢

調至無強水之氣味為度 中華藥肆所售乃水銀火硝白礬煉成不如此法純淨

此藥結水色極紅亮味辛無臭

紅汞養 一名
HYDRARGYRI OXIDUM RUBRUM.

黃
PULVIS HYDRARGYRI OXIDI FLAVI COMPOSITA.

化法 酒 水 伊打均不化 鹽強水 硝強水 皆化

功用 改病 與雙綠汞同 但性猛烈 令人吐瀉 故內服甚少

服法 每服一林士四分之一 至一林士 加鴉片為丸服之

外用 丹類 治楊梅疔毒 頑瘡去菌肉

養油膏 製法 紅汞養 六十二林士極細末 硬巴喇紛 一百零九林士半 軟巴喇紛 三百二十林士 先將二

巴喇紛化勻 將冷時 入白加紅汞養搗勻為度 運血 治惡毒瘡

頑瘡 痰瘡 久火眼

又方 紅汞養 一分極細 黃油膏 九分 先用油膏少許與汞養磨勻 漸加油

膏共調勻為度 藥入脚風妙

粉

此即紅汞養研為極細末使用者

白降丹 又名 汞綠毒藥 又名 惡輕粉 化名 汞綠 舊名 汞綠

HYDRARGYRI PERCHLORIDUM 雙綠汞 一名

HYDRARGYRI OXIDUM RUBRUM LEVIGATUM 紅汞養

UNGUENTUM HYDRARGYRI OXIDI RUBRI 紅汞

此藥自上磺強汞與黑錳養及食鹽製成，性甚毒，無臭，色白，味辛。中華藥肆所售

乃水銀、硼砂、火硝、食鹽、硃砂、雄黃等藥煉成，不及西法純淨。

化法 水十九分 濃酒五分 伊打六分 甘油三分

功用 改病 解楊梅毒

服法 每服一林士十六分之一，至八分之一，多加水化勻沖服。過服傷人

外用 免臭爛為上品 作洗水或漱水油膏等 化水內藥臭出妙

兼洗各瘡及金刃損傷 治久皮類病 楊梅結喉

反藥 反酸類 反酸炭養類 石灰水 銀丹 葡酸鈹銻 鉛霜

蛋清 胰子 金雞納煮水 鈹碘。此雖與雙綠汞不合，未必敗其功力，間有同服者，見鈹碘。

解藥 解此毒，先用雞蛋清調水服之，後服吐劑，或用抽水節抽之，凡

受毒者，宜核計誤服四林士者，用雞蛋清一枚，或用白麪代之亦可。

汞水 製法 雙綠汞十林 阿摩尼亞綠十林 汽水二十 共化勻為度，每

LIQUOR HYDRARGYRI PERCHLORIDI. 雙綠