

蕙
國
药
方

卷四

配藥例言

一 凡書中配藥之數，多用分字，此分字乃份字之意，非兩錢分釐之分，如多製配，則每斤可作一分，少製配，則每釐亦可作一分，勿爲所拘。

二 凡藥屬流質者，皆以量量之，每量可作一分，如水、酒、油、藥等類是也。藥屬定質者，皆以秤稱之，每秤可作一分，如藥膏、藥散及五金等類是也。藥方內間有流質不
量者必註一秤字

三 凡藥方配製用一天者，乃一晝一夜也。

四 凡藥之通行常用者，其名高擡四頭，次則三頭，藥方之常用者，其方高擡兩頭，次則一頭，俱按英國本草定例。抬四頭兩頭者皆在英國本草內抬三頭一頭者間在美法中華本

五 凡配藥之方，其多少先後，俱係一定，不可疎忽錯亂。

六 凡書所說寒暑表之度數，俱以髮倫表數爲準。

七 凡猛厲藥與藥精等間，有用一林士分作幾分者。

因英國藥秤以林士爲極小之數，故欲少服藥

者必分林士爲幾分，如半林士、一林士三分之一、一林士十分之一之數是也。搭配須宜謹慎，如作丸用，可同別藥仔細研勻，如要單服，可用法化開，然後分服。如有成方，照成方之法化服。

Comparative Table of English and Chinese Weights.

按西國藥秤較中國庫秤圖

Comparative Table of English and Chinese Weights.

按西國藥秤較中國庫秤圖

萬國藥方 卷四

鈎

CALCIUM.
又名

鈣

此原質屬金類，色淡黃，可打箔如紙，加熱至紅色卽鎔，再熱則有極明白光，易與養氣化合成鈎養，爲地殼最多之質。

白鈎

一名

桃花石

又名黃山石

化名

鈎炭養

舊名

鈣養炭養

此石中西皆有，惟配光粉及炭養酸氣，別無所用。

見白鈎

光粉

化名

此粉卽白石捶碎研末，用水漂淨而成者。

外用 作撲粉

此粉不一，恐內有
別質，不宜內服。

火石粉

又名白土

化名

鈎炭養

舊名鈣養炭養

此藥由地內採出，色灰白無味，近來恆用者，多產自英法二國。

入藥用
煉者

鈎粉

一名

CRETA.

MARMOR LEVIGATUM.

煉鉻粉又名CRETA PRÆPARATA.

功用 配炭養氣製自沸水類加礦強水配製

外用 治湯火傷加水調爲稀糊塗之

淨白石粉化名鉻炭養

此卽鉻粉用水漂淨者色白無臭

化名雖與炭養鉻降散同而功力勝之

化法 淡鹽強水全化 水不化

功用 收斂 解酸 宜佐他藥和服

主治 肚酸作瀉 弓腰 瘰癧類 亦解惡西酸之毒

服法 每服十至六十林士

外用 治湯火傷 潰瘍作油膏用

反藥 酸類 磷強鹽類

勻水製法 鍊鉻粉 一分 白樹膠

一分細末

水糖 二分 肉桂汽水

三十

先將上

三味入臼研勻再漸加肉桂汽水共研勻爲度 每服一二兩 治肚

瀉加鴉片及收斂藥和服最宜。佐樟腦鴉片酒及兒茶酒和服治小兒夏月肚瀉最宜。

鈎粉

PULVIS CRETÆ AROMAT. ICUS.

香散製法 煉鈎粉十一分 肉桂四分 肉豆蔻三分 番紅花三分 丁香一分半
砂仁一分 煉白糖二十分五分 共爲末過細羅研勻爲度存玻塞瓶每服十至六十林士治飯不消化。

鈎粉

MISTURA CRETÆ AROMAT. ICUS CUM OPIC.

鴉片香散製法 鈎粉香散九分 鴉片一分爲末 共研極細過羅爲度存玻塞瓶每服十至四十林士治肚瀉。

粉香匀水

製法 肉桂製散一百八十林士 阿摩尼亞香酒三打

拉門

兒茶酒十打

拉門

砂仁一打

拉門

鈎粉匀水足二兩

共和勻爲度治霍亂每服一

兩十二歲者半兩七歲者二打拉門

每次大便後服之肚瀉症服之亦效。

又方

鈎粉香散十二分 煉鈎粉二十四林士 卡喇桿製散六林士 佳奴酒十二林士 阿

摩尼亞香酒十二分 鴉片酒六林士 薄荷水足一兩

共和勻爲度每服二至

四打拉門，加水沖服。治肚瀉。

又方 銻粉香散二十鴉片酒五林士哥羅方酒二十辣椒酒二林士各辛
汽水兩一 共和勻爲度，作一服，治肚瀉。

粉油膏製法 煉鉢粉一分，鯨腦油膏四分，調勻爲度。治湯火傷。

炭養鉢降

CALCII CARBONAS PRÆ
UNGENTUM CRETIC.

散又名炭養鉢降粉化名鉢炭養舊名鈣養炭養此化名與光粉鉢粉雖同，而形有不同，大抵光粉雖鉢粉粗，而此則細也。

製法 枯鉢綠五分炭養鉢十三分沸水八十先用水一半化鉢綠，一半化
炭養鉢，將二水和勻，候澄清，擣出上面淨水，提出降散，用沸汽水洗淨，
入鍋，加熱至二百一十二度，焙乾爲度。

此藥結散色白，無臭無味。

化法 水不化，強水類皆化而變形。

功用 解酸 收斂。

主治 夏日癰瀉 醋心。

服法 每服十至六十林士力稍遜於火石粉。

反藥 強水類 酸類 反酸鹽類 五金鹽類 葡酸銨錫、

外用 擦牙極妙、

枯鈎綠化名

CALCII CHLORIDUM EX
SICCATUM.

此藥卽鈎綠加熱至四百度煅枯者，色白成塊，味苦鹹而辛。

化法 水一分濃酒三分

功用 補劑 利小便 發表 生津液 化瘤、

主治 瘰癧 瘻瘤 腸膜核瘤、

服法 每服三至十林士、

水製法 枯鈎綠 一分汽水五分消化過淋紙爲度、 每服十五至五十

林士 治嘔吐不止 瘰癧類症、

鈎綠化名

CALCII CHLORIDUM.

萬國藥方

卷四

五

此藥自炭養鉢與鹽強水、綠氣灰及熟石灰製出結冰無色過光露空氣自化。

功用 治癩癰類病 吸核變大。

下燐養鉢
CALCII HYPOPHOSPHIS.

服法 每服五至十林士 治嘔吐每服二林士用水化 每點鐘服一次。
化名 鉛燐輕養 舊名 鈣養燐養·輕養

此藥自燐質與熟石灰鍊成者 結散色白 味苦而悶
化法 水八分化一分 酒不化

功用 補腦 補虛

主治 虛弱症 療類症 癪病 四肢無力

服法 每服五至十林士 加水化服

燐養鉢糖
製法 下燐養鉢三分水三十分 煉白糖六十分 共調至化勻爲度

每服一二打拉門

燐強鈣又名

燐強鈣降散化名 鈣燐養
舊名 鈣養·燐養

CALCII PHOSPHAS.

此藥從骨灰與鹽強水及阿摩尼亞水製成，結散色白，無臭無味。

化法 水不化 鹽強水 硝強水 醋酸皆化。

功用 補劑 改病。

主治 骨變軟 小兒弓腰 癥癧類症 骨斷折。

服法 每服十至二十林士。

元精石透光者爲元精石，化名 鈣礦養·輕養
不透光者爲石膏，化名 鈣養硫養·輕養

此石中西皆有，乃自然生成者，色白，狀如方解石。

功用 作煅石膏，西國不入藥用。

煅石膏

化名

製法

將石膏入爐，加熱不過三百度存性，去火研細爲度，玻塞瓶存貯。

鈣礦養舊名 鈣養硫養

此藥結白色之散，無臭無味。

功用 配鈎礦不宜內服。

生石灰

化名

鈎養

舊名鈣養

外用 此藥見水變硬，醫家恆用，塗抹布條內外，裹紮骨折等症，洒水變硬，使骨不移動。

石

此藥卽青石燒灰，未見水者成塊色白，遇水濕卽鬆漲，變爲熟石灰。
青石

灰石

灰化汽水

製法 新石灰
便用

入大瓶內，漸加冷水，見化氣，令病人吸之，能去白疕瘡假皮。

石灰粉

即

熟石灰

化名鈎輕養

舊名鈣養輕養

SACCHI HYDRAS.

VAPOR CALCIUS.

CALX.

此藥粉色白味鹹，屬反酸丹類。

不耐久存，臨用現配可也。

製法 生石灰三十汽水二十分，用水將石灰化爲粉，過羅入玻塞瓶爲度。

化法 水九百一十五分酒不化。

功用 解酸 平胃。

主治 肚酸作瀉 嘔吐不止 孕婦惡阻。

服法 內服皆用石灰水。

反藥 反酸類 強水類 反酸鹽類 五金鹽類 葡酸銻錫。

搽油 製法 石灰水 一分 洋橄油 一分或香油亦可 調勻爲度。

治湯火傷 解強水毒可內服之餘皆外用

水 製法 石灰粉 一分 汽水 酌用 先用汽水將石灰粉頻洗至所洗之水。

加銀丹酸水，不變渾降散爲止。

此銀丹酸水即銀丹化於水內者，加硝強酸少許。

再將石灰粉入瓶，加

汽水八十分，撞搖二三分時許，候十二點鐘，將上面淨水擣出，入綠色

玻瓶爲度。

每兩計有石灰粉半林土。

又方 石灰粉 一分 水 八十 分 和勻，候澄清擣出上面淨水爲度。每服

半至二兩。

每兩內計有石灰粉半林土。

石灰

LIMONIUM CALGIS.

甜石

LIQUOR CALCIS SACCHA
RATUS

石

LINIMENTUM CALCIS A.M.
MONIATUM.

澄清用酒搗抒出上面淨水入瓶爲度 每服十五至六十林士計有石每兩內灰粉六

灰阿摩尼亞搽油

製法石灰搽油 八分淡阿摩尼亞水 一分和勻爲度

治雀癩搽患處

綠氣灰

化名GALX CHLORINATA.

鈎養綠

舊名鈣養綠

此藥自綠氣與熟石灰製成爲白色之散味苦辛而濁臭畧似綠氣空露
氣自化而發綠氣

化法 水 濃酒化一半 淡鹽強水全化

功用 解病室毒氣 廁中臭惡 亦爲漂白之料

反藥 強水類 炭養鹽類

解藥 解此毒者 先服吐劑 後服蛋青 牛嫗 白薺等

綠氣

LIQUOR CALCIS CHLORI.
NAT. E.

灰水

製法

綠氣灰

一分 汽水 十分入白研勻，再入瓶常搖動三點鐘，濾

渣爲度。

每服二十至四十林士加水一二兩和服。

治大便腥臭。

無多外用治惡瘡、湯火傷、凍瘡、疥瘡、皮類病均以此水洗之。
內服外用治惡瘡、湯火傷、凍瘡、疥瘡、皮類病均以此水洗之。

灰化汽水

又名綠化汽水

製法 綠氣灰二兩水足用潤透灰末入瓶令

病者吸之。治疹子結喉、白疙瘩亦放屋內解諸般臭惡。

又名 鉢礦

每百分內計有
純鉢礦五十分

製法 煅石膏

七分細末

木炭一分細末調極勻入化銀鍋加熱至火紅色令黑去

盡候涼將白色者入玻塞瓶存貯。

此藥結散色灰而白，臭惡如硫磺輕氣。

功用 擺膿

有膿則生無膿則消

治各樣新膿瘡。

服法 每服一林士十分之一至一林士同蠟糖作丸，間一時服。

礦水

製法

生石灰四分

硫磺粉四分汽水三分

共入磁鍋熬之過淋紙。

以臘二十分爲度，治乾疥

用時加水一倍擦患處

令患者先沐浴後
擦藥一二次可愈。

又方

新熟石灰二分硫磺粉一分水十分共入沙鍋熬至化勻候涼

傾出上面淨水爲度。

金盞花

CALENDULA.

又名長春花

此藥各處有之入藥用花

功用解轉筋、發表、調經。

配酒用

盞花酒

製法金盞花四分

淡酒二十分

先用酒十五分浸二天裝淋筍淋

乾再加酒漂淋仍足二十分爲度每服一二打拉門

加林筆

CALUMBA.

此藥出亞非利加東偏入藥用該草之根色黃味苦而香

功用補劑開胃治胃弱惡阻

服法每服五至二十林士或佐乾薑大黃和服亦妙病勢漸愈可