

惠國新文

卷三

權量分準

Tables of Weights and Measures.

藥秤 自林士爲始

砝號 1gr. 或

四百三十七林士半爲一兩。西名一安士。

砝號 1oz.

十六兩爲一觔。西名一磅。

砝號 1lb.

兩內有常用之砝碼開列於左。

十林士爲半士古倍。

砝號 1lb.

二十林士爲一士古倍。

砝號 1lb.

三十林士爲半打拉門。

砝號 1lb.

四十林士爲二士古倍。

砝號 1lb.

六十林士爲一打拉門。西名一地廉。

砝號 1lb.

一百二十林士爲二打拉門

砝號 猶

以上六等砝碼原不屬於常秤因其便宜故用之

一百零九林士有奇爲一兩四分之一

砝號 $\frac{1}{4}$ OZ 或 4 DRAM

二百十八林士有奇爲半兩

砝號 $\frac{1}{2}$ OZ 或 8 DRAM

四百三十七林士半爲一兩

即七打拉門零
十七林士半

砝號 1oz

西國藥秤較中國爲小但中國之秤亦不一今本書所用之秤乃遵照庫秤而定因庫秤通行各省也

看下中西權譜

西國藥秤一兩名一安士卽中國庫秤七錢六分也

較庫秤每兩少二錢四分

西國藥秤一打拉門卽中國庫秤一錢零五厘也

較庫秤一錢每打拉門多五厘

中國庫秤一兩卽西國藥秤五百七十五林士半

較西藥秤每兩多一百三十八林士

中國庫秤一錢卽西國藥秤五十七林士半

較西藥秤之打拉門少二林士半

六十林士爲一打拉門

西名地廉量

記號 F3

或
Fl. oz.

八打拉門爲一兩

西名安士量

記號 O.

或
Pt.

二十兩爲一益

即一筋量 西名一盞量

記號 C.

或
1. Gal.八益即八筋量爲一桶

西名一闊圓

記號 F3

或
Fl. dr.

此量之數由秤之一兩而起其法先用熱至六十一度者水秤足一兩傾一器內視其至處畫一記號爲一兩量再將此水分爲八打拉門打拉門量每打拉門再分爲六十林士卽得

服藥之數

按大人之分數折扣

一歲者按十二分之一服
二歲者按七分之一服

三歲者按五分之一服，

四歲者按四分之一服，

五歲者按七分之二服，

六歲者按三分之一服，

七歲者按十一分之四服，

八歲者按五分之二服，

九歲者按七分之三服，

十歲者按十一分之五服，

十二歲者按一半之數服，

此即大概之數也。又有可多服者，如癩茄等，又有必
宜少服者，如鴉片等是也。若加詳察，須看嬰兒科。

配藥例言

一 凡書中配藥之數，多用分字。此分字乃份字之意，非兩錢分釐之分。如多製配，則每斤可作一分；少製配，則每釐亦可作一分，勿爲所拘。

二 凡藥屬流質者，皆以量量之。每量可作一分，如水、酒、油、藥等類是也。藥屬定質者，皆以秤稱之。每秤可作一分，如藥膏、藥散及五金等類是也。藥方內間有流質不
量者，必註一秤字。

三 凡藥方配製用一天者，乃一晝一夜也。

四 凡藥之通行常用者，其名高擡四頭，次則三頭。藥方之常用者，其方高擡兩頭，次則一頭。俱按英國本草定例。抬四頭兩頭者皆在英國本草內，抬三頭一頭者間在美法中華本

五 凡配藥之方，其多少先後，俱係一定，不可疎忽錯亂。

六 凡書所說寒暑表之度數，俱以髮倫表數爲準。

七 凡猛厲藥與藥精等間，有用一林士分作幾分者，

者必分林士爲幾分，如半林士、一林士三分之一、一林士十分之一之數是也。因英國藥秤以林士爲極小之數，故欲少服藥，

搭配須宜謹慎，如作丸用，可同別藥仔細研勻，如要單服，可用法化開，然後分服，如有成方，照成方之法化服。

Comparative Table of English and Chinese Weights.
按西國藥秤較中國庫秤圖

號	林士	分	毫釐	絲	半
$\frac{1}{2}$ gr	半			七五	
1gr	一			五	
2gr	二			五	
3gr	三			五	
4gr	四			五	
5gr	五			五	
6gr	六			五	
	七			五	
	八			五	
	九			五	
	十			五	
	土			五	
	三			五	
	三			五	
	西			五	
	五			五	
	六			五	
	七			五	
	大			五	
	九			五	
	干			五	
	主			五	
	主			五	
	主			五	
	西			五	
	蓋			五	
	丟			五	
	老			五	
	天			五	
	元			五	
	三十			五	

Comparative Table of English and Chinese Weights.

按西國藥秤較中國庫秤圖

萬國藥方 卷三

Medica and Preparations.
Materia

相思子

ABEUS PRECATORIUS.

又名
紅豆

此藥出於南亞美利加及印度等處，入藥用樹子。

外用 治眼胞內生米粒瘡及皮類病。

思子泡水

製法 相思子

研末

涼水

五百分

泡一天再加沸水

五百分

候涼過

淋紙爲度。日三次點眼內，令其生炎出膿，退雲翳，並治米粒瘡用之。

思子糊

製法

相思子

去皮二百分

涼水

五百分

浸一天入白打糊

再加水足八百

分爲度。治皮類病用毛筆蘸擦。

肥皂

又名

INFUSUM ABRIL.
PASTA ABRIL.

相

此藥出中國等處，由肥皂莢製出。

肥皂莢

ACACIA CONCINNAE
PULPA.

外用 治疔癬與皮類等病。

白樹膠

又名
ACACIAE GUMMI.

此藥出亞非利加及亞拉伯印度等處乃阿楷西耶樹之膠結顆粒畧圓上多坼紋色灰白不過光因其色白故名

化法 冷水一分化沸水易化但化後變酸不堪用酒 伊打 油類均不化

功用 潤劑 養生 又配別藥常用之

主治 乾癬癩 每用一塊放口內噙化

反藥 酒 伊打 阿摩尼亞水 鉛霜 硼砂 強水類

白樹膠

製法

白樹膠

四分

零塊

汽水 六分

裝有蓋器內

間時調勻

以化爲度

每服一至四打拉門

治癩癩藥內添少許最妙

此漿能令油與水

化勻服藥油者便用

又方 膠漿

三打

門 藥油

一兩 各樣

油皆可

入白研勻漸加

水研極勻爲度

MUCILAGO ACACIAE.

白樹

白

MISTURA ACACIE.

樹膠與水

製法

白樹膠漿

一分 水糖 一分 汽水

二十分

共化勻爲度

治

內熱 亦治服毒後腹內煩熱

德國方 白樹膠

細末十五分

煉白糖

細末五分

水

一百七十分

共化勻爲度

法國方 白樹膠

細末一分

水糖

三分

柑花汽水

一分 汽水

十分

共化勻爲度

度

樹膠糖

製法

白樹膠

十分研末

汽水

四十分三

白糖

六十

先將白樹膠入汽水內

化開再入燙鍋加白糖化勻過布濾渣爲度

乾醋

又名

醋

ACETUM.

SYRUPUS ACACIE.

此藥之濃淡以醋精多寡爲定製法有粟米或果實及別物之異按百

分中函醋精三分至六分者爲通行之品

英國藥肆用者每百分
中函醋精五分有奇

功用 收斂 解熱 利小便

主治 热症 自汗 盜汗 乾渴

服法 每服一打拉門至一兩加水用之。

外用 治跌打損傷 閃腰扭挫 石灰迷目。

反藥 石灰 阿摩尼亞 反酸類 炭養鹽類。

醋漱水 製法 荆芥泡水一兩 酢醋一兩 和勻仰漱治咽喉類病。

一名 醋精 化名 炭輕養 即輕炭輕養

此純酸不易製造亦不入藥用用者按函醋精之多寡分濃淡冰三種。

濃醋酸 又名 ACIDUM ACETICUM.

純醋酸 ACIDUM ACETICUM VERUM. GARGARISM ACETI.

淡醋酸 又名 ACIDUM ACETICUM TUM.

此藥由木內蒸出復用法煉成者無色極酸臭之刺鼻其性酷烈不可單服惟配佐他藥方可用之。每百分中計有醋精三十三分。

淡醋強酸

製法 濃醋酸一分汽水七分化勻爲度 每百分中計有醋精四分有奇。

功用 收斂 解熱 利小便 與醣醋同。

冰醋酸又名

ACIDUM ACETICUM
GLACIALE.
AROMATICUM.

冰醋强酸

服法 每服一二打拉門加水冲服。

此藥結冰無色過光味極酸氣息刺鼻

按百分中計有
醋精九十九分

化法 水全化 此藥能化樟腦 藥脂類

藥香類 蒸油類等

功用 丹類 不可內服

外用 治瘊疣等症 楊梅瘊子 瘡瘍

醋酸

製法

冰醋酸

七十分之二

丁香油

九分

拉彎大油

六分

陳皮油

六分

伯格

莫油

三分

台茂油

三分

肉桂油

一分

共化勻過淋紙爲度

諸藥之分皆用秤

又方 拉彎大油

一分

薄荷油

一分

迷迭香油

一分

側柏油

一分

肉桂

油

一分

檸檬油

二分

丁香油

二分

濃酒

三百

淡醋酸

四百五十分

汽水

百分之一

和勻浸數日過淋紙爲度

又方 冰醋酸

五百分

樟腦

五十分

肉桂油

一分

丁香油

一分

拉彎大油

半

分共化勻過淋紙爲度

又方 青蒿 艾葉 迷迭香 荆芥 薄荷 濡草 拉彎大花 各

五分 水菖蒲

肉桂 丁香 肉豆蔻

蒜頭 分各二

樟腦 四分

冰醋酸 十五

分 糜醋 一千分

葡萄 酒製色白者佳

先將樟腦與冰醋酸化開聽用後將各藥入糜醋浸

十天用絞盤絞渣加入樟腦醋酸和勻過淋紙爲度 以上四方功用相同可提神以代鼻烟西國婦人多用之嗅其氣極美

砒霜

粗質名信石煉成者爲砒此書所論皆是煉成者

一名鼻霜 又名

靈養酸 化名靈養

舊名鍾養

此藥自砒石煅過再升煉而成色白質重無臭無味性酷毒不可單服常用者惟信石銻水靈碘汞水二方

化法 冷水一百分 化一分 沸水二十分 化一分 濃酒五百分 化一分 鹽強水六分 化一分 甘油八分 化一 分 銻養水化一分

功用 補腦 改病 解熱 解瘧 順氣

主治 濕癬 皮膚久病 久風濕 瘰疾 腦氣筋疼 跳舞風

楊梅類病 拘攣風濕 氣喘

服法 每服一林士六十分之一至十二分之一多加水化之飯後服
外用 丹類亦宜慎用治毒瘤惡瘡等症

反藥 鐵鹽類 鎂養 石灰水 收斂藥類

解藥 解此毒先服吐藥後服濕鐵養或鐵綠鐵養水或鎂養或淡阿摩尼亞水或無名異或石灰擦油皆可
總以溼鐵養鐵綠鐵養水爲妙

又經驗良方 鎂養十五分水二百五十分和勻入瓶再用上礦強鐵水一百分水

二百五十分和勻入瓶用時將二水各一半和勻服之卽解此毒或一斤或半斤酌服可也

銻水製法信石八十七林士炭養銻八十七林士拉彎大製酒五打拉門汽水二十兩先將汽

水信石炭養銻入鍋熬化候冷入拉彎大製酒加水仍足二十兩爲度
每服二至八林士加水冲服日二三次飯後用之計有信石半林士內

鹽強

信石水

製法

信石

八十七

鹽強水

二十打

汽水

二十兩

先用水四兩加鹽強水

LIQUOR ARSENICIC HYDRO CHLORICUS

與信石熬至消化再加餘水仍足二十兩爲度

服法同上

每五十五林士內計有信石半

士林

石糊

製法

信石

二分

礦強莫非穠

一分

幾阿蘇

酌用

共研成糊爲度

治牙痛用此糊一米粒點棉花上塞入牙穴內外用軟蠟封固過二三時許取去卽愈

此藥能敗牙內之腦氣筋致永不再痛但塞藥之時必痛可先搽高告礦水以免痛

又方 信石

研末一分

木炭

細末一分

硃砂

研細四分

水

酌用

共研勻成糊爲度外用治毒瘤等瘡

石洗水

製法

信石

十林士

汽水

十六兩

謙落膏

一兩

淡鉛水

三兩

鴉片酒

一打拉門
信石研末一分

胡椒

八十林士

細末

用饅頭屑研爲團作二十丸爲度

每日一次洗之

石丸

製法

信石

一林士

胡椒

八十林士

細末

用饅頭屑研爲團作二十丸爲度

每日一次洗之

每

服一粒