

醫宗必讀

卷九
卷十

王成五

古吳童氏重校醫宗必讀卷之九

雲間李中梓士材父著

門人董爾正李芳父參
姪孫李廷芳衡伯父訂

大便不通

經曰北方黑色入通於腎開敷於二陰注五液津液厥則大便調和若飢飽勞傷損腸胃氣及過於辛熱津液枯精以潤之是也愚按內經之言則知大便秘結專責之少陰一經證狀雖殊總之津液枯乾一言以蔽之也分而言之

則有胃寔胃虛熱秘冷秘風秘氣秘之分胃寔而秘者善飲食小便赤澀此其類胃虛而秘者不能飲食小便清利湯熱秘者面赤身熱六脈數實腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡香櫛榔丸或承氣湯加枳殼吞養正風秘者風

小便清白喜熱惡冷注香櫛榔丸各半疏氣秘者氣不升降穀氣不行其人多噯蘇子降氣湯加枳殼吞養正風秘者風

搏肺藏傳於大腸注通調腸法或活絡調腸丸更有老年津液乾枯婦人產後無血及發汗利小便病後血氣未復

皆能秘結法當補養氣血使津液生則自通誤用硝黃利藥多致不救而已豆牽牛其害更速八珍湯加蘇子廣橘紅

病證雖屬陰寒而脈寔微燥宜溫煖藥中略加苦寒以去熱躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者兩尺按之必虛或沉細

而遲但煎理中湯待極冷方服或服藥不應不敢用峻猛之藥者宜蜜煎導之入蜜煎中其功更捷分令秘者營生委

導之減於驢頭中有熱者猪胆汁導之久虛者如常飲食法者猪血腸湯加酥食之血仍潤血臟仍潤臟此妙法也每

見江湖方士輕用硝黃者十傷四五輕用巴豆者十傷七八不可不謹也或飲血或飲食不進而死

醫案

少宰將恬菴服五加皮酒遂患大便秘結四日以來腹中脹悶服大黃一錢通後復結余曰腎氣衰少津液不充誤行

疎利是助其燥矣以六味丸煎成加人乳一鍾白蜜五錢二劑後即通十日而康復矣

文學顧以貞素有風疾大便秘結經年不愈始來求治余曰此名風秘治風須治血乃大法也用十全大補湯加秦九

麻仁杏仁防風煨皂角仁半月而效三月以後永不復患以手書謝曰不有直切僻處寧獨日與庸人為伍一旦櫻非

良精吟指按肺臍快然及欲佳方如臭味之投百日以來沉痾

釋令幸生歸矣凡仰事俯育壽非意外之慶則壽非台翁之賜哉

大便不通

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結 厚朴枳殼煨芍藥 枳實糵炒各二錢 大黃一兩 麻仁五兩 杏仁五兩 枳殼

右為末煉蜜和丸 桐子每服二十九 臨臥溫水下 秘即通

七宣丸 治風氣結聚寔邪秘結

桃仁煨破 酸柴胡 訶子皮 枳實煨木香 各五錢 甘草酸四錢 大黃一兩 枳殼五兩

右為末煉蜜丸如桐子大 每服二十丸 食前臨臥各一服 米飲下 以利為度

厚樸湯 治胃虛秘結 厚朴煨 陳皮 甘草 各三錢 白朮 枳實 各二兩

為粗末 每服五錢 水一鍾 姜三片 棗一枚 煎至八分 食前大溫服

四順清涼飲 治血燥內熱大便不通

大黃 蒸甘草 各當歸 酒洗 芍藥 各一錢 水鍾半 薄荷十葉 煎至七分服

潤腸丸 治風結血秘 胃中伏火 羌活 歸尾 大黃 五錢 桃仁 枳殼 麻仁 各一兩

右為末 除麻仁桃仁另研如泥外 為細末 煉蜜丸 如桐子大 每服五十丸 溫酒下

木香檳榔丸 疎導三焦快氣化痰消食寬中 木香 檳榔 枳殼 炒 杏仁 煨 枳殼 青皮 去 各半 夏 枳 皂角 各

郁李仁 略二 為末 別以皂角四兩 用漿水一 碗 揉揉 熬膏 更入熟蜜少許 和丸 桐子大 每服五十丸 食後姜湯

下。

大承氣湯 大黃 芒硝 厚朴 枳實 各三錢 水二鍾 生薑 至九分 內硝煎服

藿香正氣散 小續命湯 養正丹 八珍湯 俱真

蘇子降氣湯 治氣滯妨悶痰盛便秘 蘇子 炒 半夏 湯泡 各前胡 甘草 厚朴 煨 枳殼 陳皮 各一錢 當歸 五錢 沉香

水二鍾 姜三片 煎一鍾 服虛人加桂五分 黃耆一錢

半硫丸 治老人虛人冷秘 熟半夏 細硫黃 木樨子 各一錢 以生薑自然汁同煎入乾蒸餅末攪和勻入帕內 杵

數百下 丸如桐子大 每服十五丸 至二十九 溫酒或姜湯下 婦人醋湯下 俱空心服

橘杏湯 治脈浮氣秘 若脈沉為血秘 為以桃仁代杏仁

杏仁燻黃五錢 生橘紅去白淨 水一鍾生薑三片煎七分服

益血潤腸丸 熟地黃六兩 杏仁煨麻仁各兩以土 蘇子荆芥

酪一當歸兩 為末以前三味膏同杵千餘下仍如煉蜜丸桐子大每服六十丸空心白湯下

穿結藥 治大實大滿心胸高起便秘 蟾酥 麝香 一巴豆 另粉

研極細末用孩兒茶乳汁和丸如黍米大每服三丸姜湯下

小便不禁

經曰督脈生病為遺溺又曰肝所生病為遺溺皆與肝二經並循陰器繫廷孔病則營衛不奉又曰膀胱不約為遺溺

又曰手太陰之別名曰列缺其病虛則欠故小便遺數此則遺溺何也不独病在陰器廷孔而三焦為決瀆之官失

道膀胱之脈從肩膊內挾脊抵腰中入循膈屬膀胱凡三焦虛則膀胱亦虛故不約也肺從上焦通調水

小便不禁者但知補澀而已不知內經論肝督膀胱之病不指為何邪所干則知七情六氣皆能為病也又言手太陰

虛者為子母相關之病則知所生所勝所不勝之五邪皆足以為病也總其大要而言肺者主氣以下降生水以下輸

膀胱者津液藏焉氣化則能出水泉不止者膀胱不藏也此兩經者寔為總司肺虛者為上虛當補氣補中益氣湯不

泚其門冬膀胱虛者為下虛當澀脫桑螵蛸散之類挾寒者家韭子丸固時丸白蠟腸散更有睡則遺尿皆貴之

處所以嬰兒將氣未固老人下元不足多有此證在嬰兒挾熱者十居七八在老人挾寒者十居七八此又不可不辨

也宜以兔絲子丸猪膽炙研碎煎湯送下更須審寒熱而為之括法

姪娘尿出不知用白礬牡蠣為末酒調服二錢或雞毛灰末酒服一匕或桑螵蛸益智仁為末米飲下薛立齋云此證

若將中有熱加味道遙散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智若肝腎陰虛六味丸

產後小便不禁此氣血虛不能制故也薛立齋云若因穩婆損胞者八珍湯兼進補腎飲若膀胱氣虛而小便頻數當

補脾肺若膀胱陰虛者須補肺腎

醫案

方伯張七澤夫人患飲食不進小便不禁余曰六脈沉瀼水泉不藏是無火也投以八味丸料兼進六君子加益智肉

桂二劑減數劑而安

文學俞玄倩憂憤經旬忿然小便不禁醫嘗以固脬補腎之劑投之凡一月而轉甚余謂之曰六脈舉之則軟按之則堅此腎肝之陰有伏熱也用牡丹皮白茯苓各二錢苦參八分甘草稍六分黃連一錢煎成調黃雞湯與服六劑而安矣適有吳門醫者云既愈當大補之數日後仍復不禁再來求治余曰肝家素有鬱熱得溫補而轉熾遂以龍胆瀉肝湯加黃雞湯服之四劑即止更以四君子加黃連山枝一月而愈

家韭子丸 治遺溺夢遺白濁 家韭子炒六錢鹿茸四錢麩肉從蓉去甲 牛膝 酒浸 熟地黄 當歸略二 兔絲子酒巴戟五錢一兩杜仲炒 石斛法 桂心 乾姜略一

右為末酒糊丸桐子大每服五十丸加至百丸空心食前益湯溫酒任下

固脬丸 兔絲子製二兩尚香兩 附子炮臍桑螵蛸炙各五錢戎鹽二分

右為細末酒糊丸梧子大每服三十丸空心米飲送下

白茯苓散 白茯苓 龍骨 乾姜炮 附子炮臍續斷 桂心 甘草炙略 熟地黄 桑螵蛸燉

各二 共剉碎每服四錢水一盞煎六分食前服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱 鹿茸二兩去微 羊躑躅酒拌 附子炮 澤瀉 桂心略一

右為細末每服二錢食前粥飲調服

兔絲子散 治小便不禁或過多 兔絲子二兩酒浸三日晒 牡蠣 附子炮臍 五味子略一 雞胫去黃皮肉從

蓉略二 右為末每服二錢粥湯送下

牡蠣丸 牡蠣白者三兩入磁瓶蓋泥固濟 赤石脂三兩搗碎醋拌勻於生鐵鉢

酒糊丸梧子大每服五十丸空心益湯下

白薇散 白薇 白欬 白芍藥略等 為末每服二錢粥飲下

雞腸散 黃雞腸雜諸四具切破黃連去麩肉從蓉切焙赤石脂另研 白石脂另研 苦參略五

為末每服二錢食前酒下日二夜一

大免絲子丸 治腎虛小便不禁

免絲子酒洗澤瀉 鹿茸酥炙 石龍芮去土 桂枝粗附子 炮去破石解桂 熟地黄 白茯苓炙 牛膝酒浸

續斷 山茱萸肉從容切焙 防風去土 杜仲粗 補骨脂酥炙 萆薢澄茄 沉香 巴戟法 茴香炒 五味子

桑螵蛸酒浸 覆盆子麩炒 芎藭略半 右為細末 酒煮麩糊丸如桐子大 每服二十丸 空心溫酒或鹽湯任下

逍遙散 治血虛小便不禁 白茯苓 白朮炒 當歸身 白芍藥炒 柴胡鎔 甘草炙 水一鍾 煨姜三

片煎至六分服

補中益氣湯見類中風 八珍湯 六味丸俱見虛癆

補腎飲 治產時傷腰小便漏出 生黃絲絹剪 白牡丹根剉 白芍藥剉 白芨剉

桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便不禁 桑螵蛸蜜炙 鹿茸剉 黃耆略 三 牡蠣煨 人參 赤石脂略 二

為末每服二錢空心粥飲調服

遺精因夢而自遺者為精滑

經曰 怵惕思慮者則傷神 神傷則恐懼流淫而不止 怵也 惕也 流淫謂流出淫精也 思慮而兼之 以怵惕則神傷

魄捨又曰 恐懼而不解則傷精 精傷則骨痿痠麻 精時自下 而壯文之意也 曰五藏主藏精者也 傷則失守 此言五藏

非腎之一藏 獨有精也 五藏一有所傷 則失其藏精 又曰 腎者主水 受五臟六腑之精而藏之 又水氣入胃 散經于五藏

于腎水經五布 五經並行此水 殺日生之精也 後天日生之精與先 又曰 厥氣客於陰器則夢接內陰器者宗筋之所

少陰陰器之筋 皆結聚于陰器 與衝任督三脈之所會 故諸筋皆統屬於厥陰也 腎為陰主藏精 肝為陽

主疏泄 陰器之筋 皆結聚于陰器 與衝任督三脈之所會 故諸筋皆統屬於厥陰也 腎為陰主藏精 肝為陽

夢而自遺者 心腎之傷居多 夢而後遺者 相火之強為害 若平五臟各得其職 則精藏而治 苟一藏不得其正 其則必

害心腎之主精者 為治之之法 獨因腎病而遺者 治其腎 由他藏而致者 則他藏與腎兩治之 如心病而遺者 必血脈

空虛本縱不收肺病而遺者必皮革毛焦喘息不利脾胃而遺者色黃肉消四肢懈惰肝病而遺者色青而筋痿腎病而遺者色黑而髓空更當以六脈參詳昭然可辨其所因更自多端有用心過度心不攝腎而失精者宜遠志丸佐色慾不遂而致精泄者即此名曰白濁妙法吞玉華白丹有色慾過度精數虛滑正元氣如牡蠣粉肉蓯蓉各半藥丸大免絲子有壯年久曠精滿而溢丸心有飲酒厚味痰火溼熱擾動精腑胡俾清升濁降脾胃健運則遺滑自止丸固陽丸之類有腎虛不固者五倍子二兩茯苓四兩然其證狀亦復不同或小便後出多不可禁者或不小便有脾虛下陷者補中益氣湯有腎虛不固者兩丸服為神驗而自出或莖中痒痛常如欲小便者或夢交者並從前法分別施治或是有鬼魅相感其狀不欲見人如有對晤時獨言笑時常悲泣脈息乍大乍小乍有乍無及脈來綿綿不知度數而顏色不變乃其候也頭暈之類或但服蘇合丸神更有久曠之人或縱慾之人與女文合泄而不止謂之走陽其女須抱定勿使陽莖出戶急呵熱氣於口中以指捻住尾間即救矣若女人驚而脫去者十有九死亟以童女接氣灌以大劑獨參湯亦有活者總其大綱言之精滑宜澀之澀而不效即瀉心火瀉而不效即以補中益氣用升麻柴胡至一二錢舉其氣上而不下往往有功詎可補之不效澀之無靈遂委之命也哉

醫案

文學顧以功科試勞神南都歸即患精滑小便後及夢寐間俱有遺失自服金櫻子膏經月不驗問治於余余曰氣虛而神動非遠志丸不可服十日而減半一月而全愈

武科張甯之稟質素強縱飲無度忽小便畢有白精數點自以為有餘之疾不宜醫治經三月以來雖不小便時有精出覺目頭眩運醫者以固精澀脫之劑治療兩月零不見功迎余治之但見六脈滑大此因酒味濕熱下於精藏遂以白朮茯苓橘紅甘草乾葛白蔻加黃柏少許兩劑後即效不十日而康復如常

儒者錢用寬色慾過度夢遺精滑先服清相火之劑繼服固澀之劑皆無效來求余余以玉華白丹濃煎人參湯送二

錢兩服後稍固兼進六味地黃丸加蓮藕茯苓遠志五味子丸一劑愈

遠志丸 治心腎不足夢遺精滑 茯神桂皮白茯苓臙皮人參 龍齒酪 遠志法林姜石菖蒲酪二

為末蜜丸桐子大辰砂為衣每服三十丸空心熱鹽湯下

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮壓升降陰陽調和五臟補助元氣

水銀一斤硫黃四兩 二味用新銑內炒成砂子入水火鼎煨煉為末糯米糊丸如麻子大每服三丸空心棗湯水

湯人參湯任下忌猪羊血菜豆粉冷滑之物

茯神湯 治慾心太熾夢遺心悸 茯神去殼剉遠志去心 酸棗仁錢二分石菖蒲 人參 白茯苓各一

黃連 生地黃各八當歸一錢甘草如 水二鍾蓮子煎八分食前服

四七湯 治七情鬱結痰氣妨悶嘔吐惡心神情不快

半夏五錢茯苓錢二分紫蘇葉炒厚朴姜製 水一鍾薑七片紅棗二枚煎八分服

青州白丸子 治風痰壅盛癱瘓嘔吐涎沫氣不舒暢悶悶不宣 半夏性七兩南星性二 白附子性二 川烏去皮臍

為末以生絹袋盛於井花水內揉出滓再研再揉以盡為度置磁盆中日晒夜露至曉去舊水別用井水攪又晒

至來日早再換新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾以糯米粉煎粥清丸菜豆大姜湯下二十九

妙香散 安心神閉精氣 龍骨紅色益智仁 人參各一 白茯苓 遠志去心 茯神各剉 硃砂水飛

甘草錢格二 為末每服二錢空心溫酒調服

玉華白丹 清上實下助養本元最治二便不固夢遺精滑等證 鍾乳粉煉成者 白石脂研細水飛

陽起石 磁礮中煨冷通紅取出酒 左顧牡蠣泥錢洗用並葉搗汁盪

右四味各研令極細拌和作一處研一二日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒一宿每服一粒空心

濃煎人參湯待冷送下不溼不燥可以久服大補真元最祛宿疾婦人無妊者當歸地黃浸酒送下凡服藥後以

少少白粥壓之忌猪羊血菜豆粉

正元散 治下元虛臍腹脹痛泄利嘔吐陽虛自汗夢遺精滑手足厥冷一切虛寒 紅豆炒 乾姜炮 陳皮去白各茯

苓祛人參 白朮 甘草 二兩肉桂去粗川烏炮去皮附子炮去山藥羹汁川芎 烏藥 乾葛兩一黃耆五錢

右為細末每服三錢水一盞姜三片棗二枚鹽少許煎七分食前溫服

鹿茸益精丸 治心腎虛冷漏精白濁 鹿茸酥炙桑螵蛸版上肉從蓉 巴戟法兔絲子酒杜仲法煨姜益智仁

禹餘糧火煨川棟子椒燻當歸略三韭子微炒補骨脂炒赤石脂 山茱萸椒燻龍骨另研各滴乳香半錢 為末

酒煮糯米糊為丸 桐子大 每服七十丸 食前 茯苓煎湯送下

山藥丸 治諸虛百損 夢失精滑 赤石脂煨茯神去皮 山茱萸椒燻 熟地黃酒浸 巴戟去心 牛膝酒浸 澤瀉

酪一杜仲法燻姜兔絲子酒浸 山藥略三五味子酥肉從容酒浸 右為末 蜜丸 桐子大 每服三錢 鹽湯送下

大兔絲子丸 見小便不禁

固陽丸 附子砲三川烏頭砲二白龍骨二兩補骨脂 川棟子 舶上茴香略二 兩

右為末 酒糊丸 桐子大 每服五十丸 空心酒下

補中益氣湯 見虛癆 蘇合香丸 見真中風

秘真丸 固精安神 龍骨一兩訶子皮五砂仁錢五砂水飛 右為末 麵糊丸 菘豆大 每服三錢 空心酒下

金鎖玉關丸 治遺精白濁 心虛不寐 雞頭肉 蓮子 蓮鬚 藕節 白茯苓 白茯神 乾山藥略等

右為末 金襴子煎膏為丸 梧子大 每服三錢 米飲湯下

清心丸 治經絡熱 夢遺心悸

黃蘗皮為末生腦子錢 同研勻 蜜丸 梧子大 每服十丸 加至十五丸 濃煎麥門冬湯下

赤白濁

經曰 思想無窮 所願不得 意淫於外 入房太甚 宗筋弛縱 發為筋痿 及為白濁 此已見遺精條矣 茲復取者 為濁病仍

不時而病 治濁多 以林法治之 五苓入 雜投 見時而病 反增劇 不知經論 只屬病也

愚按 經文及細攷 前哲諸論 而知濁病 即精病 非溺病也 故患濁者 莖中如刀割 火灼 而溺自清 惟竅端時有穢物 如

瘡之膿 如目之眵 淋漓不斷 與便溺絕 不相混 大抵由精敗而腐者 十之六七 由淫熱流注 與虛者 十之二三 其有赤

白之分者 何也 精者 血之所化 濁去太多 精化不及 亦未變白 故成赤濁 此虛之甚也 所以少年天癸未至 強力行房

所泄半精 半血 壯年施泄 無度 亦多精血 雜出 則知丹溪以赤屬血 白屬氣者 未盡然也 又以赤為心虛 有熱 由思慮

而得 白為腎虛 有寒 因嗜欲 而得 亦非確論 總之心動於欲 腎傷於色 或強忍房事 或多服淫方 敗精流溢 乃為白濁

虛滑者血不及變乃為赤濁。按寒則脈來沉遲無力。小便清白。內補鹿茸丸。丸按熱則口渴便赤。脈必滑數。有丸飲香。通散有胃中溼痰流注。鳩升二。疎腸有屬虛癆。六味地黃丸。丸按暑則冷。微如香。濡谷。則有稠黏如膠。澀痛異常。乃精塞數道。香散。散。送。入。味。丸。或。陰。腎。氣。有。思。想。太。過。心。動。煩。擾。則。精。敗。下。焦。如。味。清。心。之。嫩。如。上。數。端。此。其。大。畧。若。夫。五。藏。之。傷。六。淫。之。變。難。以。枚。舉。臨。症。之。頃。慎。之。

脈候 脈大而濇。按之無力。或微細。或沉緊而濇。為虛尺脈虛浮。急疾者。自難治。遲者易治。

醫案

歸德郡侯李易齋。患白濁。服五苓散數劑無功。余診之。兩尺大而濇。是龍火虛炎。精液數道。用牛膝。茯苓。黃蘗。麥門冬。山藥。遠志。細生甘草。十劑而安。

光祿卿吳伯玉。閉精行房。時有文字之勞。患白濁。莖中痛如刀割。自服清火疎利之劑。不效。改服補腎之劑。又不效。商治于余。余曰。敗精久蓄。已足為害。况勞心之餘。水火不交。坎離順用也。用萆薢分清飲。加茯苓。神遠志。肉桂。黃連。四劑。即效。兼服補中益氣。六味地黃丸。半月而安。後因勞復發。但服補中益氣。即愈。

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁。

黃芩 麥門冬 地骨皮 車前子 甘草 磁石 石蓮肉 白茯苓 黃耆 人參 狗脊 遠志 石菖蒲 一

水二鍾煎一鍾空心溫服發熱加柴胡薄荷。

萆薢分清飲 治真元不固赤白二濁。

益智仁 川萆薢 石菖蒲 烏藥 一水一鍾入鹽一捻煎七分食前服 苓 方 加 茯苓

蒼白二陳湯 治濕痰下注為白濁。 蒼朮 炒白朮 土 錢 枳 橘 紅 一錢 半夏 二錢 茯苓 二錢 甘草 二錢

水二鍾姜三片煎一鍾服。

四苓散 茯苓 猪苓 白朮 澤瀉 各等 為細末每服三錢空心長流水調服

玄兔丹 治三消渴利神樂禁止遺濁。

免絲子 酒浸通散 乘溼研 五味子 酒浸別為白茯苓 乾蓮肉 各三 為末別碾乾山藥末六兩 將所浸酒添酒煮

糊搜丸如桐子大每服五十丸空心食前米飲下

六味地黃丸 八味地黃丸 補中益氣湯見金匱腎氣丸服

內補鹿茸丸 補精益氣善止白淫

鹿茸酒浸免絲子酒浸茯苓炒沙苑炒茯苓 肉苁蓉 紫苑 蛇床子酒浸黃

砂等 為細末蜜丸桐子大每服三十丸食前溫送下

香苓散砂炒砂散砂炒山藥燻汁茯苓茯苓神桂皮 遠志炆心黃耆略一人參 桔梗法甘草略木香略錢

辰砂別礞麝麝香另礞猪苓炆白朮炆澤瀉略肉桂二錢 右為末每服二錢天麥二冬去心煎湯空心調服日三

服愈

茯苓丸 治慮思太過心腎虛傷真陽不固溺有餘漉小便白濁夢寐頻泄

兔絲子酒浸石蓮子去白茯苓法破 為細末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心鹽湯下

加味清心飲 治心中煩熱赤濁肥脂 白茯苓法石蓮肉鎔半益智仁 麥門冬法人參法遠志法心姜石菖蒲

車前子 白朮炒澤瀉 甘草炙 水二鍾燈心二十莖煎一鍾食前服有熱加薄荷少許

瑞蓮丸 治思慮傷心赤白二濁 白茯苓法石蓮肉炆心 龍骨肚天門冬法麥門冬法柏子仁炒另 紫石英火研細

遠志甜煅冰當歸酒浸法酸棗仁炒龍齒略一乳香別研 右為細末蜜丸梧子大硃砂為衣每服七十丸空心溫

酒或棗湯下

遠志丸 治赤濁如神 遠志法神法去皮益智仁略二 為細末酒煮麪糊丸梧子大每服五十丸臨臥棗湯下

鎖經丸 治赤白濁 補骨脂炒青鹽略四 白茯苓 五倍子略二 右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服三

十丸空心鹽湯下

水陸二仙丹 治赤白濁 金櫻子去子及毛淨塗法實肉研為細粉 以前膏同酒糊為丸梧子大每服三十丸

食前溫酒下九方用丸汁

赤脚道人龍骨丸 治白濁 龍骨 牡蠣略半 研為末入鯽魚腹內溼紙裹入火內炮熟取出紙將約同魚

肉丸如桐子大每服三十丸空心米飲下。鯽魚不拘大小。只以着盡上件藥為度。更加茯苓遠志各半兩。既

痰飲調酒者為痰

經曰大陰在泉濕淫所勝。民病飲積。又曰歲土太過。雨濕流行。其則飲發。又土鬱之勝。大陰之復。皆病飲發。愚按痰之為病。十嘗六七。而內經叙痰飲四條。皆因濕土為害。故先哲云。脾為生痰之源。又曰。治痰不理脾胃。非其治也。夫飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。何痰之有。惟脾土虛濕清者難升。濁者難降。留中滯隔。於而成痰。故治痰先補脾胃。復健運之常。而痰自化矣。折而言之。痰有五飲。亦有五而治法因之而變。在脾經者。名曰濕痰。脈緩面黃。肢體沉重嗜臥。不收。腹脹食滯。其痰滑而易出。一陳湯白朮丸。快虛者。大君者。保和丸。快暑者。消暑丸。驚者。妙應丸。在肺經者。名曰燥痰。氣痰。脈澁面白。氣上喘促。洒淅寒熱。悲愁不樂。其痰澀而難出。刺金湯。在肝經者。名曰風痰。脈弦面青。四肢滿悶。便溺秘澀。時有躁怒。其痰青而多泡。風丸。惟花丸。防風丸。煮惟花丸。在心經者。名曰熱痰。脈洪面赤。煩熱心痛。口乾唇燥。時多喜笑。其痰堅而成塊。小黃丸。在腎經者。名曰寒痰。脈沉面黑。小便急痛。足寒而逆。心多恐佈。其痰有黑點。而多稀。蠟蚘蚘丸。其人素感。今瘦水走腸間。轉轉有聲。名曰痰飲。心下冷極。以溫藥和之。桂苓甘之。飲後水流在脇下。咳吐引痛。名曰懸飲。針之。湯飲水流於四肢。當汗不汗。身體痠者。名曰溢飲。飲清瀧效。逆倚息短氣。不得臥。其形如腫。名曰支飲。五苓散。澤瀉丸。之。膈滿嘔吐。喘效寒熱。腰痛背痛。目淚出。其人振振惡寒。身羸惕者。名曰伏飲。倍丸。更有一種非痰非飲。時吐白沫。不甚稠粘。此脾虛不能約束津液。故涎沫自出。宜用六君子湯。加益智仁以攝之。嗟乎。五痰五飲。證各不同。治法向別。稍或不詳。妄投約劑。非徒無益。而有有害之。至加脾肺二家之痰。尤不可混。脾為溼土。喜溫燥而惡寒潤。故二朮星夏為要藥。肺為燥金。喜涼潤而惡溫燥。故二母二冬地黃桔梗為要藥。二者易治。鮮不危困。每見士俗。惡半夏之燥。喜貝母之潤。一見有痰。便以貝母投之。若是脾痰。則土氣益傷。飲食忽減矣。即使肺痰。母過於涼潤。以傷中州。稍用脾藥。以生肺金。方為善治。故曰。治痰不理脾胃。非其治也。信夫。

脈候 經曰肝脈奕而散。色澤者。當病溢飲。偏弦為飲。浮而滑為飲。沉而滑者。懸飲。飲脈皆弦。微沉滑。左右

關脈實者。膈上有痰。可吐之。眼胞及眼下如烟煤者。痰也。痰得瀉。脈難愈。

醫案

卷九

痰飲

刑部主政徐稜如勞且怒後神氣昏倦汗出如浴語言錯亂危困之極迎余療之診其脈大而滑且軟此氣虛有痰也
用補中益氣此料併四貼為一劑用參至一兩加熟附子一錢熟半夏三錢四日而稍甦更以六君子加姜汁一鍾服
數日東進八味丸調理兩月而康

郡侯王敬如患痰嗽輒服清氣化痰丸漸至氣促不能食余曰高年脾土不足故有是證若服前丸則脾土益虛矣投
以六君子湯加煨姜三錢益智一錢五分十劑而痰清更以前方煉蜜為丸約服一斤飲食乃進

翰林方集虛勞而無度醉而便內汗出多痰服寬膈化痰之藥轉覺滯悶診其脈沉而澁兩尺尤甚余謂其增楊玄潤
曰痰得瀉脈一時難愈况尺中澁其精傷之象也在法不治玄潤強之投劑勉用補中益氣加半夏茯苓兩劑有小效
眾皆喜余曰瀉象不減脈法無根死期近矣果十餘日而歿

文學朱文哉遍體如虫蟻口舌糜爛朝起必見二鬼執盤食以獻向余勸曰余年未三十高堂有垂白之親二鬼朝暮
相侵決無生理倘邀如天之力得以不死即今日之秦越人矣余診其寸脈乍大乍小意其為鬼祟細察兩關弦滑且
大遂斷定為痰飲之病投滾痰丸三錢雖微有所下而痛患如舊更以小胃丹二錢與之復下痰積及水十餘碗遍體
之痛減半至明早鬼亦不見矣更以人參三錢白朮二錢煎湯服小胃丹三錢大瀉十餘行約有二十碗病若失矣乃
以六君子為丸服四劑而痊

白朮丸 治濕痰咳嗽 南星 半夏湯洗白朮五錢 右為細末浸湯蒸餅為丸梧子大每服四錢食後生

姜湯下。

二陳湯 治脾胃不和一切痰證 半夏湯洗橘紅略五白茯苓三兩炙甘草五錢

每服五錢水二鍾姜七片烏梅一枚煎八分不拘時熱服

六君子湯 人參法白朮炮茯苓錢半夏 橘紅略分炙甘草五水二鍾姜五片煎至一鍾溫服

理中化痰丸 治虛寒嘔吐泄瀉飲食難化 人參 白朮炒茯苓 甘草 乾姜 半夏麩 等分為末水丸桐

子大每服三錢白湯送下

八味丸 補中益氣湯方見虛癆

導痰湯 治痰涎壅盛痞塞不通 半夏湯洗四兩 南星湯洗去枳實法赤茯苓法橘紅法甘草法每服四錢

水一鍾姜十片煎八分食後服

保和丸 治食積酒積 山楂肉耐半夏麩橘紅 神麩炒麥芽炒白茯苓略一連翹 萊菔子炒黃連略半

為末滴水為丸加白朮二兩名大安丸

消暑丸 中暑為患藥下即馳一切暑藥皆不及此人所未知 半夏新蘇糖五甘草生用茯苓法破各

右為末姜汁煮糊丸忌見生水如桐子大每服五十丸熱湯送下有痰生薑湯下入夏後不可缺此

妙應丸一名空甘遂法紫大戟法白芥子略等 為末煮糊丸如桐子大晒乾臨卧淡姜湯下七丸至十丸氣寬

痰猛加數丸不妨加硃砂二錢全蝎三錢治驚痰極效

利金湯煎治氣壅之痰 桔梗炒貝母各三錢陳皮法三錢茯苓二錢甘草五分枳殼法砂法分 水二鍾姜五片

煎一鍾不拘時服

潤肺飲煎貝母糖天花粉法三錢桔梗一錢甘草五分麥門冬法去心橘紅法去白茯苓法知母法生地黃法

半 水二鍾姜三片煎七分食後服

水煮金花丸 南星 半夏略一兩天麻法雄黃法白麩法三 為細末滴水為丸每服五十丸至百丸先煮漿水令

沸下藥者至藥浮為度漉出浸漿水浸另用生薑湯送下

防風丸 治一切風痰 硃砂法兩法研天麻法二宿甘草法防風 川芎各一兩

右為末煉蜜丸硃砂為衣每服一丸重一錢荊芥湯化服

川芎丸 消風化痰清上利膈 薄荷葉法川芎法桔梗十兩甘草法兩半細辛法五防風法兩半二

為細末煉蜜丸每服一丸重三分食後臨卧細茶嚥下

小黃丸 治熱痰咳嗽 南星湯半夏湯黃芩略一 為末姜汁浸蒸餅為丸桐子大每服七十丸食後生薑湯下

天黃湯 天花粉耐黃連耐竹葉湯為丸菜豆大每服三錢姜湯下

姜桂丸 治寒痰咳嗽 南星洗半夏洗官桂法兩法一兩 為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食後生薑湯下

胡椒理中丸 治虛寒痰多食少 欬冬花麩胡椒 甘草 藜蘆 良姜 細辛 乾陳皮 法乾姜 酪 白朮 五兩

為末 蜜丸 梧子 大每服三十丸 加至五十丸 米飲下 日二服

桂苓朮甘湯 茯苓 四錢 桂枝 白朮 酪 三 甘草 二錢 水二鍾煎一鍾溫服

十棗湯 傷小胃丹 神芎 導水丸 舟車 神祐丸 大聖濟川丸 腫脹 五苓散 見傷寒 青州白丸子 見遺精

大青龍湯 麻黃 六錢 桂枝 二錢 甘草 二錢 杏仁 去殼 生薑 錢 大棗 三枚 石膏 二錢

水三鍾 先煮麻黃 減一鍾 去上沫 內諸藥 煮取一鍾服

澤瀉湯 澤瀉 半兩 白朮 兩 水二鍾煎一鍾服

倍朮丸 治五飲 白朮 二兩 桂心 乾姜 酪 一 為末 蜜丸 每服三十丸 米飲下

滾痰丸 治一切痰百種怪證 大黃 不可過 黃芩 酪 八 青礞石 銷 沉香 百藥 酪 五 為末 水丸 梧子 大白

湯空心服三錢 此藥但取痰積自腸次第而下 並不刮腸大瀉 為痰家聖藥

茯苓丸 治痰滿膈間 兩臂抽痛如神 半夏 二 茯苓 兩 枳殼 炒 五錢 朴硝 二錢 五分 以酒散竹盤中 少時 咸 右為末 生薑汁煮麵糊為丸 桐子大 每服三十丸 姜湯送下

清氣化痰丸 順氣化痰消食 半夏 南星 麩皮 白礬 皂角 乾姜 酪 四 先將白礬等三味 用水五碗 煎三

碗 却入半夏 南星 浸兩日 再煮至半 夏南星 無白點 晒乾

蘿蔔子 研 青皮 去穢 紫蘇子 炒 橘紅 山查 杏仁 炒 破 尖 葛根 神麩 炒 麥藥 炒 香附 酪 二 右為末 麥餅丸

桐子大 每服七十丸 食後茶湯下

薛新甫曰 有一人 素厚 喉痛 痰厥 內多 積熱 服之 而愈 彼見 有欬 修合 饒送 脾胃 虛者 不受 膏

欬嗽 有聲 脾受 濕 有痰 有聲 曰 欬 嗽

黃帝問曰 肺之令人欬 何也 此言 咳而不言 嗽者 皆文也 傷於 濕 見于 二篇 一 篇 岐伯對曰 五臟 六腑 皆令人 欬

非獨肺也 皮毛者 肺之合也 而皮 主 皮 毛 肺 為 外 合 也 應 皮 毛 先 受 邪 氣 邪 氣 以 從 其 合 也 其 寒 飲 食 入 胃 從 肺 脈 上 至 於 肺 則 肺 寒 肺 脈 起 于 中 焦 下 絡 大 腸 滯 滯 胃 口 上 膈 肺 寒 則 外 內 合 邪 因 而 挽 之 則 為 肺 欬 外 則 皮 毛 受 邪 內 則 肺 經 受

厥令則傷五臟各以其時受病非其時各傳以與之腎是也非其時而病者乃他臟相傳也人與天地相參故五臟各

以其時治時感於寒則受病微則為欬甚則為泄為痛谷以時治者四時所傷而別也故外證為病亦兼

納乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之四臟各以其時受病

級效參而肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血肺虛金所主惟音聲肺與喘故喘息有音唾血者心欬之狀欬則心痛

喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痛心嗽起於中喉痺介介如有所梗妨礙之意肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以

轉轉則兩胛下滿脚膝布腋助故病如此脾欬之狀欬則右胛下痛陰引肩背甚則不可以動動則欬劇脾上隔

右故為右胛下痛陰陰然痛引肩背者脾上隔淨故不可以動也脾欬則右膈下痛者陰土之氣應于坤地西南地有

平人真象論曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下背非脾也脾之氣應于艮而出東北之氣應于坤地西南地有

合者不腎欬之狀欬則腰背相應而痛其則欬涎液且其脈直者入肺循喉嚨故其則欬涎也五臟之久欬乃移於六

腑臟病日久乃移於府絡脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出脾欬不已則胃受之胃不能容氣逆

上出氣而肝欬不已則胆受之胆欬之狀欬嘔胆汁泄若肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺失遺失甲乙經

同心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失腸之化故小腸受邪而欬則下奔失氣則腎欬不已則膀胱

受之膀胱狀欬而遺溺溺氣干欬而遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲欬則上中下

升降皆失其和且三焦火衰此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也此總節諸欬之證也諸欬皆聚于胃

不能生土故腹滿不能食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也此總節諸欬之證也諸欬皆聚于胃

肺是也

以其時治

納乘秋則

級效參而

喉中介介

右故為右

平人真象

合者不腎

腑臟病日

上出氣而

同心欬不

受之膀胱

升降皆失

不能生土

走氣氣病

弱。痿理益疎邪乘虛而入。病反增劇也。治內者雖宜靜靜以養陰。若命門火衰不能歸元。則參芪桂附在所必用。否則氣不化。水終無補於陰也。至夫因於火者宜清。因於濕者宜利。因痰者消之。因氣者理之。隨其所見之證而調治。在人虛人皆以溫養脾肺為主。稍稍治標可也。若欲速愈而亟攻其邪。因而危困者多矣。謹之。

〔分條治效法〕

肺效麻黃 心效 桔梗 肝效 脾效 腎效 細辛 黃附子 胃效 烏梅 胆效 黃芩 加辛 大腸效 赤石脂 湯不

止用猪苓 小腸效 芍藥 甘 膀胱效 藜蘆 甘 三焦效 欬散 異 感風者 惡風自汗 鼻流清涕 脈浮 桂枝湯 加防風 感寒者 惡

寒無汗 鼻流清涕 脈緊 乾薑 杏仁 桂枝 春月風寒所傷 頭痛身重 驗 夏月喘嗽 面赤 脈洪 黃連 解 秋月身熱 自汗 口

乾便赤 脈虛大 貽虎 冬月風寒 若加滿 麻 黃 凝 感 濕 者 身 體 重 病 酌 尤 熱 嗽 咽 喉 乾 痛 鼻 出 熱 氣 痰 濃 腥 臭 金 沸 草

黃半夏 白薄荷 枇杷葉 五味 下寒 亦嗽 全熱 亦嗽 散 井 草 散 消 風 七 情 飢 飽 邪 氣 上 逆 四 參 湯 加 杏 門 五 味 子 桑 皮 飲

杏仁 桑白皮 貝母 茯苓 桔梗 味 下寒 亦嗽 全熱 亦嗽 散 井 草 散 消 風 七 情 飢 飽 邪 氣 上 逆 四 參 湯 加 杏 門 五 味 子 桑 皮 飲

冷致嗽 鬱金 嗽吐痰 食俱出 杏仁 細辛 枳殼 食積 痰嗽 手山查 枳殼 藥 聲 啞 外 感 寒 包 熱 者 細 辛 半 夏 生 姜 辛 以

鈿 清經年久嗽 服藥不瘥 餘無他證 與勞嗽 異 氣 咳 嗽 煩 冤 安 胃 丸 暴 嗽 諸 約 不 效 暴 嗽 而 疑 疑 補 之 非 以 其 效 而

上氣 喉中水雞聲 射干 麻 醋 搗 而 嗽 甘 草 二 兩 去 皮 作 二 十 段 中 半 另 開 用 猪 胆 汁 五 枚 食 鹹 嗽 嗽 白 芎 二 錢 砂 糖 二

餅子 炒內 燥 熟 剉 出 加 輕 粉 四 錢 另 炒 將 三 日 切 作 肺 脹 效 而 上 氣 鼻 扇 抬 肩 脈 浮 大 者 越 婢 湯 劫 半 無 外 邪 而 內 虛 之 肺

四 慘 輕 粉 在 內 令 患 人 吃 盡 吐 出 病 根 即 愈 肺 脹 效 而 上 氣 鼻 扇 抬 肩 脈 浮 大 者 越 婢 湯 劫 半 無 外 邪 而 內 虛 之 肺

張宜詞子海石香付瓜蒌仁青魚肝肺脹躁喘脈浮心下水加石膏龍湯肺脹而左右不得眠此痰夾瘀血碍氣而病

湯加杏仁訶子青皮竹瀝並汁

脈候 脈出魚際為逆氣喘息 效而脈虛必苦胃 浮直而濡者易治 喘而氣逆脈數有熱不得卧難治 上氣

喘嗽面腫肩息脈浮大者死 久嗽脈弱者生寔大數者死 上氣喘嗽低昂脈滑手足溫者生脈濇四肢寒者死

效而脫形身熱脈小堅急以疾為逆不過十五日死 效嗽羸瘦脈形堅大者死 咳嗽脈沉緊者死 浮直者生浮

醫案

文學金伯昌效而上氣凡清火潤肺化痰理氣之劑幾無遺用而病不少衰余診其脈腎大而軟此氣虛火不歸元用人參三錢煎湯送八味丸五錢一服而減後於補中益氣湯加桂一錢附子八分凡五十劑及八味丸二而而瘥