

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百六十



南京中医药大学图书馆版权所有

華清才卷

周王朱櫛撰

嬰兒永生

總論

辨見初受氣

兒氣

三月血脈生四月形

五、勤

七髮生八月臟腑具九

後六十日目瞳子成

普濟方

能頻笑識人百日任脈生能反覆百八十日尻骨成能
倨二百一十日掌骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚
三百六十日為一期膝骨成乃能行此是定法若有不
依期者必不壽也

相貌壽法

兒初生叫聲連延相屬者壽絕而復揚急者不壽啼聲
散不成人啼聲短不成人臍中無血者好臍小者不壽
通身軟弱如無骨者不壽鮮白長大者壽自開目者不

成人目視不正數動者大非佳汗血者多厄不壽汗不
流不成人小便凝如脂膏不成人頭四破不成人常搖
手足者不成人早坐早行早齒早語者皆惡性非好人
頭毛不周匝者不成人髮稀少者強不聽人頭上有旋
毛者早貴妨父母兒生枕骨不成者能言而死屍骨不
成者能踞而死掌骨不成者能匍匐而死踵骨不成者
能行而死臑骨不成者能立而死身不收者死魚口者
死股間無肉者死頤下破者死陰不起者死陰囊下白

者死赤者死卵縫通達黑者壽小兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其天壽大畧兒小時識悟通敏過人者多天大則項橐顏回之流是也小兒骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意回旋敏達者亦天即楊修孔融之徒是也由此觀之天壽大畧可知也亦猶梅花早發不覩歲寒甘菊晚成凋於霜後是知晚成者壽之兆也

論初生諸疾并治法

夫今之孕婦懷胎習以為常飲食不節起居不宜未誕之前勞役衆苦男子視胎以為常恣其所欲任其所施頻受觸穢所以生兒之後百脈致虛三焦不順關竅不通榮衛不和者初生之間便作疾患怪異多端不可得而詳述今舉二十有六証候槩而言之審其彼此兼與之療理而助其榮衛調順經絡得宜而已 呵者即張口而又合之欠者謂神不足故名呵欠非是疾病初生孩兒多有此象不足怪訝錢氏有謂呵欠遁悶良由胎

氣怪弱榮血不壯衛氣少順即不蔭心血不蔭心竅則神

不守神不守則呵欠遁悶無他患也古方有硃砂審法

用煎人參湯調和飲之者不若定志丸五七粒麥門冬

湯化開與服至妙也 伸者突其胃堂展其氣脈舒者

引其頭頸直其手足努而作之良久復作初生孩兒多

有亦非病也良由母懷胎胞起坐不得寬展或將絹帛

兜束肚皮或繫襁褓勒縛太緊或卧後盤旋或睡不轉

側是故偃抑胎囊氣失舒暢降生之後自然如此老嫗

知與按揉未知調其百脈宜將五朮湯浴之功效用桃
李槐柳皂莢各取枝煎湯候溫與浴仍與觀音散少少
與服效肺口之氣壅腠理不通外感寒邪或已傷風關
竅閉塞鬱鬱于中及至噴嚏方有少解不能發漸入胃
堂遂生痰熱既有痰疾即加之咳嗽輕則氣促短急重則驚
風搐搦搐搦之利若在初生尚云不可宜與消風散服
咳嗽宜與金沸草散人參羌活散二藥皆和且順雖則
嫩弱服之無恙其劑溫純化痰利膈口胎乃育形臍乃

根本胎氣固則形體壯壯臍深則根命長受氣乖遺形
萎臍突凡兒斷臍後漸長漸深吮乳調和愈固愈實是
血脈之相順致形體之相資初生之兒有熱在胃堂則
頻頻伸引呃呃作聲努脹其氣抑入根本之源所以臍
突腫赤虛大無可畏無識之夫將謂斷臍之不利而使
之然者非也臍斷不盈尺一月之內隨其根蒂而腐實者
深之弱者淺之深淺之理以其稟賦得此乃多由胎中
母多驚悸或因食熱毒之物有此宜與大連翹飲子其

熱自散其臍歸本不必以藥傳之恐毒傷入爲害 初

生三五日之間使有舉目上竄將身反張雖其非疾所致情實駭人凡醫工必作驚風療之其實非也推其所由兒在胎中受飲食熱毒之氣蘊在胃生下三日之前宜與黃連去熱膩粉散毒古人預計利害且又與人參朱蜜湯皆清心肺積毒既化兒獲無恙若不如此所生箇箇反張上竄或有不患此者鄙婦不思恣噉熱毒之物何足怪哉或投驚風涼藥亦愈但須明其所以用藥智

者裁之萬一不由驚風所傳當與詳悉凡嬰兒失之灌
溉長必焦萎兒誕後失乳哺壯必怯弱凡兒在胎前和
氣養之降生則美乳蔭之其氣衰則胎不壯其乳敗則
兒不長食不兼乳乳飽即不食亦無咎也惟食無乳禍
害生焉是故乳不可失食不可不節乳失時兒不病自衰
食失時兒無疾自怯乳者壯其肌膚食者厚其腸胃所
謂乳哺二周三歲則益其體今人未周奪其乳入月恣
肥甘豈不致疾 鐘洪聲大澗達流長緣處胞胎之中

受氣充足水火魚濟心腎不虧耳目兩竅相通大小二腸相佐喉以發聲清響洪亮者根固本壯稟賦崇實乃自然之理也初生啼哭發聲不出呃呃而作鬱鬱而為其或短吸上下氣不相乘醫與果訣云此由胎氣不足何用投藥假使成人父母不悅根本不壯何煩藥餌如果木之萎又奚宜也古方常用父母呼呵及以葱熨令聲發越難挽自無根本產子育兒當知其理 人之受胎應數降生之後不拘貧富其子皆以精神全氣脈壯

視聽欣喜取與喜怒周晬之間於人事情懷意旨撫叱以知其逆順方可謂孩兒性識之本也其或周晬已過不認名不偎親常常皺顏容啞臉含啼東喚西向南呼北面其坐若木其臥若尸其行即蹶其立若掇筋氣脈柔怯虛弱食不辭飽渴不知飲若或長成一定庸蠢如此胎氣月數不足者難保千日 胎氣已滿產降必令畫一而氣包血養開九竅以通連在乎十月之中形骸已具分娩片時之內穀道無穿或緣其在胎中已空九竅

若不通利如何四體百骸遂能生長斯由熱壅所致肺經之極結於肛口閉而不通降生之後無復滋潤乾燥而合若投寒涼之藥愈閉不通若下溫平之藥而又不通者即是兒氣不順腸胃虛澁穀道乾燥閉合可畏方不詳載藥無速驗至於此等所受須當以物透而通之金釵為上玉簪次之蘇合香丸內入孔中凡刺三寸許屎出為快曾見肛門肉合小便通利大便至死無能通者愚鄙燒火筋刺之事出不得已既然肉合決無奇方

試以金玉重力刺之有勝火筋又有初生胎熱一二日不通者與服洗心散以通為度四順飲加荊芥煎亦良產婦血敗者當下榮者化乳血下不盡毋致其疾乳有不調兒招其病凡兒吮其乳有不到於胃堂氣滯積阻或令兒餓久乃吮出或問其無恙否曰不宜也久吮令兒困力乏氣怯肌羸脾家若虛遂作癇疾及至成疾脾風定矣初生與周晬之兒胃氣未備穀食未全藉吮乳快和無恙自然臟腑充百脉順肌體壯神氣清其或

母用性不順則氣血亂而乳汁不和乳汁不和令兒覘
逆宜乎速與療理若作尋常必致害生小沉香煎及鹽
豉丸兼與服之乳母宜服藿香正氣散加枳朮至良
論新生將護法

小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此

謂之王衡

衡音作

若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

兒生落地不作聲者取煖水一器灌之須臾當啼兒生
不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却呵

之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以葱白徐
徐鞭之即啼兒已生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹
內雷鳴須先浴之然後斷臍不得以刀子割之須令人
隔單衣物咬斷兼以煖氣呵七遍然後纏結所留臍帶
令至兒足跖上短則中寒令兒腹中不調當下痢若先
斷臍然後浴則或水入臍中致令發腹痛其臍斷訖連
臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成疾斷兒
臍者當令長六寸長則傷肌短則傷臟不拘時斷若接