

欬嗽

因全夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則

欬嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心

受之其嗽不已則傳於腑妊娠病久不已則傷胎也

薛前證若秋間風邪傷肺用金沸草散雜欬夏間

火邪尅金用人參平肺散雜喘冬間寒邪傷肺用人

參敗毒散雜傷春間風邪傷肺用參蘇飲雜癆若脾

肺氣虛用六君芩歸桔梗若血虛四物桑白皮杏仁

桔梗腎火上炎用六味丸雜虛加五味子煎服脾胃

氣虛風寒所傷用補中益氣雜勞加桑皮杏仁桔梗

蓋肺屬辛金生於巳土嗽久不愈者多因脾土虛而不能生肺氣而腠理不密以致外邪復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治法當壯土金生腎水爲善 一妊娠氣喘痰甚諸藥不効素有帶下始於目下浮兩月餘其面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸料數劑而愈 一妊婦嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能同撮用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而愈 一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以爲此水洗為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金
小柴胡湯加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈但欲作
嘔此肝侮脾也用六君子加升麻柴胡而痊
欵冬花散 治妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽

頭疼

欵冬花

麻黃

貝母煨

前胡

桑白皮

紫苑各半兩

旋復花

白朮

甘艸各二兩

石膏一兩

右咬咀每服肆錢水一盞置三片煎至半棗分去滓

濕服

苦梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急

桔梗

紫蘇

人參

桑白皮

貝母

甘草 各半兩

天門冬 去心

赤茯苓 各一兩

麻黃 七乎半

每服肆錢水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母 各半兩

陳皮 去白

大腹子

桑白皮

紫蘇

五味子

二升半

右收咀每服肆錢薑三片水煎

麻黃散

治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃

去節

陳皮

去白

前胡

各一兩

半夏

湯洗炒

人參

白朮

枳殼

炒

貝母

甘艸

各半兩

收咀每服肆錢葱白五寸薑三片棗一枚水煎服

百合散

治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合

紫苑茸

洗

白芍藥

赤茯苓 法皮

桔梗 炒

前胡 各去芦

貝母 去心各

甘草 伍分

作一服水二鍾薑伍片煎至一鍾不拘時服

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑 一兩

桔梗 半兩

甘草

杏仁

桑白皮 各二

天門冬 一兩

右咬咀每服三錢竹茹一團水煎去滓入蜜半匙

再煎一兩沸溫服

局方華蓋散治妊娠咳嗽不止穩重有效 見雜病咳嗽

喘

呂滄洲治經歷哈散侍人病喘不得卧衆作肺氣受風邪治之呂診之氣口盛于人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不一奔迫而上衝非風寒作喘也乃用催生湯加芎歸二二三升服之夜半果下一死胎喘即止哈散密囑曰病妾誠有懷以室人見嫉故藥去之衆所不知也衆慚而去

平安散 治 妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹

脇脹痛

川芎

木香

各一
手半

陳皮

熟地黄

洗

乾薑

炮

生薑

厚朴

去
粗皮
製
炒

甘草

各
手

右作一服水二鍾入燒盞一捻煎至一鍾不拘時服

桔梗湯

馬兜鈴散

並見前
咳嗽條

瘧

大妊娠病瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱作其發晏者由風邪客於風府循督而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日晏與早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注於伏衝之脈其行九日出缺盆其氣既止故發更早其間日發者風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作也妊娠而發多傷於胎

薛前證因脾胃

虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所

伏審係飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外邪

多而飲食少用藿香正氣散雜病中風外邪少而飲食多

用人參養胃湯雜瘡勞傷元氣用補中益氣湯雜勞

若鬱怒所傷用小柴胡湯傷寒少陽病兼歸脾湯健忘若木

侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥仍參三

陰三陽經而治之 一婦人因怒患瘧舉發無期久

而不已胸腹不利飲食少思吞酸吐痰用六君子加

柴胡山梔二十餘劑尋愈但肺熱少食又用四君子

加柴胡升麻為主佐以逍遙散而痊 一妊婦瘧久

不已暖氣下氣胸腹膨脹食少欲嘔便血少寐此屬

肝脾鬱怒用歸脾湯加柴胡山梔漸愈又用六君子湯加柴胡山梔升麻而愈一妊婦患瘧已愈但寒熱少食頭痛晡熱內熱此脾虛血弱也用補中益氣湯加蔓荊子頭痛頓止又用六君子湯加芎歸飲食頓進再用逍遙散加參朮而寒熱愈驅邪散治妊娠停食感冷發為瘧疾

白朮

草薺仁

高良薑炒

縮砂仁

藿香葉

橘紅

白茯苓

去皮各一分半甘草炙五分

右作一服水二鍾生薑伍片紅棗一枚煎一鍾不

拘時服

七宝散 治男婦一切瘧疾或先寒後熱或先熱後

寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日

兩三發或連日發或間日發或三四日一發不問

鬼瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

常山

厚朴

青皮

陳皮

甘艸

檳榔

草果

去皮各
共七分

一 咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎至

一大盞去滓露一宿再用酒水煎滓一次去滓亦

露一宿來日當發之日
盪溫面東先服頭藥少頃
再服藥滓大有神効
予嘗治一妊婦六七個月
患瘡先寒後熱六脉
汗緊醫用柴胡桂枝無効予
曰此非常山不愈衆醫難之越數日疾甚乃從予
治以七寶散一服瘡黃帝問婦人重身毒之柰何
岐伯曰有故無殞帝曰何謂也岐伯曰大積大聚
其可犯也衰其大半而止誠審藥物之性明治瘡
之方何疑攻治哉

柴胡散

治妊娠瘡疾

柴胡二系

生大黃二系

生黃芩一系

甘艸 一糸

右咬咀作一服水煎臨發日五更温服必取利為愈如胎上逼心可服枳殼散忌油麵辛熱等物

又方

用大黃 二兩 柴胡 一兩 黃芩 一兩 芍藥 一兩 為細末

清水糊為丸如梧桐子大每服百丸臨發日五

更冷湯吞下隔兩時再服伍拾丸以利為度 若

妊娠瘧疾發熱口乾渴飲無度者亦用生地黃 一兩

黃芩 麥門冬 去心 人參 知母 各一兩 石膏 二兩 甘草 一兩

乾葛 一兩 右咬咀每服伍錢入烏梅 半个 煎服

又方

用常山一兩石膏一兩黃芩各半烏梅七合

細切以水酒各一椀浸一宿平旦煎至一椀去滓

分二服臨發時服

右方犯常山大黃吐下之劑若六脈浮緊有力中

有頑痰積執者用之所謂有故無殞也其他療治

方法已備雜證瘡內茲不贅若執甚恐致動胎者

亦如傷寒熱病治法以白藥子伏龍肝等塗臍上

下可也

方前集 卷十四 傷寒 七

不似也

本或身

式能

自地

谷大

長之

麻四

用留

及氏

不似也

本或身

式能

自地

谷大

長之

麻四

用留

及氏

不似也

本或身

式能

自地

谷大

長之

麻四

用留

及氏

不似也

本或身

式能

自地

谷大

長之

麻四

用留

及氏

不似也

本或身

式能

自地

谷大

長之

麻四

用留

及氏

不似也

本或身

式能

自地

谷大

長之

麻四

用留

及氏