

香附醋炒 延胡索各一錢五分

產婦冒風加防風天麻各一錢 血暈加五靈脂醋炒 荊芥穗炒黑各一

三四朝後發熱加炮薑炒黑 人參黃芪蜜炙各一錢 心膈迷悶加

陳皮枳壳砂仁各一錢 血崩加地榆黑山梔丹皮各一錢 咳嗽加

杏仁桑皮桔梗各一錢 瘀血不行而腹硬加紅花枳實桃仁各一

此惟腹硬者用之若腹不硬而瘀血作痛則山查益母諸

方治之而有餘矣飲食不進加山查麥芽各一錢 脾胃作脹加

白朮茯苓蒼朮厚朴陳皮砂仁枳壳各一錢 心神恍惚加茯神

遠志各一錢 胎衣不下加朴硝二錢 水二盅煎六七分服

肉線方

治產後有肉線垂出約長三四尺觸之心痛欲絕此過於用力所致切勿扯斷斷則難治。

老薑

連皮搗爛三觔 蒜油二觔

先用舊絹一塊疊作長方式將肉線輕輕盛起盤曲作三團

納入產戶再將前藥拌勻炒乾乘熱盛於絹袋就近薰之稍

溫卽另換熱者薰一日可縮入大半再薰一日全愈

救急方

治產後鼻中流血不止口鼻漸起黑氣。

本婦頂心髮

三五根 紅絨線三五根

合紮右手手指節上令極緊

卽止

此禳壓法爲急切無醫藥者而設

小兒回生急救方

懷燕堂
王氏傳

凡小兒驚嚇中惡以及風痰火閉卒然死去山陬僻壤一時延醫不及卽掐兒手合骨穴次掐老龍穴一啼卽醒倘不應則以艾絨搓緊如蘿蔔子大於中衝穴灸之此火一燃則心中惕然而覺倘此火不應百無一救矣今將穴道繪圖於左

第二指

老龍穴在手背揆指甲

左手側面圖



每月逢天干癸日每日逢地支未時以及初六日俱不宜灸手

此方余得之華山老人所授真仙方也

保赤驗方類

兒科古稱啞科以其口不能言無從發問而窮詰病因最難投劑予所採輯諸方俱是外治之法有益無損如必需服藥予非岐黃煎方不敢鈔載附錄觀察紋色數條於後使爲父兄者猝遇病患先看面色以知其所屬次驗虎口以辨其所因然後延醫投劑庶百無一失也

三朝浴兒

取桑槐榆柳桃細嫩枝二三十節煎湯候溫入猪胆汁洗之週歲內可免瘡疥又可避惡邪

初生血皮

赤色有紅筋受胎未足也

早白稻粳米粉撲之肌膚自生

不乳

新產小兒或剪刀股裏緊吃乳不下

用獨頭大蒜切薄片放在兩腮以艾炙之加哭即好不哭無救

吐乳

白蔻

砂仁

各十粒

炙甘草

二錢

爲末常摻入兒口中即止

口瘡舌瘡

桑皮中白汁敷之立愈

又用生黃柏末塗之

舌瘡

飲乳不得

白礬和雞子置醋中搽兒足底二十日愈

牙疳

人中白研末搽之立愈

耳邊腮腫

五倍子

一箇包燒灰存性

研末雞子白調勻遍敷立消

丹瘤

音留瘤流也
流聚而生腫

草麻子

去壳

研入麴一匙調塗甚效

臍內潰爛

出水不止
垂危者

赤石脂

二錢
煨

研末摻之立愈

日啼不止

牛黃

辰砂

飛各五厘

研末塗兒舌上立止

夜啼

雞糞塗兒臍中極佳男雌女雄

初生夜啼

用燈花四五丸研碎以燈心湯調下即止

月內胎驚

母猪乳同硃砂牛乳少許抹口甚效

紫遊風

大黃

朴硝

青黛

各三錢

研末水調敷患處愈

赤遊丹

月內小兒或週歲之內身上忽見紅紫塊如雲頭或平或高起
速者一日之內遍處纏到緩者逐漸蔓延自外纏入心口內者
死此危症也古方用糞金汁塗如不得金汁急尋糞內蛔蟲四
五條指乾糞穢將竹片削刀破蟲取汁盛盃內先於口內用盃
鋒輕輕刺破將蟲汁塗之自愈此方屢試俱驗勿嫌臭穢不用
塗後切不可用水洗去須待數日後肉色不紅全愈方可洗去

瘡疾

十日
後用

代赭石

二錢
醋煨

紅硃砂

五分

砒霜

一大豆

同爲末以紙包七重打溼煨乾入射香一分爲末麻油調塗

鼻尖上及眉心四肢神應

瀉痢

土木鼈 一箇
母丁香 四粒
麝香 一分

研末吐津爲丸芡實大納臍中外用膏藥貼牢卽愈

脫肛 因久患瀉痢所致

宜煎葱湯熏洗令軟送上 或以五倍子末敷

漸爲托入煎湯洗亦可 或用鮮蚌肉一隻敷肛門上卽能縮

入

陰癰 腫大不消
硼砂 一錢

水研塗之甚效

痰喘 巴豆 一粒

杵爛綿包塞鼻孔男左女右痰卽下

痞塊

用攢盒內小磁碟將皮硝裝滿雄黃末蓋面綿紙糊口以針刺孔令定痞上將紙裏緊三日卽消

禿瘡

鴿子尿

新瓦焙末存性

麻油調搽數次卽愈菜油亦可如瘡

堆起先用清米泔水同葱川椒煎湯洗去再搽無不驗者

肥瘡

琵琶鯽魚

七箇

放瓦上焙乾爲末菜油調敷數次愈

黃爛瘡并一切惡瘡

牛屎燒存性爲末菜油調搽

如黃水瘡

用黑驢屎燒存性爲末香油調搽神效

一二三歲遍身生瘡

真麻油浸紫菜一錢

搽之 搽好一處再搽一處起先勿遍

身搽之

痘出眼睛內 兒生母中指上刺血一點滴入眼內痘即移出

驚風

梔子一枚

為末

鷄子一枚

去黃用白和前末調勻搽

兒腹四圍圈之約二箇時辰即愈

畫眉膏

小兒斷乳後往往日夜啼哭俗有思奶疳之說用此。

黑山梔三箇燒存性

雄黃少許

辰砂少許

共為末入生麻油輕粉少許

調勻候兒睡熟四顧不見時抹

於兩眉上醒來便不思食未效再抹

一方去雄黃輕粉加白芨用青油調

附小兒一歲至十二歲凡衣襖裙袴等物切忌不可夜露有鳥
名姑獲又名鈞星鬼每至夜深飛過若落毛羽尿糞於近身
物上使兒非癩卽死
保赤者不可不知

看面色歌

面赤爲風熱面青驚可詳心肝形此見脉證辨溫涼脾快黃疳積

虛寒眊白光若逢生黑氣腎敗命須亡

凡兒十歲以前忽然面上如青紗蓋定後髮際至印

堂不論病之深淺有六十日必死若至鼻柱一月須亡更到人中不過十日其色盈卽日哭傷

驗虎口法

小兒三歲以下有病須看男左女右手又處名虎口第二指側看
第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬
熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾之困也若現
於風關爲輕氣關爲重過於命關則難治矣

五指稍頭冷驚來不可當若連中指熱必定是傷寒中指獨自
冷麻痘證相傳女右男左分明仔細看

附虎三口關圖



手指脈紋色形歌

乚 魚刺形主驚風痰熱

水字形主食積咳嗽驚疳

3 蟲紋形主肝蟲大腸氣積

乱 亂紋形主蟲

9 懸針形主傷風泄瀉積熱

乙 乙字形主肝病驚風

2 環形主疳積吐逆

珠 珠形主死

魚刺驚風痰熱詳懸針瀉熱感風傷水流食積驚疳嗽乙字驚風
肝病彰蟲主肝蟲腸氣積環形吐逆有疳藏亂紋蟲擾無他症珠
子成形兒欲亡

