

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷

三十九
四十



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

次定曰重人三

備急千金要方卷三十九

附方

醫病凡散
聖人之道
博濟物博
得故有萬病方焉

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

眾藥以戒不虞倉卒之
以此方散在羣典乃令
為斯品庶使造次可得

學才難片言五
造加拍要如以

次定曰重人三

備急千金要方

一

好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備痾瘵也

芫花散治一切風冷痰飲癥癖瘡瘡萬醫所不治者皆

治之

一名登仙酒
一名三建散

芫花

桔梗

紫苑

大戟

王不留行

烏頭

附子

天雄

白朮

五加皮

蕤花

狼毒

莽草

藥荊

栝萋根

躑躅

麻黃

白芷

荊芥

茵芋
各十分

車前子

石斛

人參

石南

石長生

各七分

蛇床子

萆薢

牛膝

狗脊

菟絲子

菝葜

秦艽

各四分

藜蘆

薯蕷

薏苡仁

巴戟天

細辛

當歸

芎藭

乾地黄

食茱萸

杜仲

厚朴

黃耆

山茱萸

乾薑

芍藥

桂心

黃芩

吳茱萸

防己

遠志

蜀椒

獨活

五味子

牡丹

橘皮

通草

柴胡

栝子仁

藁本

菖蒲

茯苓

續斷各二分

右六十四味

千金翼有麻花半夏赤車使者高良薑紫葳無白朮食茱萸等七味

並不

治不擇不炙不熬但振去塵土擣以粗羅下之即與

服凡是猪雞五辛生冷酢滑任意食之無所忌惟諸

豆皆殺藥不得食

藥散

三兩

細麴末

二升

糯米

三升

真酒

五升

先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去火氣春
月稍涼夏月揚絕火氣令極冷秋稍溫次下麴末搗
使和柔相得重下藥末搗使突突然好熟乃下真酒
重搗使散盛不津器中以淨杖攪散經宿即飲直以
布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知爲度微
覺發動流入四肢頭面習習然爲定勿更加之如法
服之常常內消非理加增必大吐利服散者細下篩
服一方寸匕和水酒漿飲無在稍增以知爲度服丸

者細下篩蜜丸如梧子每服七丸但此藥或丸或散
皆可惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取內消大
益勝於五石兼逐諸病功

十二種癰痺并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如
水雞聲不得眠臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消
壅閉不通心腹脹滿及連胃背鼓氣堅結流入四肢或
復又心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢
疝蟲寸白諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無

力陰入骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼
四肢沈重行立不能久婦人因產冷入子臟臟中不淨
或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疹痛為患
或因此斷產并小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病
此藥以三丸為一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮
盡故稱萬病丸以其用牛黃為主故一名牛黃丸以耆
婆良醫故名耆婆丸方

牛黃

麝香

犀角

各一分

桑白皮

茯苓

乾薑

桂心

當歸

芍藥

芍藥

甘遂

黃芩

蜀椒

細辛

桔梗

巴豆

前胡

紫苑

蒲黃

葶藶

防風各關分

蜈蚣三節

石蜥蜴

人參一

朱砂

雄黃

黃連

大戟

禹餘糧

芫花

芫青七枚

右三十一味

崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風為二十七味

並令精細牛黃

麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合搗重
絹下篩以白蜜和更搗三千杵密封下破除日平旦
空腹酒服三丸如梧子大取微下三升惡水為良若
卒暴病不拘平旦早晚皆可服但以吐利為度若不
吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利為度不得限
以丸數病強藥五服即定一服一盞治一切冷病積
冷陰瘦者四兩和酒一斗强者六兩和酒一斗半痰
飲疝瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗瘕瘕腸鳴噫

八兩和酒二斗久疰及久勞上同癩痔塊堅冷嗽上
氣二十兩和酒五斗奔狇冷氣六兩和酒一斗半噎
及冷痢上同卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者三服
定一服一盞大吐出鮮血瘴氣上同蠱毒五服定一
服一盞溫瘡瘡瘡並上同可三服一盞永瘥治婦人
諸風諸病等並依前件帶下十二兩和酒三斗崩中
六兩和酒一斗半月閉不通及冷病不產並上同斷
緒不產八兩和酒二斗月水前後不調乍多乍少亦

令人絕產四兩和酒一斗產後風冷不產六兩和酒
二斗若重者八兩和酒二斗甚者十六兩和酒三斗
大重者子宮下垂十六兩和酒四斗

論曰遠覽前古莫覩此方有高人李孝隆者自云隋初
受之於定州山僧惠通道人此後用之大有效驗祕而
不傳但得其藥其方不可得而聞始吾得之於靜智道
人將三紀於茲矣時俗名醫未之許也然比行之極有
神驗其用藥殊不倫次將服節度大不近人情至於救

急其驗特異方知神物效靈不拘常制至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其不知所以然而然雖聖人莫之辯也故述之篇末以貽後嗣好學君子詳之非止救物兼深抑亦庶幾於博見矣

太乙神精丹治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癩狂鬼語蠱毒妖魅溫瘧但是一切惡毒無所不治方

丹砂

曾青

雌黃

雄黃

磁石

各四兩

金牙

二兩半

右六味各搗絹下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醃醋
浸之曾青用好酒於銅器中漬紙密封訖日中曝百
日經夏急五日亦得無日以火暖之然後各研令如
細粉以醃酢拌使乾濕得所內土釜中以六一泥固
濟勿令泄氣乾後安鐵環施脚高一尺五寸置釜上
以漸放火無間軟硬炭箠皆得初放火取熟兩秤炭
各長四寸置釜上待三分二分盡即益如此三度盡
用熟火然後用益生炭其過三上熟火已外皆須加

火漸多及至一伏時其火已欲近釜即便滿就釜下
益炭經兩度即罷火盡極冷然後出之其藥精飛化
凝著釜上五色者上三色者次一色者下雖無五色
但色光明皎潔如雪最佳若飛上不盡更令與火如
前以雄雞翼掃取或多或少不定研和棗膏丸如黍

粒

一本云丹砂曾青雄黃雌黃各二斤丹砂以大酢
甕罌中漬曾青美酒漬紙密封閉日曝一百日雄

黃雌黃各油煎九日九夜去油膩訖更擣數千杵皆
勿研之別以大酢拌令浥浥然內藥土釜中以雄黃
在下次下雌黃次曾青次丹砂以甘土泥塗勿令餘
毫毛許乾以剛炭火燒之九日九夜去釜五寸九日

九夜至釜底九日九夜侵釜腹三寸三九二十七日
冷之一日一夜以刀子於釜際利著一匝開之取丹
丹成訖細研如粉以棗膏和一切丹不得用蜜皆用
棗膏學者宜知此術舊不用磁石金牙今加而用之
治偏風大風惡疾癩癩癰瘡鬼打等最良服法平旦
空腹一丸如黍米為度其瘡病積久百方不瘥又加
心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服一丸吐即
瘥亦有不吐瘥者若不吐復不瘥者更服一丸半仍
不瘥者後日增半丸漸服無有不瘥氣亦定當吐出
青黃白物其因瘡兩脇下有癖塊者亦當消除若心