

備急千金要方卷第五下

少小嬰

朝奉郎守太常少卿充祕閣校理判登聞檢院護軍賜緋袋簪林億等校正

欬嗽第六

方十
四首

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小差復發五月中忽小小欬嗽微溫和治之因變癰一日二十過發四肢縮動背脊𦏧𦏧眼反須臾氣絕良久復蘇已與常治癰湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁竹瀝湯方

竹瀝

合五

黃芩

銖三十

木防已

羚羊角

銖六

大黃

兩二

茵芋

銖三

麻黃

白薇

桑寄生

葶藶

甘草

各半兩

白朮

六銖一方
作白鮮

右拾貳味㕮咀以水貳升半煮取藥減半內竹瀝煎取壹

升分服貳合相去壹食久進壹服一方無

紫苑湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣逆或鼻塞清水出者方

紫苑

杏仁各半兩

麻黃

桂心

橘皮

青木香六銖黃芩

當歸

甘草各半兩

大黃一兩

右拾味咬咀以水三升煮取玖合去滓六十日至百日兒

一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬晝夜不息食則吐不下方

五味子

當歸各半兩

麻黃

乾薑

桂心

人參

紫苑

甘草六銖

細辛

款冬花三銖大黃一兩半

右拾壹味㕮咀以水貳升半煮取玖合去滓兒陸拾日至
百日壹服貳合半壹百日至貳百日壹服叁合其大黃別

浸壹宿下

壹方無散冬大黃有大棗叁枚

治小兒大人欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方

燒淡竹瀝煮貳拾沸小兒壹服壹合日伍服大人壹
升亦日伍服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黃

兩四

麥門冬

五味子

蜜牒半

大黃

消石

各一兩

右陸味㕮咀以水叁升煮取壹升去滓內消石蜜煮令沸
服貳合日叁宵中當有宿乳汁壹升許出大者服伍合
射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干

兩一

半夏

伍枚

桂心

伍寸

麻黃

紫苑

甘草

生薑各一兩

大棗二十枚

右捌味㕮咀以水柒升煮取壹升伍合去滓內蜜伍合煎壹沸分溫服貳合日叁

又方

半夏

四兩

紫苑貳兩

款冬花二合

蜜一合

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘草

各二兩

右玖味㕮咀以水壹升煮半夏取陸升去滓內諸藥煮取貳升伍合伍歲兒服壹升貳歲服陸合量大小多少加減之杏人丸主大人小兒欬逆上氣方

杏人參升熟擣如膏蜜壹升為參分以壹分內杏人擣令強更內壹分擣之如膏又內壹分擣熟止先食已含咽之多少自在日叁每服不得過半方寸匕則痢

又方

半夏

二斤去皮河水洗六七度完用

白礬

壹斤

丁香

甘草

草豆蔻

川升麻

縮砂

各四兩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七日夏

秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾每服一粒

嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得服

疑非孫思邈方

治少小嗽八味生薑煎方

生薑

兩

乾薑

兩

桂心

兩

甘草

兩

杏仁

升

款冬花

紫苑

兩

蜜

升

右合諸藥末之微火上煎取如飴鋪量其大小多少與兒

含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

治小兒嗽日中差夜甚初不得息不能復啼四物款冬丸方

款冬花

紫苑

各壹兩

桂心

兩

伏龍肝

陸銖

千金方五十一
右末之蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令兒飲之日三傳之漸漸令兒飲之

治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴昌蒲丸方

昌蒲

烏頭

杏人

礬石

細辛

皂莢六

款冬花

乾薑

桂心

紫苑各銖八

蜀椒銖

吳茱萸銖六

右十二味末之蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十九日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服便差治少小十日已上至五十日卒得聲欬吐乳歐逆暴嗽晝夜不得息桂枝湯方

桂枝兩半

甘草兩

紫苑銖八

麥門冬壹兩拾捌銖

右四味咬咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

治小 卒肩息上氣不得安此惡風入肺麻黃湯方

麻黃兩四

甘草兩一

桂心寸五

五味子半

半夏

生薑兩二

右六味咬咀以水五升煮取二升百日兒服一合大小節

度服之便愈

癖結脹滿第七方三十五首

紫雙丸治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹絞痛

大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過度不知自

止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不差更可重服小兒

欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調

悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方臣億等詳序

紫丸者即前變蒸篇十四味者是也云服紫丸不下者服赤

力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆銖

麥門冬銖

甘草銖

甘遂銖

朱砂銖

蠟銖

麝核銖

牡蠣銖

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研麝核人令極熟乃內散更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二九五歲六歲者服如大麻子二九七歲八歲服如小豆二九九歲十歲微大於小豆二九常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下九皆雙出也下甚者飲以冷粥即止治小兒胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不起兒乳哺不為肌膚心腹痞滿委黃瘦瘠四肢痿痹繚戾服之令充悅方

芍藥二兩

大黃兩

甘草兩

柴胡兩

鼈甲

茯苓各二兩半

乾薑

半兩如熱人參兩

右八味末之蜜丸如大豆服一九一歲已上乳服三九七歲兒服十九日二

治小兒宿乳不消腹痛驚啼牛黃丸方

牛黃銖

附子

貳枚

真朱

壹兩

巴豆

壹兩

杏仁

壹兩

右五味搗附子真朱為末下篩別搗巴豆杏仁令如泥內藥及牛黃搗一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一九三歲兒服如麻子一九五六歲兒服如胡豆一九日二先乳哺了服之鬲上下悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以藥完出為度

治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦芒消紫丸方

芒消

大黃

各肆兩

半夏

貳兩

代赭

壹兩

甘遂

貳兩

巴豆

貳伯枚

杏仁

壹伯貳拾枚

右七味末之別搗巴豆杏仁治如膏旋內藥末搗三千杵

令相和合強者內少蜜百日兒服如胡豆一九過百日至一歲服二九隨兒大小以意節度當候兒大便中藥出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥

梔子略二

柴胡六兩

升麻

黃連

黃芩各二兩半

竹葉切一兩半

桔梗一兩半

細辛

拾伍銖

知母

大黃各二兩

右十一味咬咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十

歲兒為三服一本有枳實杏人各一兩半而無桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃

柴胡

黃芩略三兩

枳實一兩半

升麻

芍藥

知母

梔子略二兩

生薑銖八

杏仁二兩

竹葉切一兩半

右十一味咬咀以水六升半煮取二升十歲至十五者分三服

治小兒結實乳食不消心腹痛牛黃雙丸方

牛黃

太山甘遂

各半兩

真朱

杏人

芍藥

黃芩

各一兩

巴豆

銖八

右七味末之蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒大小加減之

牛黃鼈甲丸治少小癰實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃

銖半

鼈甲

麥麴

柴胡

大黃

枳實

芎藭

各一兩

厚朴

茯苓

桂心

芍藥

乾薑

各半兩

右十二味末之蜜丸如小豆日三服以意量之

治小兒心下痞淡癖結聚腹大脹滿身躰壯熱不欲哺乳芫

花丸方

芫花兩一

大黃

雄黃各二兩半

黃芩兩一

右四味末之蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食真朱丸方

真朱兩一

麥門冬兩一

蕤人枚二百

巴豆枚四十

右四味末之蜜丸晷歲兒服二丸如小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為度當下病赤黃白黑葵汁下勿絕藥病盡下自止久服使小兒肥白已試驗

鼈甲丸治少小腹中結堅脇下有疹手足煩熱方

鼈甲

芍藥

大黃各三兩

茯苓

柴胡

乾薑略二十銖

桂心六銖

麝蟲

蟻螬各二枚

右九味末之蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知為度

治小兒痞氣脇下腹中有積聚堅痛鼈頭丸方

鼈頭一枚

蝨蟲

麈尾

桃人

各十枚

甘皮

半兩

右五味末之蜜丸服如小豆二九日三大便不利加大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦瘳瘳宜常服不妨乳方

甘草五兩末之蜜丸一歲兒服如小豆十九日三服

盡即更合

治小兒五六日不食氣逆桂心橘皮湯方

桂心三兩

橘皮三兩

成擇薤

五兩

黍米

合五

人參

半兩

右五味㕮咀以水七升先煮藥煎取二升次下薤米米熟

藥成稍稍服之

治少小胃氣不調不嗜食生肌肉地黃丸方

乾地黃

大黃

各一兩六銖

茯苓

銖八

當歸

柴胡

杏仁

各半兩

右六味末之以蜜丸如麻子大服五丸日三服

治少小脇下有氣內痛喘逆氣息難往來寒熱羸瘦不食馬

通栗丸方

馬通中栗

杏仁

紫苑

細辛兩各半

秦艽

半夏

茯苓

五味子

各六銖

右九味末之蜜丸服如小豆十九日三服不知加至二十九

治小兒不痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服

又方

腹上摩衣中白魚亦治陰腫

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方 韭根汁和猪脂煎細細服之

又方 車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方 米粉鹽等分炒變色腹上摩之

小兒癖灸兩乳下一寸各三壯

治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青涎下當歸丸一名黑丸方

當歸 銹

吳茱萸 一作 炙

蜀椒 各半兩

細辛

乾薑

附子 各十銖

狼毒 銹

豉 七合

巴豆 十枚

右九味擣七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍內末
擣令相得蜜和桑椹盛蒸五升米飯下出擣一千杵一月
兒服如黍米一丸日一夜二不知稍加以知為度亦治水癖
馬齒莨九治小兒胎寒嘔啼驚風癇腹脹不嗜食大便青黃并

大人虛冷內冷或有實不可吐下方

馬齒礬一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二九
日三小兒以意減之以腹內溫為度有實實去神妙
治小兒忽患腹痛天矯汗出名曰胎寒方
煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

治小兒暴腹滿欲死半夏丸方

半夏隨多少微火炮之擣末酒和服如粟米粒大五
丸日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參

兩

厚朴

甘草

各半兩

白朮

銖八

右四味咬咀以水一升二合煮取半升六十日兒服一合
百日兒分三服葢歲分二服中間隔乳服之乳母忌生冷
油膩等一方加乾薑一分或加生薑三分