

欽定四庫全書

子部

普濟方卷

四十至
四十二



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩履臣袁天錫

編修臣倉聖脈履勘

普濟方卷四十

周王朱橚撰

大腸腑門

大便不禁論

夫大腸為傳導之官掌七糟粕魄門為之候若其臟寒
氣虛不能收斂致糟粕無所制約故遺失不時治之宜
此方論所謂證可去者是也

方

陳橘丸 治大便不禁腹內疝痛

陳橘末

炒

白茯苓

去黑皮

黃連

去鬚炒

黃柏

去粗皮炙

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

龍骨

各一兩

赤石脂

甘草

炙剉

人參

當歸

切焙各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五六丸空心米飲

下日再服

救陽丸 治大便不禁手足厥冷面色青白

吳茱萸

湯浸焙乾

乾薑

炮

赤石脂

蜀椒

炒出汗

硫黃

飛研

右等分為末稀糊為丸梧桐子大每服十五丸米飲下空心食前漸加丸數鹽湯亦得

龍骨湯 治大便不禁真氣羸弱

龍骨

阿膠

炙燥

乾薑

炮

黃連

去鬚炒

粳米

三合

附

炒熟

子

炮去皮臍

甘草

炙判

黃芩

去黑心

芍藥

各三分

石

榴

一枚大者切另

搗入

右㕮咀每服五錢水盞半煎一盞去滓空心溫服

日再

地榆丸 治大便不禁

地榆一兩 白龍骨 赤石脂 沒石子 熟艾去梗炒

橡實殼炒各半兩 黃栢去粗皮炙三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心米飲下

日再

附子湯 治下焦虛寒大便不禁

附子炮去皮臍半兩 黃連去鬚炒二兩 阿膠炙燥三分 甘草炙 乾薑

炮各半兩 赤石脂 厚朴去粗皮薑汁炙各一兩

右咬咀每服五錢水盞半煎一盞去滓空心溫服日再

石榴皮湯 治虛寒客於下焦腸滑洞洩困極欲死

酸石榴皮

炒

乾薑

炮各一兩

黃栢

去粗皮炙

阿膠

炙燥各三分

右咬咀每服四錢水一盞煎四分去滓空心溫服或無黃栢用黃連亦得

厚朴荳蔻湯 治大便不禁

肉豆蔻

去殼炮半兩

龍骨

白朮

剉炒三分

厚朴

去粗皮薑汁炙剉一

右吹咀每服五錢水盞半生薑三片煎一盞去滓空

心溫服

朝真丸 治虛損洩瀉大便失禁

硫黃

一兩
研飛

青鹽

一錢
研

晉礬

熬枯
一兩
研

右研勻水浸炊餅丸萊豆大每服十五丸至二十丸

溫酒下空心食前或用丹砂為衣亦得

福建丸 治大便不禁并腸鳴

附子

去皮臍 剉一兩 厚朴 去麤皮二兩同附子用生薑汁浸一宿於瓦器內炒

右為末用酒煮陳橘末為糊丸梧桐子大每服十五丸至二十丸生薑鹽湯下空心食前服

石硫黃湯 治虛冷大便不禁氣脫神昏

石硫黃

明者 紫筍茶 焙乾研末 各一兩

右水一盞下硫黃末半錢七茶一錢七煎六分去滓

溫服不拘時日三

大理中丸

出危氏方

治大便虛滑不禁每一丸用平胃散一

貼煎化服便止加鹽梅煎尤妙

人參 白朮 乾薑 甘草

各等分

右為末煉蜜丸如指頭大

脫肛論

夫肛門者主大行道肺大腸候也號為通事令史重十二兩長一尺三寸廣二寸三分應十二時若臟腸熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若臟腑寒則肛門開大行洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之

虛實和平依經調理之○四十八難曰病之虛實出者
為虛入者為實肛門之脫虛也蓋實則溫溫則內氣充
而有所蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收而況大腸之
厚薄膏脂之肥瘠亦視夫內氣之虛耳大凡肛脫須
以溫湯洗令和軟然後摩挲而入治法以治斂行之其
有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪所
襲亦有此證凡腸頭作癢即是中有蟲生取苦楝根煎
湯薰洗仍以乾艾生薑煎服其脫肛腸風痔瘻者登溷

不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染
汚其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登溷
後須用一洗○下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣偃之至
圓不能便極力於下肛門脫出故謂之脫肛溫其臟則
愈古方有坐湯溫熨之藥皆良法也脫肛一證氣聚不
散也裏急而不得出外脹而不得入先以枳殼散作劑
又以枳殼燒灰存性細末摻傅或津唾調傅氣散則腫
消矣仍用生薑汁調五苓散如膏入新水研散略煎吞

黃連阿膠丸此論肛門挾熱而腫脹也其或腸中虛薄不收則理中湯釣腸丸養臟湯輩主之烏鰂骨木賊草傳之

方

猪膽散

出千金方

治大腸寒應肛門寒則洞洩肛門滯出

猪膽

一斤熬令燥

黃連

阿膠

芎藭

各二兩

烏梅肉

五兩

艾葉

一兩

右為末每服二錢溫酒調下白米飲亦可食前日再

服

金鳳膏 治痔瘡破者脫肛

鮮魚肝一個 龍腦一錢 麝香半錢 飛礬石半錢 黃連末炒加些少

右為末用鮮魚膽調塗五六次立効

鯮甲丸出聖惠方 治脫肛皆因久痢大腸虛冷所致肛門

為大腸之候大腸傷於寒下痢用力其氣不逆則肛

門脫出雖一年下痢脫肛門不收腹中冷可安

鯮甲醋炙一方用鯮頭 蝟皮炙 桂心各一兩 磁石二兩煨醋淬

右為細末蜜丸菜豆大米飲下五丸量大小加減服

一方為散食前粥飲服

治脫肛

神効方

蔓陀羅花子

蓮殼

一對

橡碗

十六個

右搗碎水煎三五沸入朴硝熟洗其肛自上

香膽丸

方見痔瘻門諸痔類

治痔漏脫肛

荊芥散

出直指方

治脫肛

大香附

荊芥穗

各半兩

縮砂

二錢半

右為末每服三錢食前新水煎數沸即服小兒通用

一方無縮砂洗

縮砂湯

出指直方

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

各等分

右為末每服二錢米飲調下

治大腸虛冷大便後脫肛洞出

出聖惠方

鯮頭

一枚塗酥炙令焦

鐵精

一兩研

葇蓉子

一兩水淘去浮者水浸毛出候

乾炒

右為末每服二錢食前粥飲下肛上更炙故麻鞋底

熨之

治大便風冷脫肛兼腰痛不可忍
出十便良方一名三神丹

石灰 白礬 黃丹
各一兩

右研以油和為餅子新瓦上燒令通赤放冷細研又和又燒如此三度為末入麝香末一分更研勻每服一錢食前粥飲艾葉調下

治脫肛不差
出聖惠方

鰲頭 蒲黃 白薇
一枚 煉反 半兩 一兩