

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四十六



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈履勘

欽定四庫全書

普濟方卷四十六

明周王朱橚撰

頭門

首風論

內經謂新沐中風則為首風者風之狀頭面多汗惡風
當先風一日則病甚甚則頭不可以出內至其風日則
病少愈夫諸陽之脈皆會於頭平居安靜則邪無自而

入新沐之人皮膚既疏皮膚髮濡漬不慎于風風邪得以

乘之故客于首而為首風其證頭而多汗惡風頭痛不可以出內者以邪氣之客也當先風一日則病甚至其風日則少愈者陽之氣以天地之疾風召之風行陽化頭者諸陽之會與之相應也是太陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多蓋頭居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若鼻風邪乘氣皆得而入之矣況復擲沐取涼飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目口鼻眉稜之間

或有一處不若吾之體焉皆其漸也有頭疼有頭暈有
頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或
頭汗或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭
極臭或只呵欠而作暈眩之狀凡此皆頭風證也治法
大要有熱證者消風散用防風荆芥煎湯下無熱證者
追風散用薄荷清下又有素患頭風之人或因傷風寒
暑濕之證調理之已獲輕安未幾頭風發則不必拘泥
前藥無附子又不可也若夫太陽項強一證無汗惡風

則為表實合用葛根湯汗出惡風則為表虛合用桂枝
葛根湯是又感風邪在頭風界限之內者也婦人月候
適行輒梳篦多成頭風痒滿頭如水泡之狀。大凡人
病雷頭癩乾俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得
之即為首風此因邪風在於胸中熱甚化而為痰之所
致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服
烏荊丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面血無汗
經云火鬱發之開之却之可用銚鍼出血則愈靈樞經

云奪血者無血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用涼膈
解毒消風散熱為治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛
氣血宣通使無壅滯而愈○凡頭風眩暈手足麻痺胃
脘發痛心腹滿悶按如水聲可用獨聖散吐之吐訖可
用清上辛涼之藥仲景曰此寒疾結在胸中而致然也
○夫頭風者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之
也多在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分
隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見于頭多在前後

先出治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病是自外而之內者是血病況頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分無不至若用重劑速下過其病難已雖無緩藥若急服之或食前或頓後服此宜先緩急則藥不能除病當徐徐浸漬無形之邪也或藥性味形體據象皆要不離緩體是也且後急者謂緩劑已瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速則

損陰也此終始却為客邪當急取之是治客以急也且
治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急治之不能解
紛而益亂也治客以急者謂陰分受邪陰分受陽邪此
客氣急除去之也假令少陽陽明為病少陽為邪出於
耳前後也陽明為邪者首大腫也先以黃芩黃連甘草
湯通炒過剉煎少少不住服或劑畢再用煨黍粘子新
瓦上炒香同大黃煎或去滓內芒硝俱各等分亦時時
呷之無合飲食在前得微利及邪氣已只前藥若不能

已再同煎次第服之取大便利邪氣則止如陽明渴者加瓜蒌根陽明行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活防風之類

方

仙方如聖餅子

出海上方

草烏 天麻 何首烏 天花粉 芍藥 半夏

細辛 薄荷 荊芥 香白芷 防風 羌活

蒼朮 松香 甘松 藿香 晚蠶沙 赤小

豆 菊花 赤芍藥 甘菊花 蔓荊子

各等分

右為細末炒麴為餅赤土為衣每服一餅細嚼茶清

送下

巴戟散

出千金方

治頭中五十種病

方見本門頭風類

牛黃丸

出聖濟總錄

治首風頭項急疼腦重四肢拘急行

步有妨

牛黃

別研膩粉

各半兩

天麻

酒炙桂皮去粗

白附子

炮乾蝎

炒去土

天南星

炮

石菖蒲

附子

炮裂去皮臍

麻黃

去根節湯

煑掠去沫

羌活

去蘆

芎藭

當歸

切焙

乾薑

炮

獨活

去蘆

防風

去又各一兩麝香分烏蛇酒浸濕紙裹煨取肉三兩

右先將牛黃麝香同研後漸入諸末藥并膩粉一半煉蜜和丸如梧桐子大於膩粉內裹為衣每服五丸空心溫酒下

追風散指出直指方治偏正頭風疼痛面上遊風狀若蟲行

川烏炮去皮尖軟石膏煨白殭蠶 川芎 防風 荆

芥 甘草炙各一兩南星炮白附子炮羌活 天麻

全蝎 地龍去土白芷各半兩草烏炮去皮尖沒藥 乳香

雄黃

并研各一分

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服
搐鼻藥治八般頭風疼痛鼻塞聲重

赤芍藥 川芎

草烏

黃芩

乳香

沒藥

半錢

黃連

錢一

元胡索

當歸

藥蘆

各半錢

荊芥

錢一

藁本

半錢石膏

細辛

薄荷

甘草

炙各一錢

右為細末口噙水用藥一匙嚙鼻中

救生丸

出聖濟總錄

治體虛陽經為風所乘上走頭面多

汗惡風頭痛及新沐中風失音不語

天麻

附子

去皮臍炮裂

烏頭

炮裂去皮臍

白附子

炮

天南

星

炮

丹砂

研

半夏

湯浸七次生薑汁製作餅焙乾

犀角

鎊屑以紙裹置懷中

暖方

芍藥

藿香葉

零陵香葉

桂

去粗皮

蠟

稍

炒

木香

白

僵蠶

炒

牛黃

研各半兩

右為末煉蜜和劑丸如梧桐子大中風不語者每服

五丸用漿水半鍾取東南柳枝一條長七寸滴生油

三滴在漿水中即攪四十九攪便灌之立差如小可

中風只用漿水吞下三九如豆大

天雄丸

出聖濟總錄

治風虛頭腦重四肢拘急骨節痛疼

天雄

炮裂去皮臍

黃耆剉熟乾地黄

焙

茯苓

炒去角

白

茯苓

去黑皮

牛膝

酒浸切焙

石斛

去根

附子

焙裂去皮臍

獨活

去蘆

山芋

白朮

桂

去粗皮各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸薄荷酒

或烏梅湯下

茯神方

出聖濟總錄

治首風頭痛當先風則甚

茯神

去木

羌活

去蘆

木通

剉

防風

去叉

細辛

去葉

蔓荊實

去白皮

生乾地黄

焙

白朮

當歸

芍藥

陳橘皮

湯浸去

麴焙

芎藭

各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食

前溫服

必效丸

出王氏博濟方

治頭風眩暈者由氣血虛為風邪所

乘也諸陽經脈上走於頭面因運動勞役陽氣發洩

腠理開疎因而受風邪頭風之狀面多汗惡風甚則

頭疼心煩悶或因新沐髮中風亦為此病久不差眩
暈因風邪流入於腦傳於目系目系急故成眩暈也
其脈寸口洪大而長是也宜服此大效

巴豆去皮出油一分丹砂研乳香研細辛去苗葉當歸切焙

榔各半兩丁香桂去粗皮龍腦研各一錢

右搗研為末蒸餅為丸如梧桐子大每發日用好茶
清下一丸須是當門齒嚼冷茶下之十年只用一粒
額汗出即差一方有麝香