

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三目錄

續命湯

三生飲

稀涎千緡湯

秦艽升麻湯

防風黃耆湯

玉屏風散

黃耆五物湯

羌活愈風湯

清熱化痰湯

防風通聖散

九味羌活湯

活人敗毒散

柴葛解肌湯

升麻葛根湯

參蘇飲

藿香正氣散

神朮湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

栝蒌桂枝湯

水解散

二聖救苦丹

天水散

香薷飲

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三

續命湯

治中風痲、身體不能自收、口不能言、冒昧不知痛處、或拘急不得轉側、

麻黃

桂枝

石膏

乾薑

杏仁

四十枚

川芎

當歸

人參

甘草

各三兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出自愈不汗更服無所禁勿當風并治衄伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

集註

趙良曰、痲病者營衛氣血不養於內外故身體不用機關不利精神不治然是證有虛有實虛者自飲食房勞七情感之如內經所謂內奪而厥則爲瘖痲之類是也實者自風寒

暑濕感之、虛者不可以實治、治之則愈散其
氣血、今此方明言中風痲、是屬營衛之實邪
也、故用續命、續命乃麻黃湯之變者、加乾薑
以開血、受寒邪石膏以解肌、受風邪當歸和
血、人參益氣、川芎行血散風也、其并治欬逆
上氣面浮者、亦以爲風寒所致也、

上原通氣清血以通其氣

血入冬益於川苔口血甜風者其後氣

以開血受寒寒在骨以經脈受風寒者

也此用藥命熱命熱血黃甚之變者

原血今此大用清血以通其氣

暑熱之血者不以實命命之

三生飲

治卒中昏不知人、口眼歪斜、半身不遂、并痰厥

氣厥

南星

一兩生用

立飲不川烏

五錢去皮生用

附子

五錢去皮生用

人參木香

二錢

右每服五錢、薑水煎、加人參二兩、無

集註

柯琴曰、風爲陽邪、風中無寒、不甚傷人、惟風

中挾寒、害始劇矣、寒輕而在表者、宜發汗以
逐邪、寒重而入裏者、非溫中補虛、終不可救、

此取三物之大辛大熱者、且不炮不製、更佐以木香、乘其至剛至銳之氣而用之、非專以治風、兼以治寒也、然邪之所湊、其氣必虛、但知勇於攻邪、若正氣虛而不支、能無倒戈之患乎、必用人參兩許、以駕馭其邪、此薛已真知確見、立於不敗之地、而收萬全之效者也、若在庸手、必謂補住邪氣、而不敢用、此謹熟陰陽、毋與衆謀、岐伯所以叮嚀致告耳、觀其每服五錢、必四服而邪始出、今之畏事者、用

烏附分數必製熟而後敢用更以芩連監制之烏能挽回如是之危證哉古今人不相及信然本方去烏附卽星香散治痰厥氣厥足矣

突

計

志

高

稀涎千緡湯

治風痰不下、喉中聲如牽鋸、或中濕腫滿、

半夏

十四枚
大者

猪牙皂角

一挺
炙

甘草

一錢

白礬

二錢

右四味爲末、用生薑自然汁少許、沖溫水一
盞、調末一錢、灌之、得吐痰涎卽醒、

集註

柯琴曰、攻邪有汗吐下三法、仲景於吐劑立

梔子豉瓜蒂二方、所以導熱邪之上出、逐寒
邪而外散也、其有不因外感、因醇酒厚味漸

積凝結變爲頑痰。一旦乘虛上塞咽喉。氣不得通。忽然昏仆。目反直視。喉中聲如牽鋸。此爲痰厥。先輩所云怪證多屬於痰者。此也。非用峻藥以攻之。頑痰不能遽退。故用生薑半夏之辛以散之。甘草之甘以涌之。白礬之澀以斂之。牙皂之勇以開之。此斬關奪門之勢。惟稟氣素實而暫虛者可用。壅塞稍疏。續進他藥。不可多用以傷元氣。如平素虛弱者。又當攻補兼施。六君子湯中加牙皂白礬末以

吐之則庶幾矣若誤作中風治之去生便遠

此之謂也。然其時并中風命之。其主則

秦艽升麻湯

治風寒客胃、口眼喎斜、惡見風寒、四肢拘急、脈浮而緊、

升麻

葛根

秦艽

白芷

防風

桂枝

甘草

人參

芍藥

葱白

右十味、水煎服、