

痘疹傳心錄卷之十八

附慈幼心傳

瘦樵程永培校

脾胃

夫人以脾胃爲主胃屬陽主氣脾屬陰主血胃司受納脾司運化胃爲水穀之海飲食入胃脾乃化生精氣津液上升糟粕下降斯無悞矣至於小兒尤賴胃氣而生若乳食失節則脾胃受傷胃傷則不能納脾傷則不能化脾胃俱傷納化皆難而臟腑俱失所養則病生矣故諸病先觀胃氣人身氣血臟腑百骸皆由胃氣而生也又云有胃氣則生無胃氣則死故東

垣發脾胃之論使人常以調理脾胃爲主若面色眊
白目無精光口氣冷少食肌瘦此胃氣虛寒也用小
異攻散六君子湯若便溏者兼脾虛也加炮薑藿香
溫之中滿者脾不運也加水香開之若喜冷便秘面
赤煩渴此胃氣實熱也用瀉黃散清之若命門火衰
不能生土者用八味丸補之若稟賦胃氣不足用補
中益氣湯八味丸益之若乳母乳汁清稀致兒肌瘦
骨立大便溏瀉當易乳母得乳汁濃厚者爲佳宜用
小異攻加升麻麥芽主之否則胃氣有傷藥雖對症
亦不能運化藥力以成功是以東垣以脾胃爲主也

凡治小兒之病當先審其胃氣至於脾胃泄瀉劉河
間則爲瀉屬濕惟用苦溫苦寒之藥苦寒瀉濕熱苦
溫除濕寒泄止後脾胃虛弱方用參朮等甘溫之藥
補之若初泄而便用參朮等藥則甘溫能生濕熱而
反助病邪世人不識往往多用此以爲補悞人多矣
一兒十三歲嗜食食後飽脹難化此胃火旺脾陰虛
也用人參白朮枳實芍藥石膏甘草黃連香附木
香而愈

一兒泄瀉咸用六君子加澤瀉肉果不効余謂甘溫
能生濕熱故不愈用甘草芍藥黃連茯苓陳皮柴

胡甘寒之藥而瀉止但口渴面色青白此脾胃不足用小異攻散加升麻柴胡而愈

不寐多因

小兒不寐皆由胃氣不和血氣不從故不寐之症生矣治用六君子加遠志酸棗仁又歸脾湯肝腎虛熱者用六味丸心血不足振悸不得眠者真珠母丸精神短乏者人參安神丸膽虛者人參竹葉湯肝火不寧者加味小柴胡湯病後飢熱者當辨虛實治之有因他症不寐各當詳之又多睡者皆由脾氣虛弱健運之令不行而嗜卧也治當溫補其脾脾氣旺則

臟腑清陽之氣升舉易於運行何困倦之有治用四
君子加木香半夏白朮倍之若脾倦多驚者乃心血
虛而火動也治宜安神養血爲主若心脾氣虛有痰
者用人參麥冬五味茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗
仁以養心血橘紅半夏以開痰若脾肺氣虛有痰者
用補中益氣湯又膽星天竺丸若飲食停滯而然者
四君子湯加山查麥芽神麴若脾虛好睡用歸芍六
君子湯若乳母飲酒致兒昏睡者用乾葛陳皮解之
不應用四君子加葛子母並服

人參竹葉湯

人參

竹葉

甘草

半夏

小麥

麥冬

粳米

生薑

水煎服

加味小柴胡湯

即小柴胡湯加山梔丹皮

膽星天竺丸

膽星

一兩

半夏

白附

各五錢

天竺黃

三錢

天麻

防風

各二錢

辰砂

一錢

右為末甘草膏丸芡實大每一丸薄荷湯化下

人參安神丸

人參 一錢
當歸 三錢
麥冬 三錢
黃連 二錢

生地 三錢
硃砂 二錢
茯神 二錢
棗仁 二錢

右爲末猪心血丸如芡實大硃砂爲衣燈心湯化下

腫脹

小兒腫脹未不由飲食內傷脾胃虧損而致者其症有二曰氣腫曰水腫氣腫者由脾胃虛弱脾主肌肉肺主皮膚土弱不能生金致虛氣上攻於肺行於面目遍身浮腫也治法調脾行氣爲主五子五皮飲水腫者因上焦煩渴引飲而脾虛不能約制其水水

反侮土土隨水行上衝於肺流走於脾膚而光腫也
治法實脾利水爲主胃苓湯至於喘脹兩條須分先
後節齋曰先喘而後脹主於肺先脹而後喘主於脾
蓋小便之行由肺氣降下而輸化也若肺受邪而喘
則失降下之令故小便短澀以致水溢皮膚而腫滿
矣此喘爲本而脹爲標也治宜清金降氣而行水兼
之脾土惡濕土能尅水若脾土受傷不能制水水既
上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此脹爲本而
喘爲標也治宜實脾行水而清金兼之苟肺病而用
燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥

則脾得寒而脹益甚近世治喘脹但知實脾行水而不知分別脾肺二經悞矣又有脾胃虛弱濕熱積而爲腫者用瀉黃散胃苓湯又有瀉後痢後瘧後痘後諸病後脾虛發腫者宜調補脾胃爲主六君子湯補中益氣湯又有脾腎虛寒不能司攝而水泛行如蠱脹者用加減腎氣丸補命門火以生脾土間服六君子湯又有遍身膿瘡發腫治宜先去濕熱次用敗毒散以解表邪○或問曰小兒水腫俗云河鯽用草藥煎洗又用雞子清口含吸臍并手足指頭前後心而愈者何也曰此內症已平但表受水溢浴洗則肌暢

肌暢則微汗邪可散而愈也若內症不平浴洗雖愈未幾必復腫矣

一兒遍身光腫余審其能食便調身熱脉浮謂曰內症平和此水氣在表宜解散之用敗毒散去人參加紫蘇陳皮令汗出自漸消而愈總之斯症當辨經絡虛實標本先後而治不可拘泥

一兒瘡後遍身浮腫咸謂脾虛用六君子湯加黃連芍藥木通腹皮鱉甲澤瀉木香煨薑不効發熱煩渴或謂土燥而又進以燥劑面目浮腫愈甚宜苦寒之劑潤之用芍藥花粉知母黃連柴胡生地茯苓

芩木通漸愈

草藥方 浴洗水腫

河籊草 車前子 野紅花根 芭蕉葉

枇杷葉 枸橘葉 各一把 煎湯浴洗

稠柳餅 治水腫

稠柳子 梗葉似梅七八月採子曬乾

右爲末每用之兩大米粉和作餅蒸熟食之溺和
腫消愈

腹痛

小兒腹痛有飲食停滯而脹痛有積滯作痛有蟲痛

有火痛有寒痛有虛痛有腸胃中生癰毒而痛有盤腸內弔痛不可不辨。○飲食停滯而痛者皆由飲食不節或過餐堅硬之物脾弱不易尅化而腹脹痛也其候按之堅痛身熱惡食治宜消化之劑香砂丸消導二陳湯甚則以遇仙丹烏犀丸下之。○積痛者皆由飲食自倍脾虛不運停滯中脘久而成積腹痛欲便便下酸臭便後痛減或閉澀其症面色痿黃身熱不思乳食足冷嗜臥治宜遇仙丹下之下後以小異攻散和之若成癖痞治見癖條。○蟲痛者有虵虫長尺許或五六寸居胃脘之間動則吐清涎撲身啼哭

面黃唇白時痛時止治宜安重飲烏梅丸又寸白虫
居腸胃之間動則傷人精氣又有一虫形若細絲或
飲食中誤吞油髮所變亦居胃中動則腹中刺痛不
可忍皆由恣食肥甘煎燂濕熱鬱遏所致並用史君
子丸又有血蠶動則刺心而痛面黃肌瘦能食皆由
過食堅硬之物不化爲血裹成形漸大而活久則殺
人治宜追虫取積散下之○火痛者口中氣溫面赤
壯熱飲冷治用瀉黃散利之○寒痛者口氣冷不思
飲食嘔逆泄瀉此寒水侮土也治用六君子加炮薑
肉桂甚則加附子○虛痛者消導後其腹尙痛按之

不痛是也治用小異攻散補之若痛連兩脇乃肝木乘脾也用四君子加柴胡芍藥主之○腸胃中生瘡毒而痛者皆由脾虛積熱氣血凝滯所致方論見外科條○盤腸內弔痛論見前本條

一女子十五歲胃脘痛甚則號哭嘔吐清涎或半月或月餘而發患此數年醫藥不効余用張義古文錢三〇三分同好核桃肉半個油核桃肉半個同研爛好酒調下其痛反甚痛漸行下至小腹便行一二次卽愈此芝田先生傳也若氣鬱食滯而發者用傳心錄內治心氣痛藥一服利下卽愈此僧徹

空傳也

一兒歲餘號哭不已醫藥不効余謂色脈俱好審其
仰身則哭甚合身稍止活効曰若嬰兒色脈俱好
而病者必有他故細揣背上微紅腫以手按之大
哭用針撥開摘出乃竹刺也痛定卽安

追蠱取積散 治虫積

牽牛

二兩

雷丸

一兩

木香

五錢

蕪荑

五錢

蓬朮

五錢

錫灰

五錢

大黃

二兩

史君子

五錢

檳榔

一兩

乾漆

五錢

右爲末每用一錢好酒調下或麪糊丸麻子大天

明猪肉湯送下大小加減

烏梅丸 治虵虫動痛

烏梅

三十細辛

桂枝

黃柏

乾薑

黃連

各一錢

當歸

蜀椒

右爲末酒浸烏梅一宿去核蒸之用米飯搗和丸
桐子大每用二十九空心白滾湯送下

諸熱

經曰陽勝則外熱陽虛則外寒陰勝則內寒陰虛則
內熱陰陽相勝則寒熱往來又曰陽不足則先寒後
熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭