

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百十一



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

卷之四十五

經治準繩

外科

下部

經治準繩

明 王肯堂 撰

下兩醫尖下大道前
道穀

患此癰近穀道左右亦

經治準繩

經治準繩

一

名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥即用發穴散破後用
抽膿膏膿盡用合瘡口散合之慎勿過冬即成冷漏難
治 夫便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒
熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者
精與智也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚
經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出
之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合
陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初

起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣
孫按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此固一說而意猶未完果如此論當僧尼孀婦宮人曠夫多有此患然予目擊商賈中野合不潔淫妓便構此疾或疳瘡或楊梅者亦由慾火淫熾一旦交合不潔為淫火沖動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之

非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠
所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦
又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之
不旬日便可奏功若曾已發汗利小便體厚邪固而不
得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通
隨以補劑托之亦不失先後者也 薛便癰屬厥陰肝
經內熱外寒或勞倦過度或房慾不節或慾心不遂或
強固其精或肝經濕熱而致治法內熱外寒者雙解散

勞倦過度者補中益氣湯房慾不節者六味丸料慾心
不遂者先用五苓散加大黃疎其精滯後用地黃丸以
補其肝腎強固其精或濕熱壅滯者宜用龍膽瀉肝湯
疎肝導滯夫便癰血疝也屬厥陰肝經之絡脈衝任督
脈之隧道故婦人患此多在兩脇腫痛或腹中結塊小
便澀滯苟治者得法患者又能調攝何難斂之有若槩
用大黃等劑以求其內消或令膿從便下損其氣血及
不慎起居飲食者皆為不治

表一人腫痛發熱以荆防敗毒散二劑而止以雙解散

二劑而消

荆防敗毒散治便癰發寒熱或拘急疼痛

方見腫瘍

裏一人炊腫作痛大小便秘脈有力以玉燭散二劑頻

退更以龍膽瀉肝湯四劑而消

子和玉燭散

即四物湯調胃承氣湯各半服之

世又方

劉寄奴 王不留行 大黃 金銀花 木鼈子

右等分酒水煎露一宿五更服

丹治便毒初起

射干二寸生薑如大指

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠醋

煮塗患處射干紫花者是紅花者非

治已結成膿者

大黃半兩枳實各三錢厚朴各三錢甘草節一錢連翹半兩桃仁

泥二十一枚

右分三服薑三片水煎服

又治便毒

青皮 白芷 柴胡 赤芍藥 檳榔 朴硝

烏藥 木瓜 大黃 連翹 瓜蒌 生地黃

甘草節 黃芩 三稜 蓬朮 犀角 皂角刺

右為呔咀以水三碗煎至一碗候大饑服以瀉為度

三物湯 治便癰

牡蠣 大黃 山梔子

各等分

右為末以酒水一大盞煎至七分露一宿空心溫服

四神散 治便毒初起寒熱欲成癰疽服此神効

大黃 木鼈子 殭蠶 貝母

各二錢半

用酒水各一鍾煎至一鍾食前熱服若得汗下為妙

雙解散 治便毒內蘊氣外挾寒邪精血交滯腫結疼

痛

川大黃 三錢 澤瀉 牽牛 白芍藥 桃仁 去皮尖各二錢

辣桂 甘草 各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

補骨脂散

破故紙

炒研

牛蒡子

微炒

牽牛

炒

大黃

酒拌炒

各等分

右為末每服一兩酒調下

消毒五聖湯

治便毒腫疼神効

五靈脂

白殭蠶

鬱金

貝母

大黃

各二錢

右酒水各半煎服連服三貼立愈

消毒飲

治便毒初發三四日可消

皂角針 金銀花 防風 當歸 大黃 甘草

節 瓜 萋 實 各等分

右咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立効

又方 木鼈子 大黃 瓜 萋 桃仁 草龍膽 咬咀濃煎露一宿清晨溫服立愈

止痛妙絕飲 治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此方一服立能止痛

人參

大黃

錢各五

右用酒水各一鍾煎至一鍾入乳香沒藥各一錢空

心食前服

牡蠣散 治血疰即便毒

當歸

酒拌

甘草節

滑石

煨

牡蠣

煨各一錢半

大黃

錢三木

鼈子

五枚

作一劑用水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火

溫服已未潰膿血從大便出

薛按此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大小便秘
發熱熾痛或交感強固精氣致精血交錯腫結疼痛
便秘者宜用若勞倦之人不甚熾痛大小便如常或
小便赤色發熱不作膿及潰而不斂宜用十全大補
湯蓋此證多起於勞役不足或房勞過度精氣俱虛
之人俗云一石米瘡此言百日後可愈也若大補氣
血不旬日而愈何用百日蓋瘡之收斂在乎血氣之
盛也嘗治舉人凌待之虛而服尅伐藥幾致危殆予

用托裏健脾藥而消秀才王文遠勞苦患之服小柴胡湯而表證散後用托裏藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脈弱以大補之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉痢不止竟致不救可見此證屬不足多矣非補不可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當赤軟膿成故也若尚堅硬乃元氣不能腐化往往人見堅硬只欲內消反復攻散藥多致虛虛之禍前所治者即其驗也

又方

山梔 大黃 乳香 沒藥 當歸 瓜蒌仁

各半錢

二錢 代赭石 一錢

右作一服水煎

表裏一人不慎房勞患此腫痛以雙解散二服其病即止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味麥門柴胡三十餘劑大抵便癰者血疝也俗呼為便毒言於不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及衝任督脈