



逆證

痘未出而聲啞喉者不治。已出五日內見者亦不治。  
痘起脹貫漿時抓破無血。或清水。或乾燥者。不治。  
未出已出而神昏氣促。躁亂不寧者。不治。

漿水米粒不入口。或飲食噎喉者。不治。

眼內黑珠起浮油混睛者。不治。

肌肉黎黑如被杖者。不治。

眼色神光不明。珠色轉綠轉赤者。不治。

痰涎壅盛。氣急者。不治。

吐泄不止藥食俱不停不化直下肛門如竹筒者不治  
閉目昏睡舌卷囊縮者不治

胃熱發黃身如橘色下利者不治

頭溫足冷悶亂飲水者不治

痘初出卽青晦焦黑者不治

蜜如蚕種全不起發平片花搭者不治

痒瘍寒熱不止不治

舊有瘡瘍走漏氣血敷藥不效者不治

痘後傷風傷食肌肉瘦脫者不治

天柱不舉者不治

坐立不能者不治

兩目失神者不治

面赤如腫者不治

一齊湧出者不治

發藍黑斑者不治

不分顆粒者不治

倒出者不治

動靜恍惚者不治

出而復沒者不治

見點犯凶部者不治

已放白而無紅暈者不治

熱不一日卽見點者不治

堅硬如砂無紅暈者不治

發漿不過環跳者不治

肉腫痘不腫者不治

如蚕種稠密或更頂陷毒盛而脾不勝載者不治

中空外散如蚊蚋咬者不治

頭粒正赤四圍如淡硃點在紙上者不治

口角邊有兩道青氣繞唇者死不治

放點面上有三四粒如錢大者不治

人中一粒比衆痘獨大者不治

惡寒身冷汗出耳尻反熱者不治

按上不治二字須活看本意謂症不可治聶久吾云  
惟其症逆正需醫治謂黃西邱意在圖利又恐壞名  
故出此不仁之言貽害於世斯言過矣愚謂治之亦  
間有得生者主家信任果專醫家不必固執寧救之  
而不活不可棄而不救也病家  
亦不可冒昧而只知罪醫也

發熱逆症

發熱先發驚搐或日發三五次或連日不止痘出多而密者凶兆也若一二次而隨止者痘出心經也吉

發熱時熱甚汗多忽出忽止或不止者凶汗少隨止者吉

發熱時用紙條點照之如周身有成塊紅者八九日後必死

發熱一日卽徧身齊出或稠密如蚕種或摸之不碍手者必死

發熱時腸中大痛腰如被杖至報點而痛猶不止者必死

發熱時頭面上有一片紅如胭脂者八九日後決死

發熱時口鼻及大小便俱失血者必死

發熱時妄見妄語昏不知人者死

發熱時腹脹而痛大叫不止者死

發熱三日內熱忽退反煩躁悶亂坐卧不寧此外雖涼

而內却熱也若手足冷腹脹氣喘者即死

見點逆症

痘點上身少。下身多者吉。反是者必險。

痘出之初三五相連者必密。單見者必稀。

發熱一日便見者凶。或一齊湧出如蚕種密布者決死。痘點先見於太陽額角髮際天庭或山根以上等處此陽毒上侵陽位大非吉兆。

痘初出紫色紅片者名紫雲痘四日死。

痘初出當頂紅者六七日死。

痘出皮薄而光根窠全無紅色或根帶一點紅三五日後如綠豆樣此痘決不成膿只成一胞清水擦破卽死。

痘出一遍。又出一遍。心腹痛不止。口氣臭。色紫黑者。決死。

痘色紅而艷。皮肉盡紅者。必不成膿。痒癩而死。

痘不起頂。如湯泡。及燈艸火燒者。十日後必痒癩而死。

見點時有黑斑如痣。或肌肉有成塊黑者。卽死。

見點時口鼻及耳有紫色者。或血出不止者。決死。

報痘之時。應出不出。或起紅斑如蚊跡者。六日後死。

報痘時腰腹痛。或狂言煩躁。大渴吐泄。不食者。俱不治。

痘已出齊。而身熱不退。反甚者。死。

痘齊之後毒已外達內當安靜反見煩躁悶亂譫妄不止者此邪毒熱盛神機無主也必死。

### 起脹逆症

痘形雖起而色見灰白腫如湯餅者其人能食便調無他痘者猶或可治若不能食或吐利或搔痒者死。

痘出至五六日不甚起發色又不紅活者九死一生也。  
起脹三日已足痘色滿頂紅紫者凶面目腫甚者亦凶。  
起脹時痘頂有眼如針孔紫黑色者死。  
起脹時隨起而隨沒并發喘者卽死。

起脹時紫色刺出黑血如屋漏水者死

起脹時痘頂便帶白漿者不分何部並非佳兆

### 貫膿逆症

貫膿時紅紫黑色外剝聲啞者不治

貫時純是清水皮薄而白如水泡者三四日必抓破而死

膿不能貫而乾枯黑陷或全無血水者卽死  
頭面腫大搔破臭不可近者并足冷者決死  
吐利便血乳食不化痘爛無膿者決死

貫時二便不通。腹脹肉黑發斑。謔語氣喘。寒戰咬牙者。死。回漿時漸當蒼黑。收斂而反光嫩。不斂。此氣血兩虛。必發痒搔破而死。

漿未成忽然乾收。或青紫焦黑者死。

貫時忽然作痒。正面搔破皮脫肉乾者死。

諸痘有漿而天庭不起。或額上如沸湯澆。破臭連兩頰。水去而乾。似靨非靨者死。

### 結痂逆症

當靨時遍身臭爛。目無神氣者死。

癰疹集原 卷四  
二百  
遍身發痒搔破無膿皮捲如痘壳而乾者决死

曆時無膿氣急聲啞或手足顫掉寒戰咬牙腹脹痰响足冷過膝小便少大便頻者皆死

兩臉乾硬按之如石者死

收同時飲食不進口中常如食物動而不止者死

面部未回而脚先回者陰勝陽也危

遍身俱回內留數粒不結痂者死

同時遍身未見膿成而唇口上下痘先黃熟者毒攻於脾也决死

未結痂而口唇腐爛及口白到舌者危。  
收結時前後有紅紫泡者不治。

落痂後逆症

痂雖落而疤如雪白無血色者氣血盡脫也。若不急培元氣。過後必死。

痂落後每發驚而神無所依者心氣絕也危。

痂落後手足顫掉咬牙目閉腹脹足冷過膝者不治。  
痘本乾燥膿少痂雖結而疤白者或有餘熱不退者雖過一月亦死。

近症不講  
近順症  
不講

瘧疾集解

卷四

三十一

*[The main body of the page contains several columns of text, which are significantly obscured by large, dark, horizontal scribbles or ink blots. The visible text is mostly illegible.]*

費氏大黃論

客問曰伏火伏毒非清解之能事攻之固不能已然大黃之力斬關奪門爲蕩滌之將元臬毒火當之尙爾退聽於氣血則獨無所虧乎氣血若虧孰爲領載孰爲化解而始終其功也予曰不然有病則病受病受其藥則銷鎔在邪毒邪毒銷鎔則氣血不爲邪毒桎梏而融通灌漑於痘矣不第於氣血無損正以救護氣血之地也邪正相乘一負則一勝負旣在此則勝自在彼但當衡其輕重所重在補養正則邪自除所重宜攻驅邪則正

自復何虞氣血之受損乎

石膏論

石膏號爲白虎湯火泡燃桐油調搽痛卽如失寒可知也痘爲先天毒火火而濟之以毒其猛烈更如何也若痘係熱症內煎熬而外沸騰五內之地輕則恣其銷燬重則爲其焦枯非此大寒不足濟其烈火至用之中與不中數之或多或寡又視乎用葯者之學問耳藉令泥古方拘日期論劑數則誤矣

論猪尾血