

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣目錄

生育門

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草

和集醫方全錄
卷四
臨盆

交骨不開

開骨散

盤腸生

補中益氣湯

十全大補湯

草麻貼法

酥油潤法

難產

產後門

胞衣不下證治

奪命散

產門不閉證治

十全大補湯

血暈證治

清魂散

佛手散

醋漆薰法

惡露不下證治

失笑散

聖愈湯

惡露不絕證治

加味十全大補湯

佛手散

頭疼證治

芎歸湯

八珍湯

心胃痛證治

大巖蜜湯

玉燭散

腹痛證治

失笑散

香桂散

異功散

少腹痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

五苓散

脇痛證治

延胡索散

四君子湯

八珍湯

腰痛證治

佛手散

加味六味地黃湯

徧身疼痛證治

起痛散

加味四物湯

腹中塊痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

筋攣證治

加味四物湯

八珍湯

傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲

浮腫證治

枳朮湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯

生化湯

四物湯

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

參附湯

寒熱證治

柴胡四物湯

生化湯

更生散

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

參附湯

中風證治

十全大補湯

痙病證治

加味八珍湯

後集醫方全錄 卷四十一
瘈瘲抽搐證治

加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳腹內雖疼切莫慌舒身仰卧容
胎轉靜待生時不用忙

註

妊娠月足臨產腹內如覺動轉疼痛須要安
詳莫自慌亂舒體仰卧時時緩步使兒身轉
正靜以待之至其生育之時自然順生不用

忙也

產室

產室寒溫要適時嚴寒酷熱總非宜夏要清涼冬要煖病者醫人俱要知

註

產室之內四時俱要寒溫適中若太熱太寒

均不相宜夏月必須清涼勿令炎熱致產母

中暑暈迷倘有其事不妨少與凉水以解之

冬月必須溫煖勿令寒冷以致血凝難產當

多備火爐使產母腰背下身就火烘之此臨

產之家及醫人皆當知之者也

擇收生婆

臨產穩婆須預擇老成歷練又精明無故莫教使手法寬心寧耐待時生

註

臨產之家必用收生婆須預先擇老成歷練明白經事之人無故切勿令其先使手法如試水探漿等事但囑令寬心寧耐以待生時可也

驚生

人語喧譁產母驚心虛氣怯號驚生急須止靜休
嘈雜產母心安胎自寧

註

產房之內不可多人人多則語聲喧譁產母
之心必驚驚則心氣虛怯至產時多致困乏
號曰驚生有如此者須急急摒出只留服役
一二人使寂靜而無嘈雜之聲則母心始安
安則其胎亦寧靜矣

試胎弄胎

月數未足腹中痛痛定如常名試胎臨月腹痛腰