

511.00
478
14:2127

庫 本 樣

酸棗仁湯

黃連阿膠湯

麻黃加朮湯

梔子乾薑湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

芎胡去半夏加栝蒌湯

白頭翁加甘草阿膠湯

澤瀉湯

葛根黃連黃芩湯

麻黃醇酒湯

乾薑附子湯

豬膚湯

三物黃芩湯

桂枝二麻黃一湯

黃芪桂枝苦酒湯

頭風摩散


白頭翁湯

文蛤湯

雞屎白散

一物瓜蒂湯

豬膏髮煎



長沙證彙 諸方目次

長沙證彙 諸方目次

梔子蘘皮湯

梔子大黃豉湯

防己茯苓湯

黃芪建中湯

牡蠣澤瀉散

半夏散及湯

苦酒湯

黃土湯

桂枝茯苓丸

黃芪桂枝五物湯

蝕齒方

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃甘草湯

麻黃附子甘草湯

苓甘薑味辛夏仁湯

梔子甘草豉湯

甘草湯

柏葉湯

赤小豆當歸散

礬石丸

雄黃燄

蛇牀子散

狼牙湯

枳實梔子豉湯

礬石湯

薏苡附子敗醬散

排膿散

杏子湯

蜘蛛散

甘麥大棗湯

苦參湯

排膿湯

茵陳五苓散

諸方名目次畢

廣 告

紹興名醫何廉臣先生評勘通俗傷寒論
前曾售缺向隅者不
數現由代售處收回
數十部計卷上一卷
共價大洋九角無扣

長沙正經證彙

三三三醫書第二集第二十七種

南部 村尾茂喬維遷

越後 奧田邦憲祐菴

同校

播磨 田中榮信愿仲 編選

播磨 菅原成美專輔

播磨 河野敬明淳治

紹興 吉生裘慶元 刊行

嘔吐門(附唾涎沫噫噦)

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也同方胃反嘔吐者大半夏湯食穀欲嘔者吳茱萸湯食已卽吐者大黃甘草湯嘔而發熱者小茈胡湯傷寒五六日嘔而發熱者同方妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口卽吐乾

薑黃連黃芩人參湯太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯太陽中風汗自出淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯產後中風續得之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出者同方

右十二法嘔吐不得食或發熱證

嘔心下痞鞭者大半夏湯嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹下雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安甘草瀉心湯太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漿漿汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者十棗湯傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大芩胡湯太陽病過經十餘日反二三下之後四五日芩胡證仍在者先與小芩胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者大芩胡湯卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯乾嘔下利者黃芩人參湯乾

嘔而利者黃芩加半夏生薑湯

右九法嘔吐心下痞鞭下利證

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者四逆湯既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者同方吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者同方少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之同方少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆或乾嘔或咽痛通脈四逆湯少陰病下利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯

右七法嘔吐下利厥逆證

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐者附子粳米湯傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯諸黃腹痛而嘔者小茈胡湯

右三法腹痛嘔吐證

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯吐後渴欲得水而貪飲者文蛤散少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯嘔吐而病在膈上後思水者棗苓散先渴後嘔爲水停心下小半夏加茯苓湯中風發熱六七日不解而煩右表裏證渴欲飲水入則吐者名曰水逆五苓散

右六法嘔吐渴證

傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔小茈胡湯陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上胎者同方本（按本字玉函無）太陽病不解脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱同方產婦云云大便堅嘔不能食者同方傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利茈胡加芒硝湯嘔而胸滿者吳茱萸湯

右六法胸脇苦痛嘔證

少陰病腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利或嘔者真武湯溫瘧者身無寒但熱骨節疼煩時嘔者白虎加桂枝湯傷寒六七日熱熱微惡寒支節疼煩微嘔心下支結者茈胡加桂枝湯

右三法支節疼痛嘔證

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯傷寒云云得之便厥咽中乾煩躁吐逆者甘草乾薑湯

右二法吐逆證

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯婦人吐涎沫小青龍湯傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者同方乾嘔吐逆吐涎沫者半夏乾薑散欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠者皂莢丸欬逆倚息不得臥小青龍湯時復冒者苓桂五

味甘草湯反更欬胸滿者苓甘五味薑辛湯冒者必嘔嘔者復內半夏苓甘薑味辛夏湯假令瘦人臍下悸吐涎沫而癰眩此水也五苓散虻蟲之爲病令人吐涎沫心痛發作有時甘草粉蜜湯大病差後喜唾久不了了者理中丸

右九法乾嘔咳吐涎沫證

肺痿吐涎沫者桂枝去芍藥加皂莢湯肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴者生薑甘草湯肺痿吐涎沫而不咳者甘草乾薑湯欬而胸滿振寒咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者爲肺癰桔梗湯同證桔梗白散

右五法肺痿肺癰吐涎沫濁唾證

發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹若嘔者梔子生薑豉湯胸滿心下堅咽中怏怏如有炙肉吐之不出吞之不下者半夏厚朴湯心胸中有停痰宿水自吐出後心胸間虛氣滿不能食茯苓飲鱸食之在心胸間不化吐復不出速下除

之橘皮大黃朴硝湯病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈生薑半夏湯太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩者調胃承氣湯陽明病不吐不下心煩者同方

右七法病有心胸中欲嘔吐不出證

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾（按乾字下脫嘔字）噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯

右二法心下痞鞭噯證

乾嘔噦若手足厥者橘皮湯噦逆者橘皮竹茹湯黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘噦者小半夏湯大便不通噦數讖語者小承氣湯

右四法噦逆證

大便不通門（附艱難）

中惡心痛腹脹大便不通者走馬湯少陰病六七日腹脹不大便者急下之大承氣湯大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也同方陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者可攻裏大承氣湯發熱惡寒若腹大滿不通者小承氣湯

右四法大便不通腹脹滿證

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀但發熱識語者大承氣湯陽明病識語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎也同方二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳熱汗出大便難而識語者下之則愈同方產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱者不食食則識語同方傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏（按

裏字衍一證大便難身微熱者同方病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也同方得病二三日云云須小便利屎定鞭乃可攻之同方陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與之陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則讖語小承氣湯大便不通噦數讖語者同方太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者同方傷寒不大便六七日頭痛有熱者同方

右十二法不大便讖語有燥屎證

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴若其人大便鞭小便自利者桂枝附子去桂加朮湯陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可爲導太陽病云云小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲

水者五苓散大便則難其脾爲約麻仁丸痛而閉者厚朴三物湯

右五法不大便鞭難證

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者小茈胡湯產婦云云大便堅嘔不能食者同方

右二法不大便嘔證

陽明證其人喜忘者必有畜血屎雖鞭大便反易其色必黑抵當湯病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之不大便者有瘀血同方

右二法大便鞭有瘀血證

小便不利門（附難自利自調）

小便不利者茯苓戎鹽湯小便不利者蒲灰散小便不利者滑石白魚散服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂

加苓朮湯病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也大承氣湯少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利便膿血者桃花湯虛勞腰痛小腹拘急小便不利者八味丸

右七法小便不利或腹痛證

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者桂枝甘草附子湯妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩者葵子茯苓散少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者眞武湯

右四法小便不利有水氣證

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出大黃硝石湯裏水者一身面目黃腫其脈沈

小便不利故令病水越婢加朮湯黃汗之病兩脛自冷又從腰以上必汗出下無汗腰髀弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利桂枝加黃芪湯傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃同方太陽病身黃脈沈結少腹鞭小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯男子黃小便自利小建中湯黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除熱必噦噦者小半夏湯右八法小便不利或自利黃疸證

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或心下悸小便不利者小茺胡湯傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔茺胡桂薑湯傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡重不

可轉側者茈胡加龍骨牡蠣湯

右三法胸脇苦滿小便不利證

太陽病發汗後若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解渴而口燥煩小便不利者五苓散陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯小便不利者有水氣其人若渴者括婁瞿麥丸

右四法小便不利渴證

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難屈伸者桂枝加附子湯欬逆倚息不得臥云云手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痹其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者苓桂五味甘草湯妊娠小便難飲食如故者歸母苦參丸婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此爲水與血俱