

良改
嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

○皮膚分

○麻木病

麻非癢非痛肌肉之內如千萬小蟲亂行或遍身淫淫如蟲行甚至如蟲行有聲之狀按之不止搔之愈甚有如麻之亂

木不癢不痛自己肌肉如他人肌肉按之不知搔之不覺有如木之厚

麻木皆有久暫暫時雖因氣血不足未足為病用重劑反損真元惟經年累月無一日不麻必因氣虛甚風痰湊之痰本不能作麻為風所噬如波浪沸騰而起陰陽失運行之柄安得不麻傷寒論曰身如蟲行汗多亡陽也則知氣虛是本風痰是標先以生薑為嚮導枳殼開氣生薑逐痰防風羌活散風木通牙皂通經絡又殭蠶治如蟲行之聖藥在手臂用桑條在股足加牛膝待病減用補中益氣多加參耆若經年累月無一日不木乃死血凝滯于內外挾風寒陽氣虛敗不能運動用附子肉桂嚮導烏藥木香行氣當歸桃仁紅花阿膠活血木通牙皂穿甲通經絡待病減用八物補氣血無不驗者

○麻木備用諸方

渾身麻木目縮或昏或熱黃耆錢二 人參 白芍錢各三 炙甘草錢三 蔓荊分二 陳皮分五 六服効小

便澀加澤瀉分五 如大熱加酒柏分三 麻木則不可再加黃耆錢一 如麻木重甚加芍藥 木通各

錢 眼縮去芍藥

皮膚間有麻木是肺氣 黃耆錢二 白芍錢三 陳皮錢二 澤瀉錢一 炙甘草錢二

暑天手麻木是熱傷 黃耆分八 人參 生甘草分五 炙甘草分二 五味子個十二 升麻分二 紫胡分三

芍藥補氣 湯 人參益氣 湯

神效黃耆 湯

第二服

第三服

湯

清湯補氣

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

白芍三分 空心服少卧 摩麻木處午前又服 第二次 黃耆四錢 紅花五分 陳皮五分 澤瀉半錢

瀉二分 亦日二服 第三次 黃耆三錢 黃柏六分 陳皮半錢 澤瀉半錢 升麻各一錢 白芍半錢

生甘草二錢 生苓四錢 炙甘草半錢 五味子五十個 水煎稍熱服 晚前服法

體倦麻木食汗善飢舌強聲啞身重 蒼木錢 藥本五錢 升麻半錢 柴胡八分 五味四錢 黃柏八分

知母五分 陳皮六分 甘草五分 當歸五分 黃耆一錢 升麻半錢 當歸一錢 柴胡一錢 澤瀉各五分 紅花一錢

左腿麻木沉重 黃耆二錢 甘草半錢 五味子三十個 升麻一錢 當歸一錢 柴胡一錢 澤瀉各五分 紅花一錢

四肢腫肌肉麻 續斷 當歸 萸解 附子 防風 天麻各五錢 乳香 沒藥各二錢 川芎三錢七分

蜜九酒下

痺病甚者 黃耆 獨活 防風 細辛 牛膝 川芎 炮附 炙草 川椒炒出汁 川烏炮 山

萸 秦艽 乾葛各七錢 官桂 當歸各八錢 大黃四分 白木 炮薑各五錢 浸酒日夜服三次

虛加肉從蓉 下利加女萎 多忘加石斛 葛蒲

渾身麻木 當歸 茯苓各一錢 川芎 熟地 陳皮 半夏 羌活各七錢 白芍八分 人參 秦艽

牛膝各六錢 白木四分 桂枝三錢 柴胡四分 防風五分 炙草四分 五積散亦可

四肢面目皆麻 補中益氣湯加 木香 炮附 麥冬 羌活 防風 烏藥

口舌麻木吐涎或身麻有痰 黃連 半夏 瓜婁仁 黃芩 茯苓 桔梗 枳殼 陳皮 天麻

細辛 南星 甘草 血虛加當歸 氣虛加人參

瘀血麻木 四物湯加 桃仁 紅花 韭汁

身麻木生疙瘩 防風 荆芥各四分 羌活 獨活 連翹 當歸 生地 蒼朮 檳榔 玄參 牛

開結舒經
湯

行氣開痺
飲

夢

忍冬各五分

升麻

防己各五分

赤芍

陳皮

蔓解各一錢

半夏二錢

茯苓

烏

藥

牛膝各七

木瓜六分

木香三

黃連四

薑蔥煎熱服取汁

初服

麻黃一錢

〇二三服當

歸

〇四五服

加酒大黃

半錢

五服愈

因氣麻木

紫蘇

陳皮

香附

烏藥

川芎

羌活

蒼朮

南星

半夏

當歸各八分

甘草

各四分

〇痺病論

痺閉而不通也

或遍身或四肢拘攣而痛有不痛者病久入深也初因元精內虛外為風寒濕三氣所襲

不能隨時祛散久則成痺風氣勝者為行痺古稱走注今名流火脈浮寒氣勝者為痛痺世稱痛風及

白虎歷節風脈滿濕氣勝者為著痺即麻木脈沉緩三痺各有所勝如此治藥以勝者為主要知三氣

雜合成病不可舉一廢二忌收斂宜辛散行氣開痺飲羌活川芎防風蒼朮秦艽紅花肉桂細辛續斷

風勝倍風藥寒濕偏勝酌倍之在上加片薑黃桂枝威靈在下牛膝防己蔓解木通入有五痺〇筋屈

不伸為筋痺前方加木瓜柴胡〇血凝不流為脈痺前方加菖蒲茯苓神當歸〇肌肉不仁為肉痺前方

加白茯苓陳皮木香砂仁〇遇寒皮急遇熱皮緩為皮痺前方加紫苑杏仁麻黃〇重滯不舉為骨痺

前方加獨活澤瀉治痺不外乎此

〇流注論

或結塊或漫腫或生于四肢關節或流於胸腹腰腎皆因憂思忿怒虧損肝脾腠理不密外邪因而客之

或濕痰流注或跌撲血滯而成婦人則產後勞役復傷血氣以致營衛不從逆于肉裏或產後惡露不

盡氣注血凝皆氣血虛損之病若氣血充實經絡通暢決無此患急用葱熨爛炒熱貼患處冷則見此

外補陽氣運散壅滯之法內服益氣養榮湯入物加黃耆貝母桔梗陳皮香附或方脈流氣飲二陳加

蘇黃耆者青皮當歸川芎芍藥烏藥桔梗防風枳實木香大腹子則未成自消已成自潰又須審其見症畏寒陽虛十全大補補熱內熱陰虛四物加參朮作嘔胃虛六君加炮薑食少體倦脾虛補中益氣加茯苓半夏四肢逆冷小便數命門衰八味丸小便數作渴腎水虧六味丸若不補氣血不節飲食不慎起居不戒七情或用寒涼尅伐多至不治

○結核病論

遍身皆有肉裏皮外有如榛如豆焮腫有形者有結于肉裏其色不變者有形于肢節累累如貫珠者有大按則痛久不愈或服消疔之藥不按自痛者其症皆起于鬱怒虧損肝脾或暴怒觸動肝火婦人胎產經行失于調養形傷則痛氣傷則腫慎不可輕用行氣破血之劑

結于項側耳前後胸肋腫痛肝胆少血火燥脈浮大而滑滋腎養肝益元六味丸加味道遙參用

結于喉間肝脾鬱結歸脾加半夏山梔升麻紫蘇

結于腹內小腹內結塊作痛非肝脾氣滯即虧損脈雖洪數弦緊亦作真氣虛邪氣實論只于補中益氣

六味加味道遙三方治之

時消時作氣滯痰結歸脾六君子調和肺脾之氣自愈

潰而核不敗或肉不生五臟皆虛但用補中益氣六君子調補脾胃以滋諸臟各症自退

○血風病論

遍身疙瘩或如丹毒痒痛不常搔破成瘡名曰血風瘡此症皆肝脾肺三經風熱或鬱久血燥所致內症

則小便不調夜熱內熱或往來寒熱自汗盜汗婦人則月經失常斷不可常用風藥治外復傷陰血須

審治之

單熱作痛肝經風熱血燥當歸散四物加利蔞黃芩防風荆芥首烏甘草外加柴胡山梔鉤藤

寒熱作痛。肝脾鬱火。小柴胡加山梔黃連。

疔瘡癰瘡。肺經風熱。宜清熱消風。普濟風劑。芥連翹沙參。玄參紫蘇。

體倦食少。口乾潮熱。肝脾鬱火傷血。加味道遙散。

夜熱作渴。血分有熱。小柴胡合四物。

○癰疹病論

癰疹皆熱毒。熱則傷血。血熱不散。傳于皮膚。有色點無顆粒。狀如錦紋。曰癰。點有小顆粒曰疹。

傷寒發癰胃熱也。

吐瀉發癰。由胃虛無根之火。遊行于外。此症不妨。但可補。不可瀉。可溫。不可涼。

陰症發癰。伏寒在下。逼其無根失守之火。聚于胸中。上熱薰肺而發斑。用調中湯溫胃。羌活白芷麻黃桂

枝。藿香蒼朮。川芎桔梗。芍藥陳皮。生夏砂仁。枳殼甘草。薑。

內傷寒物亦發癰。暑月得之。先因傷暑。次食寒物。並居涼處。內外皆寒。逼暑火于外而為癰。亦用調中湯。

風疹經云。汗出見濕。乃生座癰。汗出則虛矣。露卧見風。沐浴見濕。使人身振寒熱。致生風疹。勿專治風。調

中湯最穩。一方治癰疹。浮萍焙乾。生茅酒炒。晒乾。殭蠶各一兩。為末。每服二錢。薄荷湯下。

○赤白遊風病論

肢體或腿臂腕間。患瘡癰。或赤暈如霞。遊走不定。瘡癰。赤曰赤遊。白曰白遊。白屬氣。赤屬血。得風則遊行。

或因肝經血燥生風。或起火內動肝風。或脾經鬱結。血虛生熱。風邪因而外襲。治法不宜祛風。風藥燥

血。血隨火化。反成敗症。加味道遙散最妙。脾經鬱熱。加味歸脾湯。補熱內熱。六味丸。五味子。浮萍最利。

此症宜加入。將鹿膠頓銓塗之立愈。

○遍身搔癢病

加味四物湯

消風散

羚羊散

苦茶湯

鵝黃散

消風散

續命丸

凡瘡皆屬虛氣虛午前瘡虛午後瘡遍身搔癢大約肺家血虛火盛而生風不可誤服風藥四物加二冬桑枝蟬蛻僵蠶牛蒡刺蒺藜威靈仙外用蒼耳葉地膚子浮萍湯浴

血虛作痒 四物湯加黃芩調浮萍末

諸痒如蟲行 四物湯大料服之

風寒積聚癰瘡癰瘡 茯苓 川芎 羌活 人參 荊芥 防風 藿香 甘草 蟬退 僵蠶 厚

朴 陳皮 茶酒煎服

○皮膚病

皮膚痛手不敢按 桑白錢 乾葛 柴胡 桔苓 玄參 錢各一 地骨皮 天冬 麥冬 錢各一 錢 甘

草 木通 錢各四 薑蔥煎服取微汗

皮膚枯燥如魚鱗 牛骨髓 真酥油合煉一處每日空心熱酒調服三匙

遍身青紫斑點色若葡萄 初起 羚羊角 防風 麥冬 玄參 知母 黃芩 牛蒡 錢各八 甘

草二

○癩病

癩子痒痛常如草刺 苦參 四 菖蒲 兩 水五 煎數滾 添水二 匙 蓋片時 臨洗和入公猪膽汁四五

枚洗之不三次全愈

癩子抓破皮 菜豈粉兩 滑石錢 黃柏錢 輕粉錢二 擦之自愈

○疥

內服 生地 防風 蟬退 知母 苦參 胡麻 荊芥 蒼朮 牛蒡 石膏 錢各一 甘草 木通 各五 當歸 錢一 煎服 外搽 樟腦 輕粉 川椒 枯礬 水銀 雄黃 錢各二 楓子肉 個一百 為

分

一掃光

二粉散

必效方

枯癰膏

星附散

補心湯

定振丸

末柏油一兩化開攪勻作丸搽之。○或用苦參黃柏各一兩烟膠一木鼈肉川椒蛇床子

白礬枯礬硫黃楓子肉樟腦水銀輕粉各二白砒分五猪油調搽二次愈

漆瘡杭粉一石膏錢三輕粉錢五為末韭汁調敷如無韭涼水調敷熱湯

○癬

勿論乾濕硫黃錢八生礬錢四川椒錢二鮮土大黃根汁調抓損搽之多年頑癬加醋和之如此不

效用川槿皮錢四輕粉雄黃各四百藥前個斑貓全用巴豆去油大黃錢二海桐皮錢二

抓損搽之

瘤初起根小者白砒硫沙黃丹輕粉雄黃乳香沒藥礬砂錢一斑貓二十田螺

曬乾為末以糯米粥調作餅子曬乾先炙瘤頂三柱香以餅貼之用黃柏末水調蓋敷藥餅十日外

瘤自枯落次用血竭輕粉龍骨海螵蛸象皮乳香各一雞蛋煮熟用黃煎油一小盞

藥名為末和入雞蛋油內每日早晚甘草湯洗淨患處用雞翎蘸搽太乙膏蓋貼

○顫動木尅土脾主肌肢木尅之故動經謂風淫末

手足顫覺內寒南星半夏人參炮附白附茯苓川烏礬蠶沒藥水酒煎熱服取

微汗

顫覺內熱膽星鈎藤酒連滑石青黛礬蠶各等天麻倍甘草竹瀝○有痰含導痰

湯

顫心不寧當歸一錢川芎炙草錢各一生地一錢遠志二錢棗仁柏仁錢各二人參錢一

琥珀五分茯神七分膽星分五石菖蒲分六為丸更妙

老人顫天麻秦光全蠍細辛兩一熟地生地兩各二當歸川芎白芍兩各一防風

參末湯
獨活湯

煎服

○潮熱一日一發為潮熱
五發是發熱

潮熱大便堅喜冷畏熱不寐此是氣盛 參蘇飲見發熱門
潮熱氣乏食少神悴體瘦病少去五心常有餘熱 參蘇飲合 當歸 川芎 白芍 熟地○間服十

全大補湯見虛弱門

參蘇飲
八珍散
五枝湯

參末補心湯

病後久調理潮熱者 八珍散 人參 茯苓 白朮 黃耆 山藥 粟米炒 扁豆 甘草
有潮熱是虛背心痛服補藥不效是氣虛 旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓 厚朴 半夏
澤瀉 猪苓 前胡 桂心 白芍 炙草 薑煎服

全大補湯

四物二湯
地骨散

黃耆散

抑除地黃湯

血虛五心熱晝則減夜則劇熱 當歸 生地 白芍各一錢 川芎七分 黃連炒五分 胡連三分
熱在皮膚日夕甚喘咳洒淅肺熱也 柴胡 地骨皮 桑白 枳殼 前胡 黃耆各七分 茯苓 五
加皮 人參 甘草 桂心 白芍各五分 薑煎服
熱在肌肉寅卯時甚便難轉筋肝熱也 柴胡 黃耆 赤芍 白朮各一錢 人參 地骨皮 枳殼 桔
梗 桑白 赤芍 生地各半 麥冬一錢 甘草三分 薑煎服
產後毒勞寒熱往來 黃耆 薑中 當歸各一錢 桂心 白芍 續斷 川芎 牛膝 肉蓯蓉 沉

散
加減道遠

香柏仁枳殼各六分半 熟地分五

寡婦居僧獨陰無陽乍寒乍熱 生地錢三 柴胡 秦羌 黃苓各五分 赤芍錢一 為丸亦可密丸烏梅

湯下

予午潮熱 當歸 白芍 白木 茯苓 丹皮 柴胡 梔子 黃苓 胡連 麥冬 地骨 秦羌

木通 車前

○寒熱

身大熱反欲近衣是熱在內 先用桂枝 白芍 生薑各三錢 炙甘草錢三 棗煎服。須臾吃稀粥一

鍾以助藥力被覆一時身微似有汗為度治內寒也。再服黃苓錢二 人參 半夏各一錢 柴胡錢三 甘草

分八 薑棗煎治外熱也

身大寒反不欲近衣是寒在內 先用知母錢三 石膏錢八 甘草錢一 粳米撮一 人參錢三 煎服治內寒也

○再服桂枝八分 白芍 生薑 炙草 麻黃各一錢 棗個一 杏仁個五 煎服解外寒也

腰以下熱腰以上寒 炒梔半錢 瞿麥分五 炙草分三 葱白根三 薑片三 煎熟服

腰以下寒以上熱頭目赤腫下節寒足 熟大黃便利去之 酒黃連 酒黃苓 炙草 桔梗各二錢 柴胡

升麻 連翹 當歸身錢各一 忌酒麪生冷硬物

炎暑月得寒病身涼 人參 炮附 炮薑 炙草 白木等分 寒減大半止。脈得四至可矣。

陣陣寒如涼水洒慘慘不樂面色異于平時兼倦怠好臥 陽氣不升 黃耆錢一 半夏 人參 炙草各五分

獨活 防風 白芍 羌活各三錢 陳皮分二 茯苓 柴胡 澤瀉 白木各三錢 薑連分五 薑棗煎

已午未分服 服後如小便利病益甚是不止利小便也 去茯苓 澤瀉

外症唇破口乾內却虛寒脈沉遲肢冷 黃耆 當歸 桂心 白芍各一錢 炙草 半夏 炮附各二錢

周身部 皮膚分

太建湯

附子理中湯
升陽湯

既濟解毒湯
三枝湯

人參白虎湯
桂枝麻黃湯

桂枝湯
小柴胡湯

二氣丹

祛寒丸

四君子湯

四物湯大

涼膈散

麥冬湯

退熱湯

參蘇飲

柴胡湯加北黃

分人參分五 薑棗煎
內外皆寒冷氣刺痛泄嘔肢冷小便不禁
一錢為衣艾鹽湯下三十丸
硫黃 肉桂各一錢 炮薑三錢 炮附半錢 麩糊丸硃砂

心腹寒痛瀉利腸鳴水穀不化手足冷
萸撥四錢 肉桂四錢 炮薑六錢 良薑六錢 麩糊丸
表虛自汗惡風寒 黃耆 桂枝 白芍 甘草或汗後表虛調中益氣湯倍 黃耆 桂枝見勞

素軟弱脈虛不能任風寒 人參 白朮 茯苓 炙草各八分 黃耆 桂枝各一錢 甚者加炮附
明明內火甚反振慄惡寒是火兼水化 當歸 川芎 白芍 生地 黃耆 黃柏 黃連

外感發熱惡寒治見傷寒水化

○內外熱

發熱能食大便難也實 黃連 黃芩 生大黃各等分 蜜丸
內熱口唇燥咽腫目赤鼻血口瘡譫妄二便結 梔仁 連翹 薄荷 黃芩 甘草各二錢 大黃

芒硝各五分 竹葉片 入蜜煎服
上焦熱咳衄口甘口苦神不定消渴淋瀝 薄荷一兩 麥冬二錢 甘草一錢 生地六錢 黃連一錢 黃

者 蒲黃 阿膠 人參 木通 柴胡各二錢 生草 黃連酒炒 黃芩 白芍 地骨 生地 蒼朮各五分 當

表虛熱夜則甚 黃耆一錢 柴胡六分 生草 黃連 黃芩 白芍 地骨 生地 蒼朮各五分 當

歸 升麻各三分 感冒發熱 乾葛 前胡 半夏 人參 茯苓各七分 木香 蘇葉 枳殼 桔梗 炙草 橘紅

婦人發熱經或來或斷晝則明白夜則昏譫是熱入血室 柴胡六錢 人參 黃芩 炙草 半夏 生地

柴桂湯

活血湯

火解湯

補中益氣湯

小柴胡湯
加四物湯

衛生湯

內消沃雪湯

婦人熱病經來寒熱如癰狂妄。
柴胡錢一 桂枝分三 花粉分五 牡蠣 炮薑 炙草各二 煎服汗出

愈

發熱病二便如常不惡寒夜多熱晝少熱時作時止。
是難症熱入血室 酒生地 熟地 蒲黃 丹參酒當

歸防已酒 柴胡 炙甘草 羌活各一 桃仁分三 空心服

手心熱是熱 升麻 乾葛 羌活各五 防風半 甘草生半 炙 柴胡分三 人參 白芍各五

葱白煎

胸滿噎酸便臭發熱是傷 柴胡 半夏 陳皮 茯苓 枳實 山查 神麴 炙草

勞役甚發熱是內 補中益氣湯 挾外邪加羌活 因房事勞加酒知母 酒柏 或用 人參錢二

白木錢二 麥冬錢二 黃耆一錢 陳皮五分 五味子個十 炙草七分

飲酒多發熱 葛花解醒湯

夜不熱晝熱氣分 柴胡 黃芩 半夏 梔子 黃連 知母 地骨皮

晝不熱夜熱血分 當歸 川芎 白芍 生地 知母 黃柏 黃連 梔子 丹皮 柴胡

○外毒分

○腫瘍

一切腫毒大毒未成 羌活 防風 白芷 穿山甲 沉香 紅花 連翹 石決明 忍冬花

皂刺 歸尾 草節 花粉各一 乳香分五 大黃酒炒二錢 在上先藥後飲酒 在下先飲酒後

腫毒堅硬疼甚 青皮 陳皮 乳香 沒藥 連翹 黃耆 當歸 草節 白芷 射干 花粉

萬應生肌膏

卷十二

周身部 外毒分

六

內消黃連湯

雙解復生散

護心散

竹葉黃連湯

透濕散

回陽湯

金黃散

山甲 貝母 白芍 忍冬 皂刺各八分 木香分四 大黃錢二 水酒各半煎服

腫毒發熱嘔便秘飲冷舌乾口苦脈沉實 木黃 黃連 山梔 當歸 黃芩 白芍 薄荷 檳榔

桔梗 連翹錢各一 甘草節五分 大黃錢二 川芎 白芍 黃耆 麻黃 甘草節各五分 薄荷 山

梔 當歸 連翹 滑石 忍冬 羌活 人參 白朮各八分 大黃 芒硝各二錢 薑黃煎服

腫毒內攻惡心 豆粉兩一 乳香錢三 硃砂錢一 甘草錢一 白滾水調服二錢日二服

腫毒已成未膿防毒內攻 人參二錢 黃蠟兩一 雄黃五分 琥珀錢二 硃砂二錢 蜜錢二 錢黃蠟

為丸如豆大每服三十丸

腫毒內乾大渴 黃耆 甘草 黃芩 川芎 當歸 白芍 人參 半夏 石膏 竹葉 麥冬各八分

分 生地錢一 燈草煎服

腫毒已成不破 黃耆錢四 川芎錢三 山甲錢一 當歸錢二 皂針半錢 水煎臨服入酒少許

陰毒不腫不疼不熱不紅但堅硬者 炮附 人參 黃耆 當歸 川芎 茯苓 枸杞 陳皮 莢

肉錢各一 木香分五 甘草 紫草 厚朴 蒼朮 紅花 獨活各五分 皂角樹上白皮錢二 煨薑片三

水酒各半煎三服取效

一切腫毒敷法 花粉六錢 黃柏 大黃 薑黃 白芷各八錢 厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 南星

錢各三 為末蜜調敷腫上

腫毒將潰已潰根散不收 銅綠錢五 明礬錢四 胆礬錢三 五倍兩炒一 白芨錢五 輕粉 鬱金各二錢

麝香分三 陳醋碗一 慢火熬起金色黃泡為度上藥為末每一錢攪入醋膏內每用頓溫用筆蘸塗瘡

根上以綿紙蓋其瘡根自生網紋漸收漸緊再不開大

加味太乙膏

解毒銀花散

作腐提膿膏

內銀外金散

梅花五氣丹

太乙紫金丹

貼瘡膏藥 肉桂 白芷 當歸 玄參 赤芍 生地 大黃 木鼈各二兩 阿魏錢三 輕粉錢四 槐枝 柳枝各一百一 血餘兩一 黃丹兩四十 乳香錢五 沒藥錢三 油斤五 先將油浸藥數日入火熬至藥

焦浮撈藥渣過油淨入血餘熬得血餘浮起然後稱油每油一斤入黃丹六兩半却再熬先發青烟後

至白烟則膏成矣如稀亦可再加炒丹離火下阿魏次下乳香沒藥輕粉項入冷水浸乘溫扯拔百轉

為妙

陰毒不起色變紫黑急服 忍冬枝葉花並用二兩 生黃耆兩四 甘草兩一 酒二十 煮三炷香時飲之即

高腫

腫毒已成瘀肉不腐及不作膿或內有膿而外不潰 草麻仁 輕粉錢各三 血竭錢二 巴豆錢五 朝腦

錢一 砒分五 螺螄肉個二 晒乾共為末麻油調搽以綿紙蓋之或膏貼俱可不過一次即爛

腫毒成不消者服之易潰 白芍 黃耆 川芎 當歸 防風 桔梗 花粉 忍冬 人參各一錢

肉桂 白芷 甘草 乳香 沒藥各五 煎成入酒一杯

腫毒初起寒熱骨痛嘔惡似傷寒 冰片 麝香各五 輕粉 辰砂各六 乳香 沒藥 血竭 雄

黃錢各一 鮮酥自取蟬酥二錢用男乳調 將上藥為末入酥乳汁內調丸即刻晒乾用川椒燈心同藥收藏瓶內

以蠟封口凡遇惡瘡大毒用葱白食後嚼下然後將藥丸放舌下睡煖處蓋被藥化徐嚥之瘡大者二

三丸亦可即得汗而愈寒月將葱白湯催之如暗疔勢急用葱白煎酒一杯研藥五丸灌下其效如神

此外科第一奇方也

諸毒諸瘡內服外敷 山茨菰去毛皮二兩 五倍去末焙二兩 麝香錢三 千金子白仁去油一兩 紅牙大戟去蘆焙一兩半

硃砂 雄黃各三錢 糯米濃汁調和杵千餘每錠一錢每用一錠病重者連服二錠取利後以溫粥補

之

萬世尊生書 卷十二 周身部 外毒分 七

猪蹄湯

生肌玉紅膏

托裏定痛散

小保安湯

膏藥金石熱毒及消病恐生癰疽 人中黃 烏梅肉 茯神 胡連 五味 石菖蒲 辰砂
雄黃 遠志 硝石 牛黃 冰片 金箔 煉蜜為丸每丸重一錢人乳童便下

○潰瘍

腫毒已潰洗藥 猪前蹄一隻煎湯去 羌活 甘草 赤芍 黃芩 白芷 當歸 蜂房 等分共
入汁內煎去藥以絹蘸湯淋于瘡上輕手去瘀腐惡物隨湯而下洗畢貼膏

已潰流膿 白芷 甘草 歸身 血竭 輕粉 白蠟 紫草 麻油 先將
歸身並紫草入油浸大熬枯色去渣再熬令滾下血竭化盡次下白蠟化盡先用碗頓水中將膏傾碗內

方下輕粉則成矣 每用先用猪蹄湯洗去瘀腐却將此膏挑掌中捺化遍捺瘡上以太乙膏蓋之大
瘡早晚洗換二次兼服補脾胃氣血暖藥其腐肉自脫新肉易生

膿清稀並見虛症 宜服十全大補湯

虛熱 宜服八珍湯

氣不足倦怠身熱 宜服補中益氣湯

發熱惡寒痿黃消瘦 宜服人參養榮湯

病久鬱結 宜服歸脾湯

不思食 嘔惡香砂六君子湯

已潰血虛疼痛不可忍 歸身 熟地 乳香 沒藥 川芎 白芍 肉桂 粟殼 去筋蜜
熱大膿多氣血大虛 人參 白木 熟地 日二服

已潰流膿當服無變症 當歸 茯苓 川芎 黃耆 麥冬 陳皮 桔梗 人參 白木 半

夏 甘草 藿香 薑棗煎服

蟬酥丸為
條即蟬酥

黃連解毒
湯立馬回疔

神効護心
散

○疔毒

疔初起項以上用披針刺入瘡心四五分挑斷疔根出惡血用回疔丹或蟬酥條插入孔內膏蓋之項以下當艾火亦用前治法後俱用蟬酥丸冬月萬靈丹發汗紅絲疔挑斷絲出血其初瘡亦用前法

惡症疔瘡不痛只麻木嘔吐昏憤蟬酥二錢輕粉五分枯礬寒水石煨銅菜乳香沒藥

膽礬麝香各一雄黃二錢蝸牛二十個硃砂三錢先研蝸牛和酥酒調稠入藥末勻丸如菜豆大

用葱白五寸患者自嚼爛同藥三九熱酒送下被蓋如人行五六里出汗為效甚者再服

疔毒入心內熱口乾脈實黃連黃芩黃柏山梔連翹甘草牛蒡燈心煎

疔刺後用此插之蟬酥酒硃砂輕粉雀巢各一蜈蚣個雄黃硃砂各二乳香六

麝香分砒分五糊成麥子大插入疔孔膏蓋之追出膿血疔根效

毒攻心惡心不食并一切腫毒蠶蠶山甲大黃牙皂去皮木鼈炒焦各土炒等分為末熱

酒下一錢如嘔出再服待藥存住則毒不攻心矣一切瘡毒未成可散

楊梅瘡大黃熟五玄明粉二錢山甲錢五赤茯苓一錢以上用好酒煎○再用乳香沒藥各二

鹿茸五分為末和入服後解下即愈

