

欽定四庫全書

子部

傷寒總病論卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官大醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

傷寒總病論卷六

傷寒雜方

久夏傷寒發汗極效時雨散

春及夏初行之大驗

蒼朮

四兩

甘草

二兩

麻黃

各二兩

猪牙皂角

四挺

為末每服二錢水一盞煎三兩沸和滓溫服蓋覆取

汗出立效

但是時行寒疫皆宜服此可多合以拯貧

宋 龐安時 撰

民

傷寒頭痛玄精石方

石膏 太陰玄精石 各一兩 麻黃 二兩 甘草 半兩

麤末每服四錢水一盞竹葉二七片煎七分去滓溫

飲不計時候

傷寒頭痛不止瓜蒂牙硝散

藜蘆 錢一 瓜蒂 錢三 牙硝 錢二 腦麝 各少許

細末吹少許入鼻得嚏則愈

時氣八九日喘悶煩躁麻黃杏子湯

桔梗

麥門冬

各一兩

麻黃

一兩半

杏仁

黃芩

甘草

各三分

麤末每五錢水一盞半煎八分溫溫日可四五服

時氣腦熱頭疼不止朴硝散

川朴硝研生油調塗頂上

時氣豌豆瘡出不快心神煩悶犀角五香湯

犀角屑

丁香

乳香

木香

各半兩

玄參

升麻

各一

兩麝香一分木香不用

麈尾每五錢水一盞竹瀝半盞煎八分溫溫日三四

服

妊娠雜方

妊娠時氣令子不落伏龍肝散

伏龍肝為末水調塗臍下乾時易之疾差乃止

妊娠傷寒內熱極甚令不傷胎含雞子法

取雞子以絹袋貯投井底浸令極冷旋破吞六七枚

佳

妊娠傷寒腹脹大便不通喘急牽牛散

大黃

鬱金

青橘皮

各一兩

甘草

三分

牽牛子

取末二兩

細末不計時薑湯調下二錢以利為度

妊娠傷寒服汗下諸藥熱已退覺氣虛不和宜與此藥
安胎黃著人參湯

黃著

人參

半夏

陳橘皮

麥門冬

當歸

赤茯苓

各半兩

麤末每服四錢水二盞薑三片煎七分去滓下阿膠末一小匕烱化溫與之日可三四服

大熱甚胎不安者不宜前藥宜用阿膠散

阿膠末一錢半竹瀝調下無竹瀝用小麥竹葉煎湯

調下

妊娠傷寒四五日已上心腹脹渴不止腰痛重橘皮枳實湯

枳實

麥門冬

各三分

陳橘皮

一兩

麤末每服五錢水一盞半生薑四片煎八分去滓溫服

妊娠熱病胎死腹中鹿角屑湯

鹿角屑

一兩

水一椀蔥白五莖豉半合煎六分去滓溫作二服

又方益母草飲子

益母草絞汁飲半升即出

治傷寒小產惡路不行腹脹煩悶欲死大黃桃仁湯

朴消 大黃

二味等分末之每一錢或二錢桃仁去雙仁皮尖碎之濃煎湯調下以通為度日三服

小產後其惡路被熱蒸斷不行地黃飲子

地黃汁

藕汁

各一

生薑汁

一盞

令和煖溫分三四服微有寒煎二十沸服之亦下死

胎

傷寒產後血暈欲絕紅花散

紅花 荷葉 薑黃等分

末之炒生薑小便調下二錢

凡傷寒小產夏月宜少用醋炭多有煩悶暈死者

傷寒產後惡血衝心悶亂口乾生地小便飲子

生地黃汁 藕汁 小便各一盞

和勻煎三兩沸溫熱分作三服

傷寒產後惡露為熱搏不下煩悶脹喘狂言者抵黨湯

及桃仁承氣湯主之二方在下門中

傷寒小產後煩悶大躁渴石膏湯

黃連

黃芩

甘草

栝樓根

各一兩

石膏

半兩

麤末每服四錢水一盞半煎八分溫服一盞

傷寒暑病通用刺法

龐曰凡過經不解譫語者當刺期門隨其實而瀉之刺期門之法須待脈弦或浮緊刺之必愈餘刺之不差以正取肝之邪故也期門穴直乳下當腹傍近脇骨是穴針入一寸

傷寒發熱嗇嗇惡寒其人大渴飲水者其腹必滿小便不利而自汗出其病欲解此為肝乘肺名曰縱當刺期門

腹滿譫語寸口脈浮而緊此為肝乘脾名曰橫當刺期門

下血而譫語此為熱入血室但額上汗出者當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出者愈

婦人中風發熱惡寒其經水適來得七八日熱除脈遲

身涼胃脇下滿如結胃狀而譫語此為熱入血室當刺期門隨其實者而取之

太陽與少陽併病頭痛或眩時如結胃心下必堅當刺瀉肺膈大杼慎不可發汗發汗則譫語譫語則脈弦五日譫語不止當刺期門

傷寒喉痺刺手少陰腕骨小指後動脈是也刺入三分

補之

佳通里二穴去腕後一寸是手少陰之經主熱病喉痺鍼入三分可灸三壯

傷寒妊娠腹滿不得小便腰以下腫如水氣狀懷孕七

月太陰當養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便利即

愈

勞宮手掌中夫屈名指取之關元在臍下三寸

傷寒飲水過多腹脹氣喘刺中脘

鳩尾下三寸

傷寒汗不出瘡強喉閉煩滿針大杼

大杼穴在第一椎下兩傍相去各一

寸五分針入一寸瀉之

傷寒餘熱不盡皮膚乾燥針曲池

在曲肘橫紋頭針可透下瀉之

熱病汗出脈反順可汗者取之魚際太淵太都太白瀉

之則熱去補之則汗出太甚者取踝上橫紋以止之

魚際

在大指本節後內側散脈中太淵在掌後陷中太都在足大指本節後陷中太白在足內側於骨下陷中踝上橫紋不說穴名當是足內踝上二寸名曰腹溜主骨寒熱汗注不休故也

熱病七八日脈口動喘而眩者急刺之汗且自出淺刺

手大指間

合谷穴是也

熱病先胃脇痛手足躁刺足少陽補足太陰

據傷寒皆忌土敗木

賊證是足少陽木受邪當傳尅脾土故宜瀉足少陽之邱墟而補足太陰之太白素問云補足太陰者是也其全元起太素作手太陰而以肺經從肺出腋下故胃脇痛滿又有引虛則索筋於脈不得索之於金而以手太陰為是既言不得索之於金矣而復求金乎是必不然也既瀉於木理不合更補於金若補於金則木反受尅

矣故當補
脾土無疑

熱病先手臂痛刺手陽明太陰汗出止

太陰絡列缺穴在腕上二寸半

刺七分陽明商湯穴在手大指次指端去甲如薤葉刺三分

熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止

天柱穴在項後髮際大筋外廉

陷中可刺五分瀉之

熱病先眩冒而熱胃脇滿刺足少陰少陽

足少陰涌泉穴在兩腳心

陷屈足卷指宛宛中刺入七分瀉之無令血出足少陽俠谿穴在小指岐骨間本節前陷中

熱病始足脛痛者先取足陽明而汗出

陷谷穴在足大指次指之間本