

胎產心法

上卷二

李繼鄴

胎產心法卷之上

上谷閻純璽

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼。重則脹滿疼痛。謂之子懸。紫蘊飲爲必用之藥。蓋因紫蘇飲爲治妊娠胎氣不和。濁氣舉胎上湊。胎熱氣逆。心胃脹滿之證。且此證挾氣者居多。宜疎氣舒鬱。非紫蘇。腹皮。川芎。陳皮。無以流氣。非歸芍。無以養血。氣血既利。而胎自降。然邪之所湊。其正必虛。故以人參。甘草補之。如飲食不甘。加四君子。有熱加芩。梔。歸芍。內熱。晡熱。或

四君兼逍遙散。若常常多怒。時覺脹滿。服順氣藥不應。宜用和氣安胎飲。或加味道遙散。胎上攻而作痛。宜紫蘓飲。或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿。安胎飲力薄。宜用加參平胃散。有因鬱滯者。亦宜紫蘓飲。或加味歸脾湯。有因痰結聚者。紫蘓飲加芩連貝母。有因暴怒者。左關必弦洪。肝火內動。用小柴胡。加茯苓枳殼山梔。大抵胎氣上逆。皆屬火旺。急用芩朮香附之類。不可服大寒之藥。反致他變。予每治孕婦。心胃脹滿。用尊生和氣飲。甚效。子懸證。有兩尺脉絕。餘脉平和。不可錯認死胎。且死胎有面青舌青可辨。

宜紫蘓飲。治之則胎歸原位。脹消脉起矣。如臨月胎上逼心。嘔噦欲死。急用童便灌之。卽下。或烏梅肉十枚。研爛。入生薑三片。煎湯灌之。亦下。取酸以降飲之。兼辛以散火氣之逆也。又有因坐草太早。心懷恐懼。氣結不行。紫蘓飲一服便產。後附針灸一方。脩用。

四君子湯 治胃氣虛弱。飲食不思。倦怠少食。

人參 一錢至三錢
白朮 一錢至二錢。土炒黃

茯苓 一錢至錢半
炙甘草 六分至一錢

水煎服

逍遙散

附八味道遙散又名加味道遙散

治血虛肝

燥骨蒸勞熱往來寒熱咳嗽潮熱月經不調口乾
便澀

柴胡

當歸酒拌

白芍

酒炒

白朮土炒

茯苓

各一錢

炙甘草五分

加煨薑薄荷引水煎服。一方無茯苓薄荷有神生

薑爲引。治脾肝血虛鬱怒傷肝血少目暗發熱脇痛等

證。加丹皮梔子各七分名八味道遙散又名加味道

遙散。治小便帶血。或過勞。及多食炒炙。宜清膀胱之火。
當歸、柴胡、加倍白朮、加五分。

和氣安胎飲 治孕婦多怒。胸中脹滿。若用烏藥、香

附、砂仁、順氣等藥。反加滿悶。宜服此飲。

人參

白朮 土炒

當歸 酒洗各錢

川芎

條芩 各八分

陳皮

紫蘇

炙草 各四分

木香 二分 磨汁衝服

薑引煎服。一方無木香。有砂仁。四分名順氣安胎散。
治孕婦胎氣上攻。心腹脹滿作痛。子懸之證。有因氣惱
者。加木香二分磨衝服。

加參平胃散 治孕婦脾虛氣弱。飲食停滯。以致腹
脹嘔吐。安胎飲力緩。宜用此散。

人參

白朮 土炒各一錢

蒼朮

米泔浸製

厚朴 薑製七分

陳皮

炙草 各四分

薑一片。水煎服。

尊生和氣飲 治孕婦心胃脹滿

人參 蘇梗

白芍 酒炒 川芎 各六分

當歸 一錢或六分 酒洗 腹皮 五分 製淨

木香 二分 磨衝藥服 炙草 二分

水煎服

附針灸方

妊娠六七個月。飲食絕然不進。胸膈脹水。與藥皆不能下。診脈平和。又非病脈。此乃膈氣不通。藥不能治。惟針

灸可通。宜灸內關穴。卽能進飲食矣。其穴在手掌大紋後二寸兩筋間。此穴可針亦可灸。男左女右。重則雙手同灸。輕者七壯。重加十數壯。艾如黍大。或如麥大。寸取本人同身寸。以男左女右手。中脂屈回。用草較所屈中脂中節內紋兩頭盡處截斷。爲準一寸也。

紫蘓飲

見本卷安胎門

小柴胡湯

見本卷諸痛門

加味歸脾湯

見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極如同月水。胞乾胎死。母亦難保。其調治之方。已詳論於胎漏門中。茲不重論。

妊娠吐血。凡七情內傷。六淫外感。皆足致失血之患。一主火熱者。以氣血壅養胎元。或有所感。則氣逆而火上乘心。煩滿悶。血隨而溢。甚者。或致墜胎。但火有虛實之分。實火清熱養血。虛火滋陰補水。則血安胎固。若泛用行血清血之劑。胎必墮。而禍不旋踵矣。如肝經怒火。加味道遙散。膏梁積熱。加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘇飲。氣不攝血。補中益氣去升麻。

加煨葛根。腎經虛火。冬味地黄湯。

鼻衄不止。東垣涼膈散。加當歸生地。各一錢。茅花一大團。

生薑引。

咳嗽咳血。宜涼血。地黃湯。醫通云。咳嗽咯衄。胎前皆不宜。見如面赤聲啞。不治。又云。凡咯吐血。多致墜胎。胎賴血養。不宜漏溢。宜紫蘇飲。加條芩。

尿血。乃熱乘血分。流滲於脬。故令尿血。自尿門而下。若胎漏。則自人門下血。可辨。宜四物加山梔髮灰。或阿膠熟地。麥冬。五味之類。如怒動肝火。小柴胡加山梔。脾氣下陷。及

勞動脾火。補中益氣。加茯苓車前。若厚味積熱。加味清胃散。若肝脾血熱。加味道遙散。腸風臟毒下血者。平胃散。去蒼朮。加槐角。防風。當歸。烏梅。治之。

加味清胃散

治胃中蘊熱。斑疹。口舌生瘡。齒齦腐

爛出血

生地

四錢

丹皮

五錢

當歸

川連

酒蒸

連翹

去心

各三錢

升麻

生草 各一錢五分

爲散分三服。水煎去滓。衝犀角磨汁三四分。入藥服之。
黃芩清肺飲 治渴而小便不利。

梔子 炒黑

黃芩

各等分煎服。予謂此方乃治雜證發渴而小便不利。妙在熱服探吐以提。則肺氣立清。然胎前血證探吐之法。似非所宜。若服而不吐。不特綿延不能刻應。縱或小差。其苦寒之性。留薄於內。大傷氣血。之氣。治胎前之證者。得不爲之預慮乎。

冬味地黃湯 附九方

熟地 四錢

山藥 二錢

山萸 一錢古方分兩加倍 丹皮

茯苓 澤瀉 各七分

麥冬 一錢或錢半 五味子 十粒

水煎服。此方藥味十倍之煉蜜丸。 即名冬味地黃丸又名八仙長壽丸

涼血地黃湯 治妊婦咳嗽吐血咳血

生地 三錢 麥冬 去心

當歸 酒洗各二錢 黃芩 一錢五分

紫
苑

知
母
鹽水炒

白
朮
土炒

天
冬
去心各一錢

犀
角
八分

陳
皮

甘
草
各四分

水煎服。有喘加瓜蒌仁一錢

加味逍遙散
見本卷子懸門附逍遙散下

加味歸脾湯
見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

紫蘓飲

四物湯
俱見本卷安胎門

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散

俱見本卷諸痛門

子腫子氣子滿論

子滿證卽俗呼胎水證也

妊娠子腫與子氣相類。但子氣在下體。子腫在頭面。若子滿證。又名爲胎水。則在五六月已後。比子氣子腫不同。蓋胎人則腹滿。遍身浮腫。凡子氣子腫子滿。由臟氣本弱。或因泄瀉下利。耗傷脾胃。或寒熱瘧疾。煩渴加飲。濕漬脾胃。

使頭面手足浮腫也。然水漬於胞，兒未成形，則胎多損壞。故初妊，卽腫急，宜調治水去脹，消仍用六君子調補。

所謂子腫者，妊娠面目虛浮，多因脾胃氣虛，或久瀉所致。宜健脾利水。全生白朮散主之。或用健脾利水湯。如未應用六君子湯，或加腹皮車前，又專治肢體如水氣之證，亦有用加味五皮湯治子腫之甚者。

所謂子氣者，妊娠自三月成胎之後，兩足面漸腫至腿膝，或腰以下腫，行步艱難，以致喘悶不寧，飲食不美，似水氣狀，甚至脚指間有黃水出者，蓋脾主四肢，脾氣虛弱，不能