

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷二十



北京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

醫全書

嘔吐

嘔吐

張介賓 撰

上○諸逆衝上皆屬
屬於熱

物盛滿而上溢故嘔也

欽定四庫全書

醫全書

○少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

經脈篇曰足太陰之脈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本彊食則嘔胃脘痛腹脹善噫○足厥陰肝所生病者胸滿嘔逆

舉痛論曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

六元正紀大論曰少陽所至為嘔涌○厥陰所至為脇痛嘔泄

邪氣臟腑病形篇曰膽病者善太息口苦嘔宿汁○肝
脈緩甚為善嘔○腎脈微緩為洞洞者食不化下嗝還
出

四時氣篇曰善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕
之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰
嘔膽

刺禁論曰刺中膽一日半死其動為嘔

診要經終論曰太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔

則逆逆則面赤

五味論曰苦走骨多食之令人變嘔

論證 共四條

嘔吐一證最當詳辨虛實實者有邪去其邪則愈虛者無邪則全由胃氣之虛也所謂邪者或暴傷寒涼或暴傷飲食或因胃火上衝或因肝氣內逆或以痰飲水氣聚於胸中或以表邪傳裏聚於少陽陽明之間皆有嘔證此皆嘔之實邪也○所謂虛者或其本無內傷又無

外感而常為嘔吐者此既無邪必胃虛也或遇微寒或遇微勞或遇飲食少有不調或肝氣微逆即為嘔吐者總胃虛也凡嘔家虛實皆以胃氣為言使果胃彊脾健則凡遇食飲必皆運化何至嘔吐故雖以寒熱饑飽大有所傷亦不能動而茲略有所觸便不能勝使非胃氣虛弱何以若此此虛實之原所當先察庶不致誤治之害

一凡胃氣本虛而或停滯不行者是又虛中有實不得

不暫從清理然後可以培補○又或雖有停滯而中氣虛困不支者是又所急在虛不得不先顧元氣而略兼清理此中本末先後自有確然之理所以貴知權也

一嘔家雖有火證詳列後條然凡病嘔吐者多以寒氣犯胃故胃寒者十居八九內熱者十止一二而外感之嘔則尤多寒邪不宜妄用寒涼等藥使非真有火證而誤用之胃彊者猶或可支胃弱者必遭其虐觀劉河間曰胃膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也此言過矣若執

而用之其害不小又孫真人曰嘔家聖藥是生薑此的確之見也勝於河間遠矣

一仲景曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之此但以傷寒為言也然以余之見則不但傷寒而諸證皆然何也蓋雜證嘔吐尤非傷寒之比其在傷寒則猶有熱邪但以熱在上焦未全入府則下之為逆故不可下也若雜證之嘔吐非胃寒不能化則脾虛不能運耳脾胃既虛其可攻乎且上下之病氣或無涉而上下之元氣實相

依此嘔吐之所以不可攻者正恐病在上而攻其下下愈虛則上愈困耳

虛嘔證治

共三條

凡胃虛作嘔者其證不一當知所辨若胃脘不脹者非實邪也胸膈不痛者非氣逆也內無熱躁者非火證也外無寒熱者非表邪也無食無火而忽為嘔吐者胃虛也嘔吐無常而時作時止者胃虛也食無所停而間食則嘔者胃虛也氣無所逆而間氣則嘔者胃虛也或身

背或食飲微寒即嘔者胃虛也或吞酸或噯腐時苦惡
心兀兀然泛泛然冷嘔靡寧者胃虛也或因病誤治妄
用克伐寒涼本無嘔而致嘔者胃虛也或朝食暮吐暮
食朝吐食入中焦而不化者胃虛也食入下焦而不化
者土母無陽命門虛也凡此虛證必皆宜補是固然矣
然胃本屬土非火不生非煖不化是土寒者即土虛也
土虛者即火虛也故曰脾喜煖而惡寒土惡溼而喜燥
所以東垣脾胃論特著溫補之法蓋特為胃氣而設也

庸可忽哉第在河間則言嘔因胃火是火多實也茲余言嘔因胃寒是寒多虛也一熱一寒若皆失中和之論不知嘔因火者余非言其必無但因火而嘔者少因寒而嘔者多耳因胃實而嘔者少因胃虛而嘔者多耳故不得不有此辨

一虛嘔之治但當以溫胃補脾為主宜人參理中湯為正治或溫胃飲聖术煎參薑飲之類亦可酌用或黃芽丸尤為最妙○若胃口寒甚者宜附子理中湯或四味

回陽飲或一炁丹主之○若虛在陰分水泛為痰而嘔吐者宜金水六君煎虛甚者宜理陰煎或六味回陽飲○若久病胃虛不能納穀者俱當以前法酌治之○若胃氣微虛而兼痰者宜六君子湯主之

一凡中毒而吐者當察其所中者何物蓋中熱毒而吐者宜解以苦寒之劑中陰寒之毒而吐瀉不止者宜解以溫熱之劑若因吐瀉而脾胃致虛者非大加溫補不可○此證有中寒毒吐瀉治按在後當並閱之

實嘔證治 共九條

凡實邪在胃而作嘔者必有所因必有見證若因寒滯者必多疼痛因食滯者必多脹滿因氣逆者必痛脹連於脇肋因火鬱者必煩熱燥渴脈洪而滑因外感者必頭身發熱脈數而緊如無實證實脈而見嘔吐者切不可實邪論治

一寒邪犯胃而作嘔者其證有三○一以食飲寒涼或誤食性寒生冷等物致傷胃氣因而作嘔若果寒滯未

散而兼脹兼痛者宜溫中行滯以大小和中飲神香散
或二陳湯加薑桂之類主之或和胃飲亦佳○一以陰
寒氣令或雨水沙氣及水土寒溼之邪犯胃因而作嘔
作泄若寒滯未散而或脹或痛者宜溫中散寒以平胃
散神香散加減二陳湯除溼湯局方四七湯大七香丸
之類主之○一以風寒外感或傷寒或痰瘧凡邪在少
陽表邪未解而漸次入裏所以外為寒熱內為作嘔蓋
少陽之經下胸中貫膈而然此半表半裏證也治宜解

表散寒以柴陳煎小柴胡湯正柴胡飲之類主之若微嘔微吐者邪在少陽若大嘔大吐者此又邪在陽明胃家病也宜二陳湯或不換金正氣散藿香正氣散之類主之若胃虛兼寒者惟理中湯溫胃飲之類為宜

一飲食傷胃而作嘔者如果留滯未消而兼脹痛等證宜大和中飲排氣飲神香散之類主之或啓脾丸亦可酌用○如食已消而嘔未止者宜溫胃飲主之

一火在中焦而作嘔者必有火證火脈或為熱渴或為

燥煩脈必洪數吐必湧猛形氣聲色必皆壯厲若察其
真有火邪但降其火嘔必自止○火微兼虛者宜外臺
黃芩湯或半夏瀉心湯○火甚者宜抽薪飲或大小分
清飲○若暑熱犯胃多渴多嘔氣虛煩燥而火有不清
者竹葉石膏湯○若熱甚嘔吐不止而火在陽明兼頭
痛者白虎湯或太清飲或六一散○若胃暑嘔吐而火
不甚者宜香薷飲或五物香薷飲○此有胃火治按在
後

一痰飲留於胸中或寒溼在胃水停中脘而作嘔吐者
宜和胃二陳煎苓朮二陳煎或小半夏加茯苓湯橘皮
半夏湯之類皆可酌用

一氣逆作嘔者多因鬱怒致動肝氣胃受肝邪所以作
嘔然胃彊者未必易動而易動者多因胃虛故凡治此
者必當兼顧胃氣宜六君子湯或理中湯主之○若逆
氣未散或多脹滿者宜二陳湯或橘皮半夏湯之類主
之或神香散亦佳