

胎產心法

中卷

李繼鄴

胎產心法卷之中

上谷閻純璽

脉訣歌

欲產之婦脉離經。

一息六至一息三至皆曰離經。又云脉如歇止亦謂之離經。

沉細而

滑也同名。

腎脉沉滑與離經同。

夜半覺痛應分娩。來朝日午定當生。

身重體熱寒又頻。舌下見脉黑且青。捲舌流涎腹覺冷。腹

中子女已歸陰。面赤舌青細尋看。母活子死是定斷。唇口

既青沫又出。母子雙雙入鬼案。面青舌赤沫又頻。母死子

活定知正。新產婦脉緩滑吉。實大弦急死相侵。若得沉而

小者昌。忽若堅牢。命不長。寸口澁疾不調。死。沉細附骨不絕。生。吉凶生死全憑脉。診者須教指下明。

啟蒙曰。欲產之婦。脉離經離經之脉。認分明。其來大小不調勻。或如雀啄。屋漏。應腰疼。腹痛。眼生花。產在須臾。却非病。脉經云。脉勻細易產。大浮緩氣散難產。

保產論

凡妊娠之於分娩。母子性命懸於頃刻。調理失宜。安反成危。將養有方。逆可使順。故凡胎前諸證。當隨證加減。保護調理。甫及臨月。若婦女初產。原未慣經。不免驚畏失錯。雖

憤產之婦。然氣血亦傷。又安得恃爲無虞也。是以保產之方。斷不可廢。故達生散。宜用於八九月之時。而養胎神寢等藥。當用於臨月之際。倘過月不產。則補血行氣之方。不可稍緩。至於居處失宜。頓撲動胎。及身居安逸。食物不節。憂樂不常。致胎氣難轉。或胞漿先破。惡水來多。胎乾不下。則保生千金不換萬全保氣滑胎等劑。猶宜按證選方。製服。予家傳胎產金丹。不特治胎前產後爲第一奇方。卽臨產服之。保生易產。且勝催生諸藥。更無產後諸患。若製此藥。脩用較勝諸藥萬萬矣。至於神煞符咒。亦難謂盡妄。

胎產心法
如受胎之後。胎殺所在。不惟損胎。甚至損母。俱宜謹慎。而
臨月安產。產下藏衣。猶爲緊要。不可不知。至所謂雷公招
搖。運兒力士。天狗等神。方向及生氣方之宜向。禍害月。絕
命方。入床方之宜避。昔人填入產圖。使人知所趨避。似屬
太瑣。若拘拘於圖。又不免避此觸彼之疑。不若體元子之
惜地法。既可以避神煞。又可以消俗疑。因並錄之於後。

達生散 孕婦八九個月時宜服數劑。

人參

陳皮

紫蘂各五分

白芍 酒炒

白朮上炒

當歸酒洗各一錢

炙甘草三分

大腹皮一錢五分用黑豆汁洗晒

黃楊腦

三個即黃楊樹葉稍兒也

葱白三根

水煎服。春加防風五分川芎五分。夏加酒炒黃芩

五分。酒炒黃連五分。五味子十粒。秋加澤瀉五分。

冬加砂仁五分。或通加炒枳殼砂仁。胎動不安加

金銀箔此須野苧根一錢。生地黃一錢。氣上逼心加

柴胡紫蘊。多怒人加炒黃芩佐之。食少者加砂仁

炒神麴。口渴加去心麥冬。酒炒黃芩。能食倍加黃

楊腦

此味瘦胎。若胎瘦不用。

○有痰加薑製半夏炒黃芩。○予按

連生散即紫蘓飲方。去川芎加黃楊腦白朮。又一方

無當歸白芍白朮

密傳連生散 孕至八九個月服之易產奇效

大腹皮 三錢 黑豆水洗淨

人參

紫蘓 連莖葉

陳皮

炙草

砂仁 各五分

白朮 土炒

白芍 酒炒

當歸 酒洗各一錢

枳殼 七分 麩炒

青葱五根水煎食前服。至十餘劑。甚得力。○予謂前達生散不及此方穩妥有效。但大腹皮體輕。此方用三錢。似乎太過。不若依前方一錢五分。或加至二錢。則此方更覺全美矣。

養胎散

宜與神寢丸兼用

當

歸酒洗

川芎

黃

芩

陳皮

白

朮土炒

製香附各一錢

白

芷

甘草各三分

人參七分人虛者倍之

水煎去渣調益元散服。臨產小便多者不宜加益元散

神寢丸

臨月服之易產氣盛者可服素虛者忌用

乳香

香

一兩透明者另研

枳殼

二兩麩炒

爲末煉蜜成丸如梧子大每早溫酒送下三十丸

保生無憂散

臨產服之補其血順其氣自然易產

當歸

酒洗

川芎

芎

白芍

芍

酒炒

枳殼

殼

麩炒

乳香

木香

血餘

右等分。每服二三錢。水煎。日二服。神效。爲末。服三錢亦
可。或胞肥厚。根蒂堅牢者。服之。使其易產。又治小
產。瘀血腹痛。如臨產。胞衣既破。其血已涸。或元氣困
憊。非此藥可治。急用八珍湯。飭許水數碗。煎熟。時飲救
之。亦有得生。

千金不換方 一名保產無憂散

當

歸酒浸

川芎

免絲子 各一錢五分

黃耆 八分、蜜炙

白芍 一錢二分、冬季用一錢、去心

枳殼 六分、麩炒
厚朴 七分、薑汁炒

蘼艾 各五分

荆芥穗 八分
生草 五分

加生薑二片。水二碗。煎八分。空心服。臨產不拘時服。製

度分兩。不可加減。如臨產一二日。覺動履不安。服

一劑。可保無憂。此方屢經試效。

保氣丸 治孕婦居處失宜。頓撲動胎。服此寬氣進

食瘦胎易產

製香附

木香 各四分

山藥 二兩

益智仁 五分

砂仁

粉草 各一兩

紫蘊葉 五分

爲末煉蜜成丸。如梧子大。每服二錢。滾水送下。

滑胎煎 胎氣臨月。宜常服數劑。以便易生。

當歸 三五錢

熟地 三錢

杜仲 鹽水炒斷絲

山藥 炒各二錢

川芎

枳殼 製炒各七分

水二鍾煎八分。食前溫服。如氣體虛弱者。加人參土

炒白朮。隨宜用之。如便實多滯者。加牛膝一二錢。

滑胎散 臨月服之。易產。

人參 八分。如壯實不用。陳皮 七分。

川芎

製香附

黃芩

紫蘇

大腹皮 各八分。墨豆水洗淨。白芍 炒。

白朮 土炒。

當歸 酒洗。各一錢。

砂仁 五分

炙草 三分

加薑三片。葱頭一個。水二鍾。煎八分。溫服。○如冬月。加
麩炒枳殼一錢。○尊生書云。孕婦月足臨產。八珍湯預
服十數劑。最易生育。再無難產之患。

家傳胎產金丹 治婦人經水不調。諸虛百損。種

子安胎。及胎前產後諸證。應效如神。

當歸 酒洗

丹皮 水洗。晒乾。勿見火。

蘄艾 醋煮

延胡索 酒拌。炒乾。

川芎

益母草 取上頭半截。童便浸。晒乾。

預服易產諸方

七

青

蒿

人多內熱者更宜、不

白

薇

洗淨、入乳拌、

人

參

赤石脂

火煨、水飛亦可

白茯苓

川藁本

洗淨

白

朮

土炒、各二兩、

生

地

酒洗、煮、不犯鐵器、

鱉

甲

醋炙、各四兩、

香

附

共四兩、醋、酒、鹽、童便、各浸製一兩

桂

心

沒

藥

去油

粉

草

酒炒、各一兩二錢、

北

五味

一兩、去梗、焙、

沉

香

六錢、

以上共爲細末。再用新鮮頭次男胎紫河車一具。長流

水浸半日。洗淨。黑鉛打成大鉛礮一個。將河車放在鉛礮內。再將黃柏四兩。放在河車下。加白酒娘二觔。清水二碗。灌滿鉛礮。仍以鉛化封口。再以鐵鍋盛水。將鉛礮懸在鍋內。煮兩日夜。爲度。取出搗爛。和入藥內。拌勻。晒乾。再研爲末。煉蜜丸。彈子大。每九重。三錢五分。水飛硃砂爲衣。再以黃蠟爲皮。如蠟丸式收貯。治證開後。

一婦人臨產。米湯化服一丸。助精神氣力。分娩順利。
一產下。童便好酒服一丸。神清體健。再無崩暈之患。
一產後。每日服一丸。服過五日。氣血完固。自無他病。

一行經後川芎當歸湯服一丸服之三日必然有孕
一苦於小產者胎動欲產白滾湯服一丸睡半日其
胎自安每月常服二三丸保全足月分娩無憂。

一產後血崩童便好酒服一丸卽止

一產後血暈者當歸川芎湯服一丸卽醒

一產後驚風防風湯服一丸卽解。

一兒枕痛者山查炒黑砂糖湯服一丸卽止

一胞衣不下乾薑炒黑煎湯服一丸卽下。

一產後虛怯者川芎當歸湯每日服一丸十丸全愈。