

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

備急千金要方卷五十一

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

肺癰方

肺癰方

肺癰第六

曰寸口脈數

曰寸口脈數

曰寸口脈數

其入病

其入病

其入病

及有濁唾涎沫出何也

師曰病熱在上焦因欬

師曰病熱在上焦因欬

肺癰者從風寒濕氣鬱結而成也

便難數被駛藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發太陽脉早索陰脉不澀三焦踟躕入而不出陰脉不澀身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜下如脉腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬出乾沫久久小便不利其脉平弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欲唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

甘草乾薑湯溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩
不渴不欬若渴者屬瘕渴法上虛下不能制溲服此湯已小溫
覆之方

甘草四兩

乾薑二兩集驗肘後有大棗十二枚

右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分二服

甘草湯治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方千金翼名溫液

湯

甘草二兩㕮咀以水三升煮取一升半去滓分三服

生薑甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方

生薑

五兩

甘草

四兩

人參

三兩

大棗

十二枚

右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

桂枝皂莢湯治肺痿吐涎沫不止方

去芍藥加皂莢

桂枝

生薑

各三兩

甘草

二兩

皂莢

一兩

大棗

十五枚

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

麻黃湯治肺脹欬而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水

方

麻黃

芍藥

生薑

仲景用乾薑

細辛

桂心

各三兩

半夏

五味子

各半升

石膏

四兩

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

仲景名此為小青龍

加石膏湯用甘草三兩為九味

肺癰第七

論方

論曰病欬唾膿血其脉數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿若口中

辟辟燥欬即胸中隐隐痛脉反滑數此為肺癰也問曰
病者欬逆師脉之何以知為肺癰當有膿血吐之則死
後竟吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數
微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼
氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍
於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振
寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救
膿已成則難治寸口脉數趺陽脉緊寒熱相搏故振寒

而欬跌陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者為肺癰其脉數欬唾有膿血設膿未成其脉自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯治欬胸中滿而振寒脉數咽乾而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是為肺癰者方

桔梗

三兩集驗用二兩
古今錄驗用一兩

甘草

二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升去滓分二服必吐

膿血也

一方有款冬
花一兩半

瀉肺湯治肺癰喘不得臥方

葶藶

三兩
為末

大棗

二十
枚

右二味先以水三升煮棗取二升去棗內藥一棗大

煎取七合頓服令盡三日服一劑可至三四劑治肺

癰胸脇脹一身面目浮腫鼻塞涕出不聞香臭欬

逆上氣喘鳴迫塞未進此方宜先服小青龍湯却服前藥其青龍湯方在十八卷

黃昏湯治欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰者方

黃昏手掌大一片是合昏皮也咬咀以水三升煮取一升分二服

又方

薏苡仁

瓜瓣半升

桃仁五十枚

葦莖

切二升水二斗煮取五升去滓

右四味㕮咀內葦汁中煮取二升服一升當有所見
吐膿血

飛尸鬼症第八

論方
灸法

論曰凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但益氣
息急者此尸症病也宜先服甘草汁一升消息少時服
瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及女
人血堅痛發作無定者神良

五疰湯治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黃

甘草各三兩

當歸

芍藥各二兩

烏頭十枚

生薑

蜜各一斤

桂心四兩

右八味咬咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別

內蜜中煎令得一升拌湯中去滓分服三合如人行

三十里久更進一服日三不止加至四合

蜈蚣湯治惡症邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣一枚

牛黃一分

大黃二兩

丹砂

人參各三分

細辛

鬼臼

當歸

桂心

乾薑各一兩

黃芩

麝香各半兩

附子

四枚

右十三味咬咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃麝

香分三服

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無

時搶心胸滿脇痛如刀刺口噤者方

甘草

乾薑

茯苓

乾地黃

羊脂

當歸

細辛

各一兩

芍藥

吳茱萸

桂心

各二兩

梔子仁

十五枚

右十一味咬咀以水八升煮取三升去滓內脂烱盡

分三服欲利者加大黃三兩

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛者方

乾地黄

茯苓

芎藭

當歸

甘草

各一兩

吳茱萸

桂心

乾薑

芍藥

各二兩

梔子仁

十四枚

右十味㕮咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加

羊脂三兩當歸人參芍藥各一兩心腹堅急加大黃

三兩

桃皮湯治中惡氣心腹痛胸脇脹滿短氣方

桃白皮

一握東引者

真珠

附子

各一兩

梔子仁

十四枚 當歸三兩

吳茱萸

豉

各五合

桂心

二兩

右八味㕮咀以水五升煮取二升去滓內真珠末分

作二服一方無當歸以下四味

桃奴湯治中惡諸尸蠱症心腹卒絞痛方

桃奴

當歸

人參

乾薑

各二兩

芎藭

甘草

各三兩

丹砂

麝香

茯苓

犀角

鬼箭羽

桂心

各一兩

右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分二服

未食服大便不通腹滿者加大黃三兩芒硝二兩

治胡

有雄黃一兩
無丹砂芎藭