

痧脹玉衡書

卷二
三

痧脹玉衡全書卷之二

橋李郭志遠右陶著

徧身腫脹痧

痧者暑熱時疫惡毒之氣攻於裡則爲痰喘爲血瘀昏迷沉重。不省人事。若元氣壯實內不受邪不入於裡卽散其毒於肌膚。血肉之表爲腫爲脹。若誤飲熱湯熱酒便成大害。此痧之暗者。宜從脉異處辨之。

治驗

一翰黃聞兄一婢久生瘡患腹大如臑手足俱腫延余診之。左脉微數右脉或時歇指余思瘡毒入內作腫作脹其脉必然洪數有力方見脉症相對乃可治其瘡毒。今左脉洪數右

脉歇指脉症不合必慢痧爲患也。視其腿灣果有痧筋青色。刺五針紫黑毒血流之如注未愈。又刺指頭毒血二十針。用寶花散併付桃仁紅花湯入服。服後腫脹俱消如舊。

一翰黃聞兄長女手足俱腫。將逮於腹。延余診之。六脉弦細。沉遲。知其爲慢痧之變症也。云宜先放其痧。緣畏刺不放。余辭不用藥。恐藥氣稍冷不能治。及於血肉之分也。越六日。腫脹益甚。復延余治。令其僕婦爲主女放痧三十餘針。紫黑毒血已出。用寶花散稍冷服之。併用散痧解毒消痧順氣之劑。治之。以其痧久綿延難於速效。計服二十四劑。方得腫脹俱消。安平如舊。

一賈峰青徧身腫脹。服藥不應。延余治之。余見心口將平。臍

有青筋。余曰。危哉。診脉無根。殆不可療。然視其指上。腿灣青筋交現。刺出毒血甚多。彼又謂痧症不當服藥。遂已。後至二月餘。終成真臟而死。惜哉。

一余隣許姓者。有子四歲。頭面胸腹手足徧身俱腫脹。紅色。頭汗如珠。不絕。求余診視。兩關兩尺皆洪大滑實。兩寸厥厥動搖。此傷食之痧。感於脾經。故徧身肌肉腫脹。及看其痧筋不現。刮痧不起。此因誤飲熱湯。痧氣內攻。壅塞衝心。故徧身作腫作脹。惟衝心。心臟不受其害。故上干頭面。化而爲汗。出之如珠。皆心液也。用紫樸湯加大黃丸。微冷飲之。脹消汗止而愈。

悶痧

痧毒衝心發暈悶地。一似中暑中風。人不知覺。卽時而斃。此痧之急者。如略有甦醒。扶起放痧不愈。審脉服藥施治。如發暈不醒。扶之不能起。必須審脉辨症的確。果係何因。先用藥數劑灌醒。然後扶起放痧。漸爲調治。

治驗

一汪君美內室。六月間發暈昏迷。延余診之。兩寸芤而散。餘脉如常。但重按之時。見歇指。此暑熱穢氣觸犯心經之痧也。扶之不起。先用寶花散。薄荷湯。併藿香湯。令服稍醒。扶刺出毒血三針。不愈。用沉香阿魏丸。薄荷湯微冷飲之。漸安。後用四物湯調理而愈。

落弓痧

倏忽昏迷不醒或痰喘不已。眼目上吊。形如小兒落弓之症。此暗痧難識。必須審脉辨症。的是痧毒。看其身體涼熱。唇舌潤燥。何如。然後治之。

治驗

一盛洪烈子。九月間發熱口渴。昏悶不醒。兩目上翻。延余診視。六脉微細而伏。先用寶花散。加砂仁湯。冷下而甦。扶起放痧十二針。去紫黑毒血。用救苦丹。併細辛大黃丸。加砂仁湯。稍冷下。又用防風散痧湯。加金銀花丹。參山查。葡萄子而痊。一陳公玉。八月間。時當身熱。口中微渴。煎滾茶飲之。倏然沉重。昏迷不醒。余診之。左尺沉細動止不勻。右寸脉浮而芤。此腎虛而痧犯之。腎水之痧。逆行干母肺金。故痰氣壅盛而發。

暈也用獨活紅花湯入貝母牛膝同煎加童便飲之更進圓紅散而醒然後扶起放痧二日後痧氣清用補中益氣湯六味地黃丸調理而痊

噤口痧

默默不語語亦無聲形如啞子此乃痧氣壅盛熱痰上升阻逆氣管故咽喉閉塞而然治宜先放其痧審其肺腎脾三經之脉爲要然後推詳餘經之脉則知病之所本矣

治驗

一吳子瑞一女十一月間忽然痧脹心中煩悶昏沉不語子瑞善放痧稍醒語更終日無聲余診之左關有力右脉沉伏傷氣之痧也此文曰爲後母所詈故有此變用陳香圓一隻

煎湯微冷飲之。稍有聲焉。未愈。次日左脉弦長而動。余曰。怒氣傷肝。痧氣猶阻於肝經之故。刺腿灣紫筋三針。血流如注。又刺頂心。臂指二十餘針焉。乃用三香散。陳皮厚樸湯。加延胡索。香附。溫飲之。乃痊。

心胸脹極。痧毒內攻。故頭頂向上。形如角弓反張。是臟腑已壞。死症也。不可以治。

撲驚痧

痰涎壅盛。氣急發喘。喉聲如鋸。痛若喉驚。但喉驚之症。喉內腫脹。若痧則有如喉鵝之痛。而無鵝喉之腫脹。又形若急喉風。但喉風之症。痛而不移。若痧則痛無一定。且痧有痧筋。喉鵝無痧筋。此可辨也。

治驗

一施襲先。痰氣壅盛。吹弔痰藥。益凶暴痛極。余診之。脉多怪異。此三焦命門之痧也。關臂指筋刺十一針。腿灣青筋刺三針。出紫黑毒血甚多。不愈。用沉香鬱金散救苦丹清茶冷飲之外。吹冰硼散。又用荊芥銀花湯微冷飲之。三劑而愈。一周龍生。喉痛之極。痰涎壅盛。延余。余曰。痧也不信。飲熱湯至夕而殂。

傷風咳嗽痧

痧從時氣所感。因而咳嗽。肺經受傷。不可以傷風治之。蓋傷風以疏風爲主。若痧則純乎疏風。非其所宜。當刮痧爲先。宜清喉順氣。涼肺散痧爲主。若專重疏風。縱非緊痧急症。亦必咳嗽日

甚纏綿不已。勞嗽等症。由此而成。慎之慎之。

治驗

一徐茂公。傷風咳嗽。日晡微寒發熱。余診之。右寸脉浮而芤。餘脉虛而無力。時氣所感肺經之痧也。其弟爲之放痧刮痧。稍可。不服藥。至十餘日。咳嗽不止。余用射干梔荅湯。加前胡山豆根。稍冷飲之。漸愈。

痘前痧脹

痘本先天。因時而發。必由外感。至如痧者。亦時疫之氣所感。作腫作痛。而胎元之毒。因之俱發。凡痘未見點之前。痧脹必心膈煩悶。痰涎壅塞。甚至昏迷沉重。不省人事。此其候也。其小兒滑疾之脉。類於痧症。厥厥動搖之脉。雖若疑似難明。然痧有痧筋。

可辨宜先刺出毒血而後用藥清理之則痧自退痘自起矣若痘點既形觸穢痘隱者諸痘科自悉不贅

治驗

一夏子亮幼子五月發熱痰喘氣急四肢戰動兩目無神不省人事口熱如爐面有隱隱紅紫細點延余看痘閱其腿灣有紫筋兩條余曰兩目無神四肢戰動痘之候也隱隱微點痘之形也口熱如爐紅紫之色熱之盛也但是痰喘氣急有腿灣紫筋兩條必痘因痧脹而發治宜先放其痧後發其痘則痘自起用針刺出毒血隨用荊芥連翹防風紅花青皮桔梗枳殼山查荀子一劑俟稍冷飲之其痘卽發至十二朝乃痊

痘後痧脹

痘後中氣多虛。有感必傷。尤宜防護。常有小兒痘後收靨脫痧。安然無事。一遇暑熱所侵。或穢惡所觸。卽成痧脹。往往有忽然生變。人多認爲惡痘所致。卽痘科任事者。亦以爲然。竟不知其痧之爲害有如斯也。

治驗

一胡丹辰子七歲。八月出痘。脫痧光潔。飲食如常。行步如舊。迨二十五朝。忽然叫喊不已。發暈欲死。皆以爲惡痘餘毒使然。求余治之。左右手六部俱微細。而伏余思惡痘餘毒兆變。脉當沉緊有力。今微細而伏。若此。脉症不合。視其痧筋。歷歷可指。刺出紫黑毒血。不愈。用荊芥銀花湯。合和脾宣化飲。稍

令飲之。卽甦。後小腹痛。變爲痢疾。用當歸五錢。山查一錢。熟大黃五分。加童便微溫飲之。稍安後。獨用當歸山查四劑而痊。

一張可久。女十五歲。痘後三十二朝。忽然發暈。沉重不能轉側。延余診治。右脉微細。左脉洪大。時一歇。指視其指頭黑色。青筋歷歷。刺山毒血不愈。用降香桃花散。合枳實大黃湯。稍冷飲之。不愈。用三香丸。微溫服而痊。後傷食爲穢氣所觸。腹痛刮痧。服稜朮湯。加明礬二分。微冷飲而安。

胎前產後痧

孕婦之痧。最易傷胎。產後之痧。須防惡阻。較之平人。更甚當急爲救療。庶於痧毒未攻壞臟腑之時。可以施治。若屬暗痧。發於

此時胎前痧脉。溷於可孕。產後痧脉。雜於惡阻。又無心腹痛。據痧從暗發。須當究其症候。察其聲色。看有痧筋。急宜刺破。肌膚痧癰。尤重油鹽。至若痧毒橫行。肆攻臟腑。莫可挽回。慎毋草草以誤人也。

治驗

一趙方亨內室。懷娠六月。寒熱交作。煩悶不安。延余時。痧在始發。脉固未現。初不覺其爲痧。用藥不應。忽爾昏沉。次日余診左手脉伏。面目微黑。乃刺其痧。刺腿灣青筋六針。出毒血少愈。用桑寄生。紅花香附。益母草。荊芥。細辛。葡萄子。神麴。冲砂仁。未微冷服而安。後用小柴胡湯退熱。又參苓歸地。健脾養血。乃痊。

胎前痧痛論

胎前痧痛。毒氣攻胎。尙懼胎孕絞動。傷胎殞命。况痧有毒。血攻衝胎。孕嬌嫩。決難安靜。至如安胎。用白朮當歸扶苓之類。痧所大禁。若一悞用。立時痧脹凶危。其痧脹所宜。惟是破血破氣之劑。又胎孕所忌。愚嘗斟酌其間。若刮痧放痧不愈。必欲活血解毒。用金銀花丹參益母草紅花桑寄生消瘀而不損胎元。順氣用香附陳皮紫樸砂仁烏藥行氣而不傷胎氣。散痧用荊芥防風獨活細辛透竅而不動胎孕。消食積用山查葡萄子神麴麥芽寬中而不伐胎性。採擇於中。最爲穩當。然痧毒勢盛。此等之藥。難於速效。或權用一二味克伐。又恐於胎有害。此予所以反覆而不敢輕任也。

產後痧痛論

產後用藥必須溫煖。痧脹用藥惟重清涼。此症屬相反處治之方。母執產後一於溫煖。亦母執痧脹一於清涼也。愚嘗遇此等症。竊以爲消瘀破血之藥。雖用其餘有不可通用者。是以製就一方。爲臨症之法。散痧用獨活細辛。破血用桃仁紅花。順氣用香附烏藥。陳皮解毒。用金銀花紫花地丁。消食用山楂。荀子神麴麥芽。如產後利用姜灰肉桂以溫血。痧症所大禁。痧症利用荊芥防風以散痧。連翹薄荷以清熱。產後所不宜。況痧症脹極尤重大黃枳實枳榔以通其積滯。而產後之藥更不可不禁。恐用此傷產後之氣分也。且產婦服藥宜溫。痧症服藥宜冷。若痧而用溫脹者益脹。產而用冷。痧者益痧。故予臨症惟取微溫之

氣則既無害產後而亦無助痧禍若痧更凶極微溫之氣難於制治加童便以清熱消瘀產後痧症俱得其宜矣

治驗

一顧月溪內室產後三日腹中絞痛脹大如臑惡露不通延余診之余思產婦腹痛當在小腹大腹脹痛亦僅微疼今產婦大腹絞痛異常非產婦本症及按脉洪數有力余曰此產後兼痧脹也當取痧筋驗之不信漫服產後藥益覺昏迷不醒復求余治勢已危極痧筋不現先取童便一杯飲之少甦閱十指筋刺出紫黑毒血二十一針然後扶起放腿灣痧六針絞痛稍定用獨活紅花湯微溫服之迨痧毒消盡脹痛盡止惡露俱通後調補乃痊