

瘍醫大全



瘍醫大全卷九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

瘡錢之相東陽男攝變用和同校

論辨膿法

李東垣曰夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法即當辨膿生熟淺深不可妄開視之可否不至於危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿也非也必有水也以手掩其上大熱者膿成而自軟也若其薄皮剝起者膿成也其腫不甚熱者膿未成也十書

經曰膿血交粘用藥可全色鮮紅活腐肉易脫氣敗血衰神仙數哉

齊氏曰若發腫都軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所為也留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰者必多感瘤

伍氏曰瘡腫赤色按之色不變者此膿已成也按之隨手赤色者其亦有膿也按之白色良久方赤者此遊毒已息可就赤白盡處灸斷赤腫自消凡以手按之若牢韌未有膿也若半軟半韌已有膿也又按腫上下不熱者為無膿熱甚者為有膿宜急破之

澄曰凡腫瘍按之軟陷隨手起者為有膿按之堅硬雖按之有凹不即隨手起者為膿尚未成不可輕易決破又曰凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處即復者有膿按之不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟者有膿也又以手按上下不熱者無膿若熱者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也用諸拔毒之藥敷散四圍堅中間軟者此為有膿也一邊軟亦可有膿都堅硬者此為惡核或有氣也都軟者此為有血或

血瘤也當審堅硬虛實為要若堅疽積久後若更變熱中有軟處當軟處切不可針破也軟疽者只溫煖裏衣置之耳若針灸刺破不可療矣

論開口除膿法

程山齡曰凡治癰疽口小膿多則膿不出或出而不盡或薄膿可出或硬膿難出以致瘀不出而新不生延綿難愈法當爛開大口俾瘀膿多出為善其爛藥烏金散最佳瘀肉能去不傷新肉且不甚焮痛為至妙也若有膿管以棉紙捻裹藥紐入頻換數條即化祛耳亦有頑硬之極非烏金膏所能去者則用白降丹或化腐紫雲膏搽之然終不及烏金膏為至穩

十法

李東垣曰夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將為膿留於節腠必將為敗蓋瘡疽膿爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣不出疼痛難忍者所以立追蝕膿之方法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡紐之血出不止者則未可紐當於瘡上搽追蝕之藥待其熟可紐方紐若其瘡紐之痛應心根者亦不可強紐之誤觸其瘡其焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡瘍膿成未破於上薄皮剝起者即當用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取效如神矣

十書

竇漢卿曰凡瘡瘍之起疼痛固屬於心火久而陽氣升上蒸肉化而為膿若不三思原其膿之有無遽而開刀則鮮血突出膿從何來致患者前寒發熱日夜疼痛無法可止必先將指頭按患上隨手而起四畔悉軟觀其頭聚擇尻神不犯吉日將刀頭向上開之方不致傷新肉取出刀再搽綿紙條潤油度之使膿水齊會半日拉出則膿水易乾外貼膏藥四圍敷藥

全書

論吸膿法

陳實功曰古之良醫有好生之德以口吮膿後世人漸嫌穢每多重手強擠致患者狼狽不堪或因循聽其自潰膿毒不得外發必致內攻乃生煩躁重如負石非用藥筒拔提內蓄之膿毒氣終難外泄也法預用徑口一寸二三分新鮮嫩竹一段長七寸一頭留節用刀刻去外青留內白一半約厚分許靠節鑽一小孔以杉木條緊塞將羌活獨活紫蘇蘆薈鮮菖蒲白芷甘草各五錢連鬚葱二兩灌入筒內筒口用葱塞之將筒橫放鍋內以物壓住勿得浮起用清水十大碗湔筒者數滾約內藥濃熟為度候用再用披針於瘡頂上一寸內品字放開三孔深入淺寸約在筒圈內將藥筒連湯大磁鉢盛貯患者榻前將筒藥倒出急用筒口乘熱對瘡合上以手捺緊自然吸住約待片時藥筒已溫拔去塞孔木條其筒自脫將器倒出筒中物色看其何樣如有膿血相粘鮮明紅黃之色亦有一二杯許此是活瘡治必終愈如拔出物色純是敗血氣穢紫黑稀水而無膿意相粘者其人氣血內敗肌肉不活必是死瘡強治亦無功矣此法家傳屢經有驗如陽瘡易潰易膿之證不必用此以傷氣血此法陰瘡之用要在十五日前後堅硬不潰不膿者行之最當此法前有回天之效醫家真不可缺也

正宗

論膿熟不宜開遲

薛立齋曰凡瘡瘍有膿之際乃肉腐而為膿是毒氣侵蝕而潰也若不速去之恐毒氣蓄而侵潰好肉如肘膝樞紐關節之所筋骨壞廢疾成也有等畏針之徒多致不救或密針之或以賽針散即透出膿極妙

汪省之曰夫癰疽瘡瘍皆由氣血壅滯而生當推虛實表裏而早治之可以內消此內消之法宜早治也若毒氣已結者勿泥內消之法當辨膿之有無深淺急宜酌量刺之緩而不刺毒則內攻穿通

臟腑腐爛筋骨可不慎哉若脈緊為膿未成緊去但數為膿已成以手按之熱者有膿不熱無膿按之牢硬未有膿按之半軟半硬已有膿大軟方是膿成若大按之痛者膿深按之不甚痛者膿未成按之即復痛者為有膿不復痛者無膿薄皮剝起者膿淺皮色不變不高阜者膿深淺者宜砭深者宜針手足指梢及乳必候膿大軟方可開放若夫麻痘之後餘毒未盡肢節有癰稍覺有膿使用決破遲則成彎曲之疾矣

理例

論內托法

汪省之曰凡癰疽或已成氣血虛者邪氣深者邪氣散漫不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不軟或雖得膿而根脚紅腫開大皆氣血虛邪氣盛兼以六淫之邪變生諸證必用內托令其毒熱出於肌表則易愈也內托以補藥為主活血驅邪之藥為臣或以芳香之藥行其鬱滯或以溫熱之藥禦其風寒

理例

周文彩曰夫托者起也上也癰毒之法外之內者邪必攻內自然之理當用托裏湯液加升麻銀花使榮衛通行血脈調和瘡毒消散故云瘡家無一日不托裏也

啓立

王肯堂曰癰疽已成大抵托裏消毒散托裏散小托裏散十宣散皆為要藥但用隨時加減耳如冬月並氣滯之人五香連翹湯虛弱人去大黃素不宜寒藥者小五香湯形脈膿色稠不可用補藥者忍冬丸之類大膿出敗肉去紅腫消當用人參黃耆當歸白朮大劑補之令氣血滋茂新肉易生也

準繩

薛新甫曰有隨證加減用藥例以托裏消毒為主誠內托之良法

癰疽已成門主方

七味活命飲

秘傳

一切癰疽氣血虛憊白濁下陷立可紅活

生黃芪

川芎

各三錢金銀花

蒲公英

英

各一兩

當歸

八錢穿山甲

皂角

針各一錢五分

作一劑水三觔砂鍋內煎一半熟服避風取汗靜臥

自潰

透膿散

正

潰頂排膿提法

金銀花

當歸

各五錢

生黃芪

四錢白芷

牛蒡子

川芎

穿山甲

皂針

各一錢

酒水全煎服瘡上宜覆煖

瓜萸托裏湯

正

跌撲傷損腫痛積久欲潰或氣血鬱結瘀停血壅致成瘡瘍未成即消已成自潰

生肌解毒

瓜萸

各一兩

金銀花

各一兩

蘇木

各五錢

丁香

甘草

節

沒藥

去油各二錢

日服盡渣焙為末酒糊丸彈子大當歸酒化下

回陽三建湯

正

陰疽發背初起不痛不腫不熱不紅硬若牛皮堅如頑石十日外脈細身涼肢體

倦怠皮如蠶甲色似土硃粟頂多生孔孔流血根脚平散軟陷無膿又皮不作腐手熟足涼者俱

急服之

人參

熟附子

川芎

白茯苓

當歸

枸杞子

陳皮

山萸肉

黃芪

各一錢

廣木香

紫草

茅蒼朮

獨活

鮮紅花

厚樸

炙甘草

各五錢

煨薑

三片皂角

樹根上白

皮二錢水二碗煎八分入酒一杯隨病上下食前服之用綿帛蓋煖瘡上預先不得大開瘡孔

走泄元氣為要

澄按背瘡屬陰者皆由臟腑先壞而內毒不得發越於外也當急救之遲則無濟矣

散寒救陰至聖丹

岐天師

生黃芪

人參

金銀花

各三錢

當歸

白芥子

二錢附子

三錢水煎服

二劑即愈不須多服

牛膠飲

截險處癰疽惡瘡使毒不攻於內不傳惡證上好牛皮膠四兩用酒一碗納膠重湯燉

攪勻傾出更浸酒隨意飲盡出汗若善飲者以醉為度此法活人甚多

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

癰疽已成方

遠志酒韓大夫家此方教人極眾一切癰疽發背惡毒有死血陰毒在中則不痛用之內服外敷則痛有憂惡

等氣積而內攻則痛不可近用之內服外敷則不痛或蘊熱在內壯熱手不可近用之內服外敷

即清涼或氣虛血冷潰而不斂七情內鬱不問虛實並效 遠志未泔浸洗去心 磨細蜜貼每用酒一

盞調藥三錢遲頃澄清飲之以渣敷病處

內托榮衛湯 黃芪錢五 防風 連翹 柴胡 紅花錢各二 羌活 甘草 人參 黃芩 蒼朮錢各一

當歸錢五分 桂枝分八 右剉分二服酒水各二盞煎八分溫服

二仙散黃賓江 發背癰疽未成已成已潰未潰痛不可忍者 白芷未潰用一兩已潰用五錢 貝母未潰用五錢已潰用一兩

作一劑水酒全煎服

琥珀蠟礬丸宗正 癰疽已成未潰之際恐毒氣不能外出必致內攻預服此丸護心護膜散血解毒生

明礬二錢雄黃 硃砂各一錢 琥珀一錢全 研細用黃蠟一兩蜂蜜二錢銅杓內熔化離

火片時候蠟四邊稍凝時方入上藥攪勻共成一塊用入將藥火上微烘衆手急丸小寒豆大以

硃砂為衣磁罐收貯每服二三十九丸白湯食後送下病甚者早晚日進二次其功最效有用黃蠟

一兩為丸亦名蠟礬丸如桐子大每服五十七丸食前酒下未破即消已破即合有種過身生

瘡狀如蛇頭服之立效蓋心為君主之官不易受邪凡癰疽及蛇犬所傷毒上攻心則命立傾此

秘授蠟礬丸淮安楊秘 有定痛生肌化膿厚膜解毒去穢之功 黃蠟 白礬名胡桃大塊研 銀硃錢一 蛇脫

瓦焙研 先將蠟礬化入蜂蜜少許再下生礬蛇脫銀硃研末攪勻將銅杓放滾水內急手丸

如桐子大如遇患者先令洗浴飲熱酒數杯初服二十一丸儘量飲醉被蓋取汗初起即消已成

痃痛不可忍者服之可止一半已潰服之必出稠厚黃膿看人虛實與服頭一日服二十一丸第

二日只服十九丸逐日遞減兩丸服至一丸為止奇效如神

透膿散 諸癰疽瘡及貼骨癰不破者不必用刀針以藥服之不移時其膿自透屢驗 蛾口繭子

一枚存性研末 酒調服只用一枚不可多用如誤用二三枚即出兩三個頭慎之

透膿法 黃蠟熔化乘熱熬如大麥稈兩頭俱要失用酒或白湯吞服一粒其頭自破

至驗金針散 唐 治癰疽瘡腫已破未破用之直達潰所 春月取皂角針不拘多少半青半黑的

灰火內炮乾為末看瘡上下分食前後服之每服二三錢好酒調服取汗為度 如瘡在頭頂者

用樹梢上的如背癰取樹身上向陽處的如便毒懸癰取樹材內的此取象之義即有所歸附焉

護心丹 正 患井疽宜多用他證亦宜 菜豆粉 二 乳香 去油 炙甘草 五 辰砂 二 錢 乳細白湯調

服三錢 唐 示吉照本方加遠志肉甘草水

護心丹 李嗣 凡癰疽三日內宜連進十服方可變證使毒氣外出稍遲內攻漸生吐嘔或鼻生瘡

菌不食則危矣五日後亦宜用 真菜豆粉 一 乳香 去油燈心灰 用生甘草濃煎湯調下一錢

時時呷之若毒氣衝心有嘔吐之證者大宜服此 腫毒服至一二次生瘡瘡孔中真聖藥也

論補法

周文采曰經云虛者補之凡癰疽已成不分部位但根脚散漫頂不高尖氣虛補氣血虛補血加銀

花甘草節白芷桂心等藥使頂自高尖根稟收束易潰易膿如已潰之後膿血出多則當峻補氣血

庶易於收口也

論桑木灸法

陳實功曰凡瘡破已久膿血多出氣血衰破不能得愈者十常八九又因色慾令瘡腐而多生歹肉

存而不長新肉以敗肉滑而時出清水亦有不得其治法雖數歲不能愈者內宜服補中益氣加托毒藥外以藥水洗淨而桑條晒乾一頭燒著吹滅熅以火在於瘡口稍遠灸之勿令痛亦不可太遠遠則無益灸令熱而微癢為妙日灸數次亦不為多灸後少刻以長肉生肌膏貼方能取效神速也

論神妙拔根法

陳實功曰凡腦疽發背陰證初起不腫高不焮熱灸不疼其病將來難治必致壞人十日以前用拔針當頂插入知痛處方止隨用蟾酥條插至孔底每日二條膏蓋三日後加添插藥其根高腫作疼外用神燈照法助陰為陽插照七日其瘡裂縫流膿至十三日其根自脫如日多根深蒂固不能脫者拔針取之內用玉紅膏不脫者自脫不斂者自斂此法百人百活再無不愈者哉

正宗

論瘡瘍去腐肉法

薛立齋曰夫瘡瘍之證膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫丹溪云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣為主使根本堅固而行經活血佐之令其肉消余常治脈證虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不死脈證實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內因氣血虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散已成自潰又何死肉之有若不大痛或木痛或不赤或內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛弱宜用桑枝灸及十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐其毒自解又何待於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍加白朮壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死者自潰已潰者自斂若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰證急用參附湯溫補回陽亦有可生

寶漢卿曰凡取腐肉先用豬蹄湯洗淨以去其垢方見新舊之肉看其果腐爛者用鉤摘定輕手徐

徐忍臬臬割之切不可誤傷新肉以致鮮血淋漓切勿急驟多加工夫割取畢上靈藥外用膏貼明日如有未盡之腐仍照法去之全書

論死肉當去

申斗垣曰凡癰疽杖毒及楊梅結毒癰瘡便毒疔瘡等內多有死肉停蝕好肉苦痛難禁若不早去愈如腐爛正謂之惡如狼虎毒似蛇蝎有傷性命恐致不救當視其緩急死肉大小或以針刀割去緩以腐肉錠子或未藥膏藥貼之以平為期後上生肌長肉等藥上之內服大補湯丸等劑而愈世多庸俗只知敷貼長肉生肌等藥為神殊不知有死肉為害反加腐爛是也如去不淨亦不能得愈宜熟玩之啓玄

論湯洗法

程山齡曰煎好猪蹄湯絹片搥去渣俟湯半溫再用方盤盛湯安放瘡下隨以軟絹淋湯瘡上並入孔內輕手捺盡內膿庶敗腐宿膿隨湯而下以淨為度再以軟帛疊成七八重勿令太乾帶湯覆於瘡上以手輕盈旋按片時帛冷再換如此洗六七次自然痛減毒消洗時避風及人口氣十法

馮魯瞻曰夫癰疽已潰日用猪蹄湯洗將愈之際三日一次錦囊

王肯堂曰潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病體自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎綱又曰洗漏瘡當用乾艾作湯投白礬末二三錢洗瘡

口蓋人血氣冷必假艾力以助陽而艾性亦能殺蟲也此瘡漏不可遽合結毒瘡所為之者

陳良甫曰若癰久不合其肉白而膿少者此氣血俱虛不能潮運而瘡口冷澀也每日用艾葉一把煎湯避風熱洗及燒松香烟薰之或用猪蹄湯洗之更以神異膏貼之必須守禁調理否則不効

唐元稹曰凡背瘡腐肉不去不用刀割用降香煎湯不可用手洗將湯入酒壺內淋於瘡上以新羊毛筆掃之拭乾再用巴豆炒黑搗成膏搭數次腐肉自去新肉自生

癰疽湯洗門主方

猪蹄湯正宗治癰疽已潰流膿時用此湯洗消毒氣去惡肉回死肌潤瘡口又能散風消腫腐盡則

已美活當歸 赤芍 黃芩 白芷 甘草 露蜂房各等分猪前蹄一隻右為渣末看瘡疽

大小用藥多少先將猪蹄用白水六碗煮蹄軟為度將汁濾清吹去汁上油花用藥一兩投於汁

中再用微火煎十數沸密絹濾去藥渣候湯半熟將軟絹蘸湯淋於瘡上輕手挹去瘀膿腐肉其

惡物隨湯而下洗訖以絹帛挹乾按法如式次第用藥

防風湯十法防風 白芷 甘草 赤芍 川芎 當歸尾各二錢連鬚葱五根先將雄猪前蹄

煨十數沸吹去浮油濾取三大碗入藥煎熟以絹片蘸湯淋洗其深曲處以新羊毛筆洗之軟絹

拭乾再上丹藥

洗方十法當歸 獨活 白芷 甘草各二錢葱頭五個水三碗煎至藥爛濾清以絹帛蘸湯挹淨

瘡上隨搽貼紅黑二膏洗時切忌風寒為要如背瘡輕淺易治者以此代猪蹄湯其功亦效

洗方 陳冬瓜穰子煎洗

洗藥神硝散集驗專治癰疽潰爛臭穢 蛇床子二兩 研破撲硝兩和勻每用三錢水一碗煎三五沸

通手洗之

癰疽潰瘍門主方

參耆內托散丹溪金銀花五錢黃耆三錢遠志肉甘草湯泡焙炙甘草各五分牡丹皮一錢川芎 陳皮各五

分當歸錢二人參

大棗五枚水煎服

丹溪曰癰疽未潰以疎托解毒為主已潰以托補元氣

為主此二語可為外科樞要

四君子湯 治一切陽虛氣弱脾衰肺損面色枯白飲食少思四肢無力體瘦面黃皮聚毛落脈來

細軟 人參 白朮 炒白茯苓 各二錢 甘草 錢一 薑棗水煎服 脾者萬物之母也肺者氣之母也

飲食減少則營衛無所資養脾主肌肉故體瘦面黃肺主皮毛故皮聚毛落脾肺皆虛故脈來細軟也是方以人參補五臟之元氣白朮補五臟之母氣茯苓致五臟之清氣甘草調五臟之乖氣

四藥皆甘溫得中之味溫得中之氣猶之不偏不倚之君子也展布德澤以行春之令經曰氣主煦之是也夫

四物湯 治一切血虛日晡發熱 生地黃 當歸 酒炒各三錢 白芍藥 錢二 川芎 錢一 水煎服 經曰血

四物皆濡潤之品故為血分主藥地黃甘寒入心腎以沃血之源當歸辛溫入心脾而壯主血攝血之本芍藥酸寒入肝家而斂疎泄之血海川芎陰中之陽可上可下通足三陰而行血中之氣

然吳氏曰失血太多者禁勿與之四物皆陰者天地閉塞之令非所以生萬物者也 本方加牡丹皮山藥白茯苓麥門冬玉竹退虛熱至效

八珍湯 治氣血俱虛惡寒發熱煩燥作渴大便不實飲食不進小腹痛脹眩暈昏憒等證 人參

白茯苓 白朮 生地黃 川芎 白芍藥 當歸 炙甘草 薑棗水煎服 氣為衛屬陽營

身中之兩儀也純用四物則獨陰不長純用四君子則孤陽不生二方合用則氣血有調和之益而陰陽無偏勝之虞矣經曰氣血正平長有天命

十全大補湯 人參 白朮 炒黃芪 熟地 酒炒各二錢 白芍藥 炙甘草 川芎 各八分 當歸 錢一 肉

桂 五分 白茯苓 錢一 水煎服 丹溪曰寔大可謂苓連之屬虛火可補參耆之屬凡人根本受傷

熱補血四君子補氣又加黃芪助陽固表肉桂導火歸原 薛立齋曰飲食勞傷五臟虧損一切

此方乃扶危定傾之大藥 藥為收功保命之金丹

六君子湯 治氣虛脾弱食少痰多 人參 白茯苓 白朮 炒土 廣陳皮 半夏 製熟各二錢 炙甘草 錢一

姜棗水煎服 半夏燥痰治痰之本陳皮利氣泄痰之標標本既得攻補互行補而不滯攻而不

峻故曰六君子經曰壯者氣行則愈怯者著而為病六君子者壯其氣矣氣壯則

升降自如清以奉上濁以歸下尚有何物可停為滯耶
本方加藿香砂仁名香砂六君子湯其用稍峻者矣

香砂六君子湯 理脾化痰溫胃進食止嘔 人參 白朮 白茯苓 製半夏 廣陳皮 藿香

砂仁 炙甘草 姜棗水煎服

藿香正氣湯 散風寒消飲食止嘔吐定瀉痢 白朮 陳皮 半夏 桔梗 砂仁 藿香 蘇

葉 白芷 甘草 白茯苓 厚樸 姜水煎服

六味地黃丸 治腎經不足發熱作渴小便淋秘氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不

固腰膝萎軟自汗盜汗諸血失音水泛為痰血虛煩燥下部瘡瘍足跟作痛等證 熟地黃酒煮

枅山茱萸酒潤去核炒 乾山藥炒黃各 牡丹皮酒洗 白茯苓製 澤瀉酒洗 為末蜜丸如桐

子大空心淡鹽湯下四錢 按腎惡燥脾惡濕補陰藥中多是濕藥腎虛而脾胃壯實者宜若脾

理脾胃不濕不燥于脾腎兩虛者甚得其宜矣 惟此六味丸八味丸及八物腎氣丸專補腎虛藥

故壯水之主以制陽光地黃味厚為陰中之陰補腎填精以為君山茱萸味酸歸肝乙癸同治之義

且腎主閉藏而酸飲之性相宜也山藥味甘歸脾安水之仇故用為臣丹皮亦入肝其用主宣通

所以佐茱萸之溫也茯苓亦入脾其用主通利所以佐山藥之滯也且色白屬金能培肺部又有

虛則補母之義至于澤瀉有三功馬一日利小便以清相火二日行地黃之滯引諸藥速達腎經

三曰有補有瀉無喜攻增氣之虞故用為使此方為益腎之聖藥而味者薄其功緩益用藥者有

四味也主一則地黃非澤瀉則力淺一則地黃非九蒸則不熟一則疑地黃之有功乎

本方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛火動骨痠髓枯王冰所謂壯水之主以制陽光

也尺脈旺者宜之 本方加五味子三兩名都氣丸治勞嗽 本方加五味子二兩麥門冬三兩

名八仙長壽丸再加紫河車一具並治虛損勞熱 本方加杜仲牛膝各二兩治腎虛腰膝酸痛

本方去澤瀉加益智仁三兩治小便頻數

七味地黃丸 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗

發熱 即六味丸加 肉桂一兩 忌火勿出氣 腎水不足虛陽僭上必用此方以引火歸原夫五

性而代之肉桂性熱與火同性雜在下焦壯水為中能引虛火降而歸經且肉桂之質在中半以

下其性專走腎經本乎地者親下之義况相火寄于甲乙之間肝旺則與風動而烈火熾明

古人謂其方不可漏肝瀉即所以瀉腎本相火得母治相火僅可施于壯寒若虛火而誤用之

則腎因瀉而愈虛矣 愈虛而火愈熾矣

八味地黃丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺或

陰盛格陽內真寒而外假熱等證 即七味丸加 熟附子一兩 微火焙 腎有兩枚皆屬于水雖

之別考之內經胎然可覺仙經曰兩個一般無二樣中間一點是真精又曰兩腎中間一點明夫

真精者明也即命門之火也命門乃穴名而其穴在兩腎中間蓋非附子健生之至者不足以成乎坎

而象天之二北也經曰少火生氣命門此方是也化源幾日按脾胃虛寒之至者丹皮澤瀉甚非所

春王太僕曰益火之原以消陰翳此方是也化源幾日按脾胃虛寒之至者丹皮澤瀉甚非所

宜減此二味加牛膝杜仲鹿茸五味子更佳又曰地黃丸專補左尺腎水八味丸兼補右腎相火

少年水虧大旺宜服六味丸老年水虧火旺宜服八味丸況老年腎職真水既虛亦水乘之而為

濕熱以作腰痛足痿痰唾消渴小便不禁淋瀝等證非桂附之溫散而能治之乎

昧者畏其熱殊不知所補之火乃真陽之元也真陽之元一得陰翳之火潛消矣

金匱腎氣丸 治脾腎大虛腰重脚重小便不利肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱證其效如

神 熟地黃四兩 白茯苓三兩 山茱萸去核 乾山藥炒 川牛膝酒炒 車前子微焙 牡丹皮酒洗 澤瀉炒 肉桂去

各二 熟附子錢五 為末蜜丸桐子大空心白湯下王為萬物之母水為萬物之源身中所最重者

故逆行而泛濫于皮膚妄加攻逐禍不旋踵八味丸脾腎要為佐以車前泄

太陰之水佐以牛膝開少陰之竅則小便行而服自己且有益於真元也

八物腎氣丸 平補腎氣堅齒駐顏 熟地兩 山茱萸 山藥各四兩 牡丹皮 澤瀉 白茯苓各三

肉桂去 五味子各一兩 為末蜜丸每用六七十丸空心白湯下

逍遙散 治血虛煩熱肢體疼痛口乾盜汗嗜卧月水不調寒熱如瘧疾嗽骨蒸 白茯苓 白朮

炒當歸 白芍酒炒 柴胡各一錢 甘草五分 薄荷分 煨薑煎服 本方加山梔牡丹皮名加味道遙散

易醫大全 卷九 潰瘍

肝虛則血病歸芍養血而斂陰木盛則土衰木草和中而補土榮胡升陽散熱合芍藥以平肝使木得條達茯苓清熱利濕令心氣安寧煨姜暖胃祛痰能調中解鬱薄荷搜肝瀉肺理血消風諸證自已所以有道達之名

補中益氣湯 人參 白朮 炙黃芪 炙甘草 廣陳皮 升麻 柴胡 當歸身 薑棗引

歸脾湯 治思慮傷脾不能攝血健忘怔忡驚悸不寐心脾作痛嗜卧少食大便不調身痛及盜汗

月經不調 人參 白朮 炒白茯苓 龍眼肉 去酸棗仁 炒各 遠志 去骨當歸身 各一木香 炙甘草

草各五 炙黃芪 五分 薑水煎服 心脾神而生血脾藏意而血不足則健忘怔忡驚悸不寐脾血不足則嗜卧少食

體健肢痛不能統血遂致妄行其則氣鬱而心脾作痛在女則帶下而月經不調滋取參苓著

藉其宜暢調氣舒脾則氣和而血和且平肝可以寔脾而血之散于外者悉歸中州而聽太陰所攝矣故命之曰歸脾湯

理中湯 臟腑中寒四肢強直 人參 炮乾薑 炙甘草 白朮 各等分水煎服

附子理中湯 治脾胃虛寒飲食不化或手足厥冷腸鳴切痛或痰氣不利口舌生瘡或嘔吐泄瀉

等證 即人參理中湯加 熟附子 人有元陽命曰真火此火一衰則不能生土而資生之本大

旺則火足而脾土自能健運經曰氣主煦之又曰寒淫所勝平以辛熱即補火之謂也夫心上腎

下肝左肺右而脾土自能健運居中氣空虛四臟不能相生得此方以理之則萬物之母安而四臟皆得

稟矣故曰理中湯去參朮即名四逆湯為四肢厥者設也

生脈散 生津止渴治熱傷元氣氣短倦怠口乾出汗 人參 錢一 麥門冬 錢二 五味子 分 水煎服 氣

肺臟則金為所制而絕寒水生化之源故氣短倦怠出汗者皆手太陰本證也人參補氣為君所

謂損其肺者益其氣也五味子酸斂能收肺家耗散之金麥門冬甘寒潤肺金燥枯之液三者皆

扶其不勝使火邪不能為害也司天屬火之年時令燥熱之際尤為至要之藥

參苓白朮散 健脾養脾 人參 去廣陳皮 砂仁 各一 白茯苓 蒸二 白朮 四 砂扁豆 山藥 薏

苡仁 蓮子肉 各三 神麴 炙甘草 各五 磨細每服三錢白湯調服

乳香黃芪湯 治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗腐膿毒不假

刀砭其惡肉自然脫下並治跌打損傷筋骨疼痛 人參 白芍 沒藥去油當歸 乳香去油黃芪

熟地 鸚粟殼去油甘草 川芎 陳皮 白水煎量病上下分前後服

托裏定痛散 潰後血虛疼痛不可忍者 熟地 當歸 白芍 乳香去油沒藥去油鸚粟殼去油

川芎 肉桂 白水煎

托裏肉補散馮氏 十全大補湯加金銀花白芷防風各等 水煎服

人參養榮湯正 潰瘍發熱惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面目痿黃呼吸短氣飲食無味不能收斂

或氣血原不足不能收斂大瘡愈後宜多服之不變他證 即十全大補湯去川芎加陳皮遠志

五味子

聖愈湯 潰瘍膿水出多氣血虛極脈細空而無力以致心煩不安睡卧不寧或五心煩燥等證

即四物湯加人參黃耆

保元大成湯 潰瘍元氣素虛精神怯弱或膿水出多神無所主以致睡卧昏倦六脈虛細手冷身

涼便溏或秘胸膈或寬不寬舌雖潤而少津口雖食而無味瘡弦不緊肉色微紅總由不足大補

堪題 人參 白朮 白茯苓 當歸 白芍 黃耆 熟附子 山萸肉 砂仁 北五味

陳皮 廣木香 炙甘草 薑棗引食遠服服至精神回手足煖脾胃醒肉色紅為度凡見此等

證候乃真氣虛脫已欲變壞之病非此不回也

獨參湯 潰後膿水出多氣血虛極或惡寒或發熱或自汗冷汗或手足指甲青冷或身涼脈細

人參二兩 作一劑水二鍾棗十枚煎一鍾徐徐服之若煎至稠厚即為膏矣作三次用溫酒化

服亦可

清震湯

正

潰瘍脾胃虛弱或誤殮生冷或氣惱勞役或入房夢遺致火邪乘入中脘乃生呃逆宜

急服之

人參 陳皮 半夏 炙甘草 益智仁 香附 柿蒂 熟附子 澤瀉 薑棗燄

心引如手足不冷去附子不用如口乾便燥火旺者去附子加川連五分

托裏黃芪湯

治氣虛作渴

嫩黃芪

蜜炙六錢

甘草

天花粉

各一錢

水二鍾煎八分頻服加人參一

錢尤妙

黃芪六一湯

當服此藥終身可免癰疽之疾治渴補虛

綿黃芪

去芦六兩一兩生一兩焙一兩

粉甘草

一兩一兩生

水煎服亦可或為細末每服二錢早晨日午以白湯調服初服酒調亦妙

止痛當歸湯

治腦疽背疽穿潰痠痛

當歸 生地

白芍

人參 炙甘草

官桂

各等黃芪

水煎服

此足陽明厥陰藥也當歸生地活血涼血人參黃芪益氣補中官桂解毒化膿

參朮地黃膏

正

癰疽發背等證大膿後氣血大虛急宜用此

上好人參

半斤切片用水五大碗

將渣再煎汁一碗

共密絹濾清

雲片白朮

六兩上法熬懷慶地黃

用磁蓋盛之頓入水中待冷取起蓋勿泄氣如患者精神短少懶於言動短氣自汗者以人參

膏三匙白朮膏二匙地黃膏一匙俱用無灰好酒一杯頓熱化服如脾氣虛弱飲食減少或食不

知味或已食不化者用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙好熱酒化服如患者腰膝酸軟腿

脚無力皮膚手足粗澀枯槁者用地黃膏三匙人參白朮膏各二匙化服如氣血脾胃相等無偏

勝者三膏各二匙熱酒化服此膏用於清晨並臨睡時各進一次自然強健精神頓生氣血

新肉易生瘡口易合任瘡危險勢大膿多者可保終無變證如夏炎天熱恐膏易變作二次熬