

015

脈簡補義卷下目錄

經義叢談

經脈續辨

榮行脈中衛行脈外分診法

附辨動脈非血脈
附辨吐血

奇經八脈體用病機治法

脈有分看合看法

脈有三部九候合參法

讀醫須先識各經主脈主證

汗脈

正汗汗出不
徹汗後脈證

亡陰亡陽脈證辨

外感夾內傷脈辨

再論痺數之義

數促音義並同

再論散脈虛實

脈弱非虛

弦動細滑皆少陽脈

釋鉤

說神

動脈有強弱

脈象叢說十條

脈有兩側

脈有內曲外曲

脈有兩歧三歧

脈有雙線

脈有動搖

脈有頭本

脈有俯仰

脈有散漫無邊

脈有隱伏不見

脈有無數細絲

讀脈雜說八條

說至

說懸絕

說伏鼓

說雍滿

說微

說人迎氣口

說損至精消孤虛搏

說浮沈

脈法失傳

六氣脈義

附六氣五運主客圖說

脈簡補義卷下

皖南建德周學海潛初甫著

經義叢談

經脈續辨

凡講脈學須先識脈爲何物故一再致辨而不憚繁

前著十二經動脈辨詳矣。今更取內經及西醫之論以質之。夫脈之動者不待言矣。其不動者在素問三部九候論曰。以左手足上去踝五寸按之。右手當踝而彈之。其應五寸以上蠕蠕然者不病。其應疾中手渾渾然者病。中手徐徐然者病。其應上不能至五寸彈之不應者死。此言針刺時彈其經脈而使之動以觀其氣之至不至也。非動脈也。難經七十八難曰。先以左手厭按所針

榮俞之處彈而努之。爪而下之。其氣之來如動脈之狀。卽此義也。曰如動脈。則其脈之本不動可知也。離合眞邪論曰。邪之去絡入經也。客於血脈之中。經之動脈。其至也。亦時隴起。是明明有動脈。血脈之分矣。靈樞經脈曰。脈之卒然動者。皆邪氣居之。留於本末。不動則熱。不堅則陷。且空不與衆同。曰卒然動。則非常動可知也。經脈別論曰。食入於胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。如是。則經與脈之爲二物也。不曉然乎。或曰。西醫之論脈也。人身止有血脈。而無氣之專脈。百脈皆由肺以聚於心。由心以達於四肢百骸。脈之動者。心動也。動則氣推血行。愈行愈遠。遠則炭氣盛。而

血質漸壞矣。於是由迴血管復返於肺以達於心。迴血管者卽藍色隱隱於皮膚之下者也。血既聚於心。由肺呼吸以吐炭氣而納養氣。於是血之質復精而復外達於四肢百骸。如是環周不已。皆氣行血中。非血自血。氣自氣也。人死解而視之。有無血之管者。非本無血也。氣盡故血亦因之而盡也。是說也。吾未信之。夫人死氣盡血不推行。當壅脈中。何得血亦盡乎。蓋氣管本有細竅與血道通。所謂微絲管也。氣在管中。充塞滿溢。血不得滲入。氣盡而血遂滲入矣。故死後氣管中有有血者。有無血者。且西醫有曰。吸液管者。吸攝食物之精液以達於周身。與脈同路。其中無血。千支百派。散布大小腸夾

膜之間。食後少頃。內有精液。始見如白絲。一切吸管。附近小腸。會合爲一名曰吸液總管。附脊骨上行。至頸骨第七節。卽屈轉而下。併入迴血會管。達於心。此卽王勳臣所謂衛總管者也。非氣管。而何是故。經者血脈也。脈者氣脈也。血脈者不動而氣脈動者也。專就動脈之中。分辨氣血。則其形屬血。其動屬氣。統合人身之脈。分辨氣血。則確有注氣之脈。注血之脈。而不紊者也。

全體闡微曰。脈管迴管之外。更有一類。曰吸管。以其能吸攝津液也。全體皆有分淺深二類。深者與脈管同路。淺者與迴管同路。總吸管由第二腰骨右旁小腸處起。有衆吸管來會。上行至總脈後。血總管也展大如

囊中藏養汁。再上行。由膈總脈孔入胸膛。在肺中後
峽間。在總脈上。總迴管中。至第四背骨。岐分左右。二
總管。左者向背骨左。又上行食管左。至第四頸骨。彎
迴而下。由左頸內迴管。左鎖柱骨下。迴管今處。透入
腋下。上下大。中小。有時中處分爲二。復合一。門榻甚
多。此左總吸管也。除頭右心右胸膛右肺右頸右及
手肝等處。右吸管不入。其左諸吸管。莫不會入於此。
其右總吸管。則接右諸吸管。至右鎖柱骨迴管會入。
其左諸吸管。亦不入也。周身吸管中。藏明汁。稀而鹹。
有味。無色。或微黃。由總吸管。分數大吸管。更分無數
小吸管。以至微絲管。分散如網。無微不至。或彼此復

相並爲大管。無論大小淺深。統會總吸管。入首臂迴管止。以達於心也。

案西書之意。謂總吸管。由小腸發原。貼近脊骨。五藏六府。皆有細管來會上行。由左右鎖柱骨下透腋。分行兩臂周身。無微不到其出也。與脈管同路。其迴也。與迴管同路。氣管。血管。並行之說。不更信而有徵耶。西醫必謂動者血管。而吸管不動也。果何徵耶。蓋嘗思之。吸液管之微絲管。必通於血管之微絲管。藉氣之鼓激。送津液。由微絲入血管。以滑利血之運行也。西醫謂小兒疳疾。婦人乾血勞。皆吸液管病。是氣亢津耗。不能透入血管也。二者脈象。皆見細數。吸管乾

澀事理皎然。西醫徒恃顯微鏡窺測。以赤者爲血管。白者爲液管。皆是據形言之。氣之無形。遂不知之矣。又按液管貼近脊骨。血管貼近液管。攷之內經。是液管卽督脈。血管卽衝脈矣。迴血總管當配任脈。所謂任脈通太衝脈盛。月事以時下。是也。氣之發也。周身液管同時俱動。其迴管則力衰不能動矣。靈樞曰。氣之離藏也。卒然如弓弩之發。上於魚以反衰。其餘氣衰散以逆上。故其行微。卽此義也。

榮行脈中衛行脈外分診法

附再辨動脈非血脈
附辨吐血

前箸氣分血分直言論氣血分診法。悉矣。然皆在脈中者也。若所謂榮行脈中衛行脈外者。又將何以診之。靈

樞經脈篇曰。經脈者常不可見。其虛實也。以氣口知之。此卽所以診榮也。又曰。循其本末。察其寒溫。此卽所以診衛也。人身之氣。淫熱而已。榮主淫。衛主熱。衛衰則身寒。故可據皮膚之寒溫。候衛氣之虛實也。本末者。尺膚上下也。素問通評虛實論曰。經絡皆實。是寸脈急而尺緩也。絡氣不足。經氣有餘者。脈口熱而尺寒也。經虛絡滿者。尺熱滿。脈口寒濇也。夫經實而脈急者。脈有管以束之。氣實於中。則脈綳急而挺起矣。絡實而尺緩者。絡散於肌膚者也。氣實於中。則尺膚豐盛而臄起矣。絡不足而尺寒者。衛不足以溫之也。且寒有蕭索之意。是消而著也。經有餘而脈熱者。非經中眞氣有餘。乃脈外衛

氣侵入。且熱有盛滿之意是大而強也。經脈亦曰衛氣先行皮膚。先充絡脈。絡脈先盛。故衛氣已平。營氣乃滿。經脈乃大盛。由此觀之。絡氣屬衛。經氣屬營。不皎然乎。論疾診尺篇曰。脈緩尺之皮膚亦緩。脈急尺之皮膚亦急。脈滑尺之皮膚亦滑。脈澹尺之皮膚亦澹。脈小尺之皮膚亦減而少氣。脈大尺之皮膚亦盛而臄起。此所謂榮衛相應者也。劉若金本草述黃耆條下亦云。分肉腠理之間可以徵元氣之充與否。若分肉腠理一有不充。卽是臄中之氣化不足。由此觀之。切脈口以候榮。按尺膚以候衛。又何疑乎。大抵榮衛相隨。不宜偏勝。嘗憶先哲有言。脈貴有根。尤貴有神。卽如五藏絕脈。惟肺如風。

吹毛空而無根。其他藏絕脈。沈候與尺部皆按之鼓指。分外堅搏。如彈石。如循刀刃。如雀啄。如操帶鉤。皆無神。而似有根者也。其有根而死者。何也。蓋木根深入地中。而死者。不得氣故也。凡木根雖下垂。而根上旁鬚四面。旋繞得四方之土氣。氣盛方能旁見側出。枝葉四布。人之脈。隱於肌肉之內。不但下至尺。深至筋骨。亦必按之。中間與肌肉相連一片如是。則氣血交紐。榮衛未離。謂之有氣。有氣便是有根。嘗見陰虧之輩。以及年高之人。其脈若獨然一條。扛起似與肌肉不相連。絡陰與陽分。是無氣也。此段議論明白曉暢。發前人所未發。而榮衛之診益皎然矣。老人皮著肉消。而脈獨挺互指下。與將

死者脈如湯沸。勢欲涌出皮膚之上。是非脈中之氣盛也。乃脈中之氣衰而衛氣陷之。脈中之氣絕而衛氣亂之也。前人只言脈與肌肉太無分別。謂之散脈而不知脈與肌肉太有分別。又謂之絕脈。以有偏絕。故有偏勝也。是故常人之身。脈中脈外之氣。升降遲速。兩相應者也。一有不應。榮衛乖離。而寒熱往來之證作矣。古人所以診脈。必兼診尺者。正以調其榮衛也。仲景高章卑慄。以脈之浮主衛。沈主榮。脈之來主衛。去主榮。是陽升陰降。陽嘯陰吸之義也。故事就動脈。以分榮衛。則脈體之浮沈呼吸形勢。可分驗之。分脈中脈外。以驗榮衛。則脈體之緩急與尺膚之緩急。可合驗之。合驗於脈中。則分

驗其浮沈呼吸形勢也。分驗於脈外。則合驗其形體之緩急也。

榮衛雖相應。而不可相干。若宗氣者。榮衛之所合也。外主呼吸。內主動脈。是動脈本夾雜悍氣在內。故能一動而周身悉應也。若在血管。則滯於有形。其應不能如是之神矣。液亦極膩。但液管中虛。不似血管之滿實也。苟或悍氣竄入血管。迫

血妄行。血駛而無隙可泄。則爲狂爲厥矣。有隙得泄。則爲涌血泄血。傾盪傾盆矣。狂者。血奔於大經之中。外行周身而不得甯息者也。厥者。血迫於大經之中。內觸藏府而氣機乍窒者也。血上行而遇隙則涌血。血下行而遇隙則泄血。內經曰。衛氣慄悍滑疾。見開而出。卽此義。