

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷十二

療癖方五首

唐 王燾 撰

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液通流
雖復多飲水漿亦不能為病若攝養乖方則三焦痞隔
三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散
更遇寒氣積聚而成癖癖者謂僻側在於兩脅之間有

時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於
後養生云卧覺勿飲水更眠令人作水瀝又云飲水勿
急咽久成水瀝又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐
故久之愈伏梁伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如
盤宿癰者宿水宿氣癖數生癰久則腸化為筋骨變為

實

出第二
十卷中

廣濟療腹中癖氣方

牛膝

八分

桔梗

六分

芍藥

六分

枳實

八分
炙

白朮

六分

鼈甲

八分

茯苓

八分

人參

六分

厚朴

六分

大黃

六分

桂心

六分

檳榔

六分

右十二味擣篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十九

日二服漸加至三十丸老小微利忌生冷油膩小豆

粘食莧菜醋生葱猪肉

出第二卷中

千金翼江寧衍法師破癖方

白朮

三兩

枳實

三兩

柴胡

三兩

右三味切以水五升煮取二升分溫三服服三十劑

永差忌桃李雀肉

出第十
九卷中

必効療癖方

取車下李仁微湯退去皮及並仁與乾麴相半擣
之為餅如猶乾和淡水如常溲麴大小一如病人
手掌為二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當
快利如不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利
為度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病
未盡者量力一二日更進一服以病盡為限小兒

亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不効但病重者李仁與麪相半輕者以意減病減之後服者亦任量力頻試差神効

又方

大黃

十兩

右一味擣篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十九以利為度小者減之

又方

牛黃

三大豆許

麝香

一當門子大

朱砂

準麝香

生犀角

小棗

許別
搗末

以上四味並研令極細湯成後內之

大黃

一兩

吊藤

一兩

升麻

一兩

甘草

半兩炙

鼈甲

半兩炙

丁香

五十枚

右十味切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去滓內牛黃等四味和絞分為三服每服如人行十里久忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之

候特忌牛馬肉其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十五以上人服若十歲以下斟酌量病減之忌莧菜

海藻松菜生血物等

並出第三卷中

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於脅下有時弦旦起或脹痛或喘息短氣故云癖結脈

緊實者癖結也

出第二卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方

巴豆

三枚去心皮熬

杏仁

七枚去尖

大黃

如雞子大

右三味擣篩大黃取巴豆杏仁別擣如膏和大黃入

蜜和丸空肚以飲服如梧子七丸日一服漸加以微

利下病為度忌生冷油膩

出第二卷中

千金狼毒丸主堅癖方

狼毒

五兩塗薑汁炙

半夏

三兩洗

杏仁

三兩

桂心

四兩

附子

二兩炮

細辛

二兩

椒

三兩汗

右七味擣篩別擣杏仁蜜和飲服如大豆二九

出第十一

中 卷

救急中候黑丸療諸癖結痰飲等大良方

桔梗

分四

桂心

分四

巴豆

分八

芫花

分十二
熬

杏仁

分五

右五味先擣三藥成末別擣巴豆杏仁如膏合和又

擣一千杵下蜜又擣二千杵丸如胡豆漿服一丸取

利可至二三丸兒生十日欲癰發可與一二丸如黍

米諸腹不快體中覺患便服之得一兩行利即好
後肘

千金同服四神丸下
之亦得出第三卷中

寒癖方五首

病源寒癖之為病是飲水停積脅下痞強是也因遇寒

即痛所以謂之寒癖脈弦而大者寒癖也

出第二
十卷中

肘後療腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脅痞滿按之

鳴轉逆害飲食方

大蟾蜍

一頭去皮及腹
中物支解之

芒硝

大人用一升中人
七合羸小五合

右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一

升若未下更服一升中人七合羸小五合得下者止
後九日十日一遍作之

又方

大黃

三兩

甘草

二兩炙

蜜

一升二合

棗

二十枚

右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓內
蜜再上火煎令烊分再服忌海藻松菜

又方

巴豆

三十枚煎

杏仁

二十枚

桔梗

六分

藜蘆

四分炙

金匱要略卷十二
皂莢

三分
去皮

右五味搗蜜和丸如胡豆未食服一丸日三欲下病者服二丸長將服百日都好差忌猪肉蘆笋狸肉

古今

錄驗同並出

第三卷中

深師主久寒癖胃滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時去痛不欲食食即為患心冷引腰背強急吳茱萸丸方

吳茱萸

八分

附子

三分
炮

厚朴

五分
炙

半夏

五分
洗

桂心

分五

人參

分五

礬石

分五
熬

枳實

分五
炙

乾薑

分五

右五味下篩蜜和酒服如梧子二十九日三不知增

之

出第十
六卷中

延年白朮丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下
冷上熱不能食飲頻頭風旋喜嘔吐方

白朮

分六

厚朴

分二
炙

人參

分五

白芷

分三

橘皮

分四

防風

分五

吳茱萸

分四

芎藭

分四

薯蕷

分四

茯神

分五

桂心

分四

乾薑

分四

大麥蘖

分四 熬

防葵

分四 炙

甘草

分五 炙

右十五味，搗篩蜜和丸，如梧桐子，酒服十五丸，日再

加至二十丸

出第十卷中

久癖方二首

病源久癖謂因飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成癖在於兩脅下經久不差乃結聚成形段而起按之乃水鳴積有歲年故云久癖

出第二卷中

集驗療冷熱久癖食不能下虛滿如水狀方

前胡

兩四

生薑

兩四

枳實

灸三兩

半夏

洗四兩

白朮

兩三

茯苓

兩四

甘草

灸二兩

桂心

兩二

右八味切以水八升煮取三升分三服

千金同出
第六卷中

古今錄驗曾青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒
者服之二十日愈久服令人延年益壽殷仲堪曰扁
鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消
渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗