

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

卷之四

女科

治法

問答

婦人

厥陰者肝之經也治胎產之病從厥陰者

屬少陰天癸既行皆屬

明 王肯堂 撰

是祖氣生化之原也厥陰與少陽相表裏故治法無犯胃氣及上三焦為三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動于脾利小便則內亡津液胃中枯燥制藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和于榮衛內則調于清便先將此法為初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒為之緩治或小便不利大便秘結或積熱于腸胃之間或已成痿或散血氣而為浮腫蓋產理多門故

曰同傷寒壞證如發渴而用白虎氣弱而用黃芪血刺
痛而用當歸腹痛而加芍藥已上例證不犯三禁謂產
後之久病也若產後暴病又不可拘也如產後熱入血
室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃堅燥者大承氣不可
以泄藥言之產後世人多用烏金四物湯是不分四時
之寒熱不分血氣之虛實盲然一槩用藥如此而愈加
增劇是誤也大抵產病天行則增損柴胡雜證則加減
四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱病證虛實

不可不察也四物湯常宜服餌今立四時增損法于後
養血四物湯 益榮衛滋氣血治月水不調臍腹疼痛
婦人經病或前或後或多或少疼痛不一腰足腹中
痛或崩中漏下或半產惡露過多或停留不出妊娠
腹痛下血胎不安產後血塊不散或亡血過多惡露
不止四物湯加茱萸煎服若人陽臟少使茱萸陰臟
多使茱萸一方加香附

熟地黃

補血如臍痛非此不能
除乃通臍經之藥也

川芎

治風泄肝木
如血虛頭痛

非此不能除乃
芍藥
和血理脾如腹中虛痛非此
通肝經之藥也

當歸
和血如血刺痛刺如刀割非
此不能除乃通腎經之藥也

右為麋末水煎服
春倍川芎
一曰春二曰脈
弦三曰頭痛
夏倍

芍藥
一曰夏二曰
脈洪三曰泄
秋倍地黃
一曰秋二曰脈
濡三曰血虛
冬倍當

歸
一曰冬二曰脈沈
三曰寒而不食
若春則防風四物加防風倍

川芎
若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥
若秋則

門冬四物加天門冬倍地黃
若冬則桂枝四物加

桂枝倍當歸
若血虛而腹痛微汗而惡風四物加

茂桂謂之腹痛六合 若風眩暈加秦艽羌活謂之

風六合 若氣虛弱起則無力趺然而倒加厚朴陳

皮謂之氣六合

氣不足而用泄氣之藥可乎當以參芪易之

若發熱而

煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合 若虛寒

脈微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒

六合 若中濕身沈重無力身涼微汗加白朮茯苓

謂之濕六合 若婦人筋骨肢節疼及頭痛脈弦憎

寒如瘧宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈者四物

湯^四羌活防風^{各一}若血氣上衝心腹脇下滿悶

宜治氣六合四物湯^四木香檳榔^{各一}若臍下虛

冷腹痛及腰脊間悶痛宜延胡六合^{小腹痛}四物湯^{同用}

延胡苦棟^{各一兩}若氣衝經脈故月事頻併臍

下多痛宜芍藥六合四物湯^四芍藥^倍黃芪^一若

經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澀也宜八物湯四

物湯^四延胡檳榔苦棟^{碎炒}木香^{各一}若婦人血

虛心腹疔痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯

補下元加乾薑半兩甘草七分 氣築小腹痛加延

胡索煎服 若腹中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥

若腹痛作聲經脈不快加熟地黄一倍添桂心半

倍煎 經行腹痛腰背痛加芸薑牛膝紅花吳茱萸

菴閭甘草銀器燈心熱服 若經水澀少宜四物湯

內加葵花煎又加紅花血見愁 若經水少而色和

者四物湯加熟地黄當歸

各一兩

若經水暴下四物

湯內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩 若

經水如黑豆汁者加黃芩黃連

各一兩

若經水過多

別無餘證宜黃芩六合湯四物湯

四兩

黃芩白朮

各一兩

經血淋漓不斷加乾瑞蓮房炒入藥

陰陽交合

經脈行加赤石脂黃芪肉桂百草霜藕節敗椶灰肉

豆蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆 若經水適來

適斷或有寒熱往來者先服小柴胡湯以去其寒熱

後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變證

表邪猶在不能效也依前論中變證隨證用藥調治

若血崩者加生地黃蒲黃 補血住崩加百草霜

椶灰首綿灰蒲黃炒過龍骨白薑 血成片加地黃

藕節 黑血片人參白朮 若血臟虛冷崩中去血

過多加阿膠艾 月水不調血崩或多少或前後嘔

逆心膨陳艾黃芪 若赤白帶下宜香桂六合四物

湯四兩桂枝香附各五錢 四物湯為細末煉蜜丸梧子大

空心米飲下三四十九治年高婦人白帶良驗 白

淫濁龍骨地黃當歸 五色研麝香好酒 鮮紅溫

酒鹽湯 帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑豆白朮
延胡索白薑龍骨空心鹽酒下 白帶加白龍骨酒

下 若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆

炒烟盡
各一兩

若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分用

之王石膚云熟地黄滯血安能止痛不若以五靈脂

代之 血滯不通加桃仁紅花各二錢半 經閉加

枳殼大黃荆芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山

梔子車前子 血寒加甘草烏梅柴胡桃柳枝 月

經久閉加肉桂甘草黃芪宣薑棗子木通紅花 月
水不通加野苧根牛膝紅花蘇木陳酒水同煎 血
氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩 四物湯加甘草
半兩為細末煉蜜丸每兩作八丸酒醋共半盞煎湯
同化調下名當歸煎去敗血生好血如人行五里再
進一服無時 若虛熱病四物湯與參蘇飲相合名
補心湯主之 添柴胡名五神湯大能補虛退虛熱
潮熱加黃芩地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩

人參 虛熱口乾加麥門冬黃芩一兩 虛渴加人

參乾葛烏梅枯薑根 虛而多汗加煅牡蠣麻黃根

各半

兩 虛寒潮熱加柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦艽

知母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子 若四肢腫痛

不能舉動宜與蒼朮各半湯主之 若大便燥結四

物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之 若流濕

潤燥宜四物理中各半湯 若氣血俱虛四物與四

君子湯各半名八珍湯主之加縮砂仁保胎氣令人

有子有熱加黃芩 若因熱生風者加川芎柴胡防

風

一方無

血氣勞加荆芥柴胡 血氣兩脇築痛或

盤腸成塊加大黃葶乳香 血弱生風四肢痺疼

行步艱難加人參乳香沒藥麝香甘草五靈脂羌獨

活防風荆芥地龍南星白附子澤蘭為末蜜丸木瓜

鹽湯下 血氣膨脹加甘草木香枳殼馬兜鈴亭歷

紫蘇藿香地黃空心服 臟腑秘加大黃桃仁 滑

泄加官桂附子 虛瀉加人參川芎白芷蒲黃炒阿

膠白朮茱萸續斷乾薑附子肉桂黃芪赤石脂甘草

蜜丸鹽梅湯下

嘔加白朮人參

一方有生薑

嘔血不

止加藿香白朮半兩人參二錢半

嘔逆飲食不入

加白朮乳香甘草人參縮砂益智仁胡椒 若欬嗽

加桑白皮半夏人參生薑北五味子甘草 感風勞

嗽加款花知母阿膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏

仁柴胡宣薑烏梅訶子 若發寒熱加乾生薑牡丹

皮柴胡

一方加芍藥

如寒熱往來加炮乾薑牡丹皮

各一

分

若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不通只用生薑薄荷此是婦人常服之藥益味寡而性緩效遲而功深 若大渴加知母石膏 若水停心下微吐逆者加豬苓茯苓防已 若心腹脹滿加枳殼青皮

虛汗加麻黃根 汗多加浮麥 大便下血四肢寒

膨脹腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊芥木香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮青皮黃芩甘草白茅根槐角 腸風下血加槐角槐花枳殼荊芥黃芩大