

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷五十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

大定回春公案

薛氏醫案卷五十三

大定回春

錢氏同治直隸四

大定回春

治肝經

明薛己訂

胎草炒山梔仁 當歸

有為末煨客丸為膏大每服半九煎竹葉湯入砂糖

大定回春公案

薛氏醫案

一

化下

薛按前方足厥陰肝經解散肌邪疏通內臟之苦寒藥也若大便秘結煩渴飲冷飲食如常屬形病俱實宜用此瀉之若大便調和煩渴飲冷屬病氣實而形氣虛宜用抑青丸平之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦怠屬形病俱虛宜用地黃丸補之若肝經血虛生風先用四物湯加鈎藤鈎以生肝血繼用四君子湯以補脾土若因肝經血燥生痰用地黃丸生

腎水益肝血若土不能培木用四君子湯加當歸以
補中用地黃丸以滋腎若因肺金尅肝木用六君子
湯加芍藥木香實脾土以平肺金若因心虛奪母之
氣或腎水虛不能生肝木者並用地黃丸主之若屢
服峻劑而脾胃虛寒者必用六君子湯加丁香木香
補脾胃以培陽氣若因乳母恚怒肝火妄動致兒為
患者母服加味小柴胡湯若因乳母肝脾血虛發熱
致兒為患者母服加味道遙散子亦服數滴

抑青丸即前方去山梔大黃

抑肝散 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱

或木乘土而嘔吐痰涎腹膨少食睡卧不安者

軟柴胡分五川芎分八當歸 白朮炒茯苓各一錢甘草

分五鉤藤鉤錢一

右水煎子母同服

瀉心湯 治心經實熱

黃連

右為末每服五分臨卧溫水化下

薛按前症若叫哭發熱作渴飲水抽搐有力仰面而
睡者屬心經實熱宜用瀉心湯或導赤散若發熱飲
湯抽搐乏力驚竄咬牙合面而睡者屬心經虛熱用
補心散若喘嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散
若頭搖目劓身熱抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若
合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若竄視驚
悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸若因乳母致症亦

用前藥以治其母

導赤散 治小腸實熱小便秘赤

生地黃 木通 甘草炒各等分

右為末每服一錢入淡竹葉水煎

薛按瀉心湯導赤散瀉心小腸實火之劑蓋心為脾母脾為心子然心既病則脾土益虛矣用者審之

生犀散 治心經虛熱

地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛各一兩 甘草五分 犀

角二錢
鎊

右為末每服一二錢水煎

薛按前方云治心經虛熱然其所用多屬瀉心瀉肝
脾之劑蓋虛熱二字恐傳寫之誤倣如心經自病而
血虛熱者用秘旨安神丸脾虛奪心之氣而熱者用
秘旨補脾湯肝木不能生心火而虛熱者用地黃丸
秘旨安神丸 治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參 半夏湯泡酸棗仁炒茯神各一錢當歸酒洗橘紅

赤芍七分炒各五味子

五粒甘草炙三分

右為末薑汁糊丸芡實大每服一丸生姜湯下

瀉黃散 治脾胃實熱

山梔仁兩一石膏

錢五藿香葉

甘草

各七錢五分防風兩二

右用蜜酒微炒為末每服一二錢水煎

薛按前症若作渴飲冷卧不露睛手足熱甚或遍身

發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯卧而露

睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青搐搦

乳食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤驚悸身
熱昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白喘嗽肢體
倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足指
冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜
用七味白朮散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當
審其因而治其母

五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食

人參 茯苓 白朮 甘草 炒陳皮 各等分

右為末每服三錢薑棗水煎

薛按前方補脾胃之聖藥也況人之一身以脾胃為主若小兒乳食失節寒涼失宜或乳母六淫七情失調兒飲其乳諸病頻起當專以此藥治之其應如響益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄瀉

丁香二錢 陳皮 青皮 訶子肉各五錢 甘草炙三錢

右為末每服一二錢水煎

薛按前症若因脾土虛弱而吐瀉者用五味異功散

若因肝木侮脾土而吐瀉者用六君子加柴胡如不應或手足指冷屬脾胃虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾土虛而肝木侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前症母服加味歸脾湯

人參安胃散 治因服峻厲脾胃虧損或成慢驚泄瀉嘔吐或腸胃有熱以致前症

人參錢一黃芪錢二生甘草 炙甘草各五分白芍藥七分

白茯苓四分黃連二分

右為末每服二三錢水煎

七味白朮散 治吐瀉或病後津液不足口乾作渴

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草炙 藿香葉

各一錢 乾葛二錢

右為末每服二三錢水煎

薛按胃傷則嘔脾傷則瀉故用前藥調補胃氣以化生津液如無他症只因胃氣虛而津液不足者用四君子湯尤效

秘旨補脾湯 治久病面黃肌瘦咬牙目割頭髮稀少

誤藥所致

人參 白朮錢各一 白芍藥酒炒 白茯苓各八分 陳皮

川芎各六分 甘草炙 黃芪蜜炙 當歸酒洗各四分

右每服二三錢薑水煎

瀉白散 治肺經實熱咳嗽痰喘

甘草炙五錢 地骨皮兩 桑根白皮炒一兩

右為末每服一二錢入粳米百粒水煎

薛按活人方云喘者肺氣有餘也氣盛當認作氣衰
有餘當認作不足肺氣盛者乃肺中之火盛也有餘
者肺中之邪有餘也故用前藥以瀉之若土虛不能
生肺用補中益氣湯火來剋金用人參平肺散腎水
奪母之氣或陰火上炎用地黃丸若肺虛肝木乘侮
先用阿膠散後用瀉青丸若因乳母肺經受症致兒
為患母服前散若因乳母感冒風寒肺經鬱熱致兒
為患用十味參蘇飲若因乳母膏粱醇酒積熱致兒

為患用加味清胃散

阿膠散 治肺虛咳嗽口乾作渴

馬兜鈴

錢五

甘草

炙一錢

糯米

一兩

杏仁

七箇去皮尖

明阿膠

一兩

鼠粘子

二錢五分

右為末每服二錢水煎

薛按前症若因脾胃弱而肺氣虛者宜用補中益氣湯若肺金自虛者宜用四君子湯

地黃丸 治腎虛解顱或行遲語遲等症