

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷

四十八至
五十



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十八

唐孫思邈撰

宋林億等校正

脾臟方

和氣

內虛實第五

胃

氣曰虛實之虛主於脾者

變動肉實者坐安不動
脾臟有病從肉生熱則

原脾寒則脾

欽定四庫全書

備急千金要方

五加酒治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣所傷方

五加皮

枸杞皮

各二升

乾地黄

丹參

各八兩

石膏

一方作石床

杜仲

各一斤

乾薑

四兩

附子

三兩

右八味咬咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再

半夏湯治肉實坐安席不能動作喘氣主脾病熱氣所

加關格除喘方

半夏

宿薑

各八兩

杏仁

五兩

細辛

橘皮

各四兩

麻黃

一兩

石膏

七兩

射干

二兩

右八味咬咀以水九升煮取三升分三服須利下加芒硝三兩

閉澀第六

論方
灸法

論曰有人因時疾瘥後得閉塞不通遂致天命大不可輕之所以備述雖非死病凡人不明藥餌者拱手待斃深可痛哉單複諸方以虞倉卒耳凡大便不通皆用滑膩之物及冷水並通也凡候面黃者即知大便難麻子仁圓趺陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮

澀相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而不渴也

麻子仁升二

枳實

芍藥

各八兩

杏仁升一

大黃

厚朴

各一斤

右六味為末蜜丸如梧子飲服五九日三漸加至十

丸

肘後外臺無杏仁

治關格大便不通方

芒硝

烏梅

桑白皮

各五兩

芍藥

杏仁各四兩

麻仁三兩

大黃八兩

右七味咬咀以水七升煮取三升分三服一本無烏梅加枳實乾地黄各二兩

治大便閉塞不通神方

猪羊膽無在以筒灌三合許令深入即出矣出不盡須更更灌一方加冬葵子汁和之亦妙又椒豉湯五升和猪膏三合灌之佳臨時易可得即用之又煎蜜成煎如人指大深內穀道佳又無灰濃酒半升鹽三

錢七鍊成如上法

三黃湯治下焦熱結不得大便方

大黃

三兩

黃芩

二兩

梔子

二十枚

甘草

一兩

右四味咬咀以水五升煮取一升八合分三服若大

開加芒硝二兩

五柔圓治開澀及虛損不足飲食不生肌膚三焦不調

和榮衛利腑臟補三焦方

大黃

一升蒸三斗米下

前胡

二兩

半夏

茯苓

芍藥

茯苓

當歸

葶藶

細辛
各一兩

右九味為末蜜和合搗萬杵為丸梧子大食後服十

五丸後稍增之日再

崔氏云令人喜飯消穀益氣有憂者加松實半兩菴蘭半兩服

之緩中不如意便服之又有黃芩一兩

大五柔圓主臟氣不調大便難通和榮衛利九竅消穀

益氣方

大黃

芍藥

枳實

茯苓

葶藶

甘草

黃芩

牛膝各二兩

桃仁一百枚

杏仁四十枚

右十味為末蜜和丸如梧子一服三九日三加至二

十丸酒下

濡臍湯主大便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短

氣汗出脹滿方

生葛根

猪膏各二升

大黃一兩

右三味咬咀以水七升煮取五升去滓內膏煎取三

升澄清強人頓服羸人再服亦治大小便不通

治大便不通方

大戟

斤

大豆

五升

商陸

牛膝

各三斤

右四味咬咀以水五升煮取二升以大豆五升煎令汁盡至豆乾初服三枚以通為度

又方蜜和胡鷺屎內大孔中即通

又方水四升蜜一升合煮熟冷灌下部中一食頃即通

又方鹽半合蜜三合合煎如飴出之著冷水中丸如櫛

榔形如指許大深內下部中立通

治大便難方

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁灌之立通

又方以醬清漬烏梅灌下部中

又方桑根白皮 榆根白皮各一把

右二味咬咀以水三升煮取一升半分三服

又方桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方常煮麻子取汁飲

又方常服蜜煎五合

又方猪脂和陳葵子末為丸如梧子每服十丸通即止

又方水服桃花方寸匕無桃花白皮亦得

又方常服車前子及葉並良

又方搗葵根汁生服

又方好膠

寸三

蔥白

把一

右二味以水四升煮取一升半頓服之即下

又方葵子

牛酥

各一升猪脂用亦得

右二味以水四升煮葵子取一升內酥煮一沸待冷

分作二服

又方葵子汁和乳汁等分服之立出

又方醬清

升三

麻油

升二

蔥白

寸三

右三味合煮令黑去滓待冷頓服之一方不用醬清

芒硝圓治脹滿不通方

芒硝

芍藥

各一兩半

杏仁

大黃

各二兩

黃芩

一兩六銖

右五味為末蜜丸如梧子飲服十五丸加至二十九
取通利為度日三

又方

通草

朴硝

各四兩

郁李仁

黃芩

瞿麥

各三兩

車前子

五合一方六兩一方二升

右六味㕮咀以水八升煮取二升半分三服一方用

絹袋盛煮頓服二升

又方獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部中氣立通又削薑一鹽導之及乾薑鹽杏仁搗丸導之並佳

治脹滿閉不下方

吳茱萸升一

乾薑

大黃

當歸

桂心

芍藥

甘草

芫花

各二兩

人參

細辛

各一兩

桃白皮

一把

真珠

半兩

雄黃

銖十八

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內雄黃真

珠末酒一升微火煮三沸服一升得下即止

走馬湯主一切卒中惡心痛腹脹大便不通

方見心
腹痛篇

巴豆圓主寒癖宿食久飲飽不消大閉不通

巴豆仁一升清酒五升煮三日三夕碎大熟合酒微

火煎令可丸如胡豆欲取吐下者服二丸

練中圓主宿食不消大便難方

肘後名
承氣丸

大黃

八兩

葶藶

杏仁

芒硝

各四兩

右四味為末蜜丸如梧子大食後服七丸日三後稍