

欽定四庫全書

子部

仁齋傷寒類書卷三



北京中醫藥大學圖書館版權所

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

傷寒證治

表裏汗下證

發熱憎寒體痛時

不憎寒却煩憎熱

脉浮解表定無疑
多汗咽乾裏下之

○表證脉浮身體肢節疼痛惡風惡寒○裏證脉實

而不浮不惡風寒反惡熱身不疼自汗譫語不大便
或咽乾腹滿○表裏俱見證張氏用五苓散真人用
桂枝大黃甘草湯一塊生薑兩箇棗肉桂大黃等甘
草滿盞水煎存七分表裏傷寒只一掃

岳陽樓
降筆

三陽三陰脉

陽屬膀胱胃膽間

陰居脾腎更連肝

浮長弦細沉微緩

審脉仍將外證看

三陽外證

足之三陽
從頭走足

腰脊頭疼熱惡寒

目疼汗熱鼻中乾

耳聾口苦時乾嘔

胃脇堅疼寒熱干

○太陽證腰脊強頭項痛發熱惡寒若傷風則鼻塞
惡風○陽明證目疼身熱鼻乾不惡寒反惡熱自汗
出不得卧內實大便難○少陽證耳聾胃脇痛或口
苦咽乾目眩或往來寒熱而嘔○陽病體輕脉輕外
證壯熱煩渴大小便秘頭面有汗昏潰氣麤揚手擲
足

三陰外證

足之三陰
從足走腹

腹滿肢溫利不煩

舌乾燥渴或憎寒

唇青舌卷多煩滿

筋急囊間縮又攣

○太陰證腹滿或痛手足溫自利不渴喉下乾○少

陰證口燥舌乾而渴或口中和則惡寒常默默欲寐

不欲見光明有時腹痛又有咽痛二證○厥陰證唇

青舌卷煩滿筋急囊縮

婦人則
乳縮

或消渴饑不欲食食

即吐蛔○陰病體重脉重外證厥冷唇青腹滿不渴

大小便自利惺惺而靜引衣自蓋足攣而卧三陰病
無身熱無頭痛其或渴者陰極發躁也○陰證唇青
舌黑或白胎或卷強者用生薑頻擦唇口續又易之
薑能回陽生胃解毒溫血散氣擦之後陰消陽長黑
轉而紅最為良法

汗下溫正法

○太陽傷風自汗惡風桂枝湯傷寒無汗惡寒麻黃
湯風寒俱盛則以桂枝麻黃湯兼用自汗小便數者

勿用桂枝可乾薑甘草湯芍藥甘草湯桂枝湯麻黃湯夏月用之須加黃芩○陽明不惡寒反惡熱自汗大便難用小承氣大柴胡汗多者胃汁乾急下大承氣無汗惡寒升麻湯有汗脉遲微惡寒為表未解桂枝湯無汗脉浮發喘麻黃湯○少陽並屬小柴胡湯柴胡湯葦冬月用之須加官桂○太陰自利不渴為臟寒理中湯四逆湯陰證手足必微厥若手足溫便是太陰胃膈脹滿枳實理中圓腹滿脉浮桂枝湯腹

滿時痛桂枝加芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯○少陰
脉沉口不乾舌不燥及背惡寒者並用四逆湯小便
白者亦用四逆始得病脉沉反發熱麻黃細辛附子
湯口燥咽乾而渴急下之用大承氣○厥陰脉微浮
為欲愈不浮未愈小建中湯脉浮緩如瘡狀者囊不
縮亦欲愈桂枝麻黃各半湯脉沉短者囊必縮為毒
氣入臟可承氣湯下之利不止用四逆湯○三陰中
寒微則理中湯稍厥或中寒下利則乾薑甘草湯大

段重者用四逆湯無脉者用通脉四逆湯六經惟少
陰難治大要以口燥而渴知其熱脉沉而遲別其寒
然亦有表裏無熱但煩儼默默不欲見光明其脉沉
細或時腹痛此可以四順湯增加乾薑對之增損理
中圓亦可矣凡陰證白通湯四逆湯通脉湯條例未
敢遽用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒
亦有毒乃病氣也滯須行之養正丹金液丹半硫圓
皆可流利又為要藥

變汗法

○陽明與太陽合病有惡寒證屬表可汗用升麻湯
又太陽陽明合病胃滿而喘麻黃湯○陽明本多汗
若脉浮無汗而喘可發汗亦用麻黃湯又陽明病脉
遲汗出多微惡寒者表未解也可與桂枝湯又陽明
煩熱汗出如瘧或日晡發潮熱而脉浮虛者並與桂
枝湯若脉實者當用承氣○太陰腹滿脉浮桂枝湯
凡太陰證有用五積散者非謂發汗蓋去積耳○少

陰初得病脉沉反發熱者溫之而微取其汗用麻黃
細辛附子湯下利手足冷而身熱者非屬通脉四逆
湯又少陰病二日常見少陰而無陽熱中滿之證
者用麻黃附子甘草湯微汗之二藥皆陰證傷寒解
表之劑陰證初病便屬少陰不待傳次

變下法

○太陽發熱汗出不解嘔吐下利而心中痞硬者大
柴胡下之又太陽病十餘日熱結在裏往來寒熱亦

用大柴胡湯無表裏證發熱七八日脉雖浮數可下
大柴胡若大便難身微熱者大柴胡急下○太陰腹
滿時痛甚者桂枝加大黃湯○少陰口燥咽乾而渴
大承氣急下之若口乾燥下利清水心下痛者為積
證亦用承氣湯又少陰證六七日腹脹滿不大便用
承氣湯又少陰惡寒而踈時煩不欲衣被為表寒裏
熱大柴胡下之○厥陰脉沉短舌卷囊縮為毒氣入
臟承氣湯下之若厥冷耳聾囊縮而脉沉弦者為少

陽厥陰兩感不治有本條又厥陰下利譫語脉不微細與小承氣湯

變溫法

○太陽發汗漏不止惡風小便難四肢急難屈伸桂枝加附子湯太陽發汗後病不解而惡風者虛也芍藥甘草附子湯又太陽汗後或下後病不解而煩燥者伏苓四逆湯又太陽心中悸而煩燥小建中湯又太陽七八日脉細惡寒為陰陽俱虛並不可汗下其

人素無熱者芍藥甘草附子湯素有熱者黃耆建中湯又太陽病八九日風濕相搏身煩疼難轉側不嘔渴脉浮虛而濇桂枝附子湯若大便硬而小便自利者去桂加白朮又太陽風濕相搏骨節疼煩身體微腫不能屈伸汗出短氣惡風而小便不利者甘草附子湯○陽明病反無汗皮上如蟲行者為久虛可溫之用朮附湯黃耆建中湯此非冬陽明無汗證也當加體認

傷寒傷風脉證

傷寒無汗惡寒攻

緊濇浮兮慘在容

自汗惡風浮緩脉

面光不慘是傷風

○傷風脉浮而緩自汗惡風頭疼面光發熱煩燥手

足不寒熱勝於寒耳風傷衛氣表虛自汗法當解肌

桂枝湯敗毒散獨活散人參羌活散可選用之若項

背強桂枝加葛根湯裏寒不飲水者桂枝去芍藥加

附子湯或加乾薑臍滑者和解散若鼻塞通關散

或發汗漏不止而惡風四肢拘急桂枝加附子湯壯
熱煩燥人參羌活散參蘇飲或天麻防風丸薄荷泡
湯調下脉濡緊自汗勿用桂枝湯當用小建中湯○
傷寒脉浮而緊無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足
微寒寒勝於熱耳寒傷榮氣表實無汗法當發汗麻
黃湯麻黃葛根湯人參順氣散可選用之頭痛甚者
葱白湯或熱多寒少脉弱無陽只用桂枝二越婢一
湯或喘急者可與麻黃湯尺脉遲而血少者黃耆建