

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷三十三



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷三十一

崩漏

錢塘魏之琇撰

蘇立齋治一婦人性急易怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛則胎滿不酸母病生余經行不止此皆肝火之症

肝自痛則外症見土火克則內症作先以四物加白

朮茯苓柴胡炒梔炒龍膽清肺養血次用四君加柴

胡白芍神麴吳茱萸炒黃連以培土制肝漸愈惟月經不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散倍用白朮茯苓陳皮又以補中益氣加酒芍兼服而安

一婦人懷抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上涌月經頻數薛曰脾統血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血歸源耳用補中益氣濟生歸脾而愈

一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛症悉具面色痿黃薛曰心主血蓋由去血過多心無所養

以致作痛宜用十全大補湯參朮倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

大尹王天成之內久患崩自服四物涼血之劑或作或輟因怒發熱其血不止服前藥不應乃主降火更加脇腹大痛手足俱冷薛曰此脾胃虛寒所致先用附子理中湯體熱痛止又用濟生歸脾補中益氣二湯崩血頓愈若泥痛無補法則誤矣

錦衣楊永興之內患血崩過服寒涼之劑其症益甚更

加肚腹悶痞飲食不入發熱煩躁脉洪大而虛薛曰
此脾經氣血虛而發躁也當急用八珍湯加炮薑以
溫補之緩則不救不信仍服止血降火之劑虛症蜂
起始信其言緩不及治矣

一婦人因怒崩血久不已面青黃而或赤此肝木制脾
土而血虛用小柴胡合四物清肝火生肝血又用歸
脾補中二湯益脾氣生肝血而瘥此症若因肝經風
熱而血不寧者防風為丸以兼症之藥煎送或肝經

火動而血不寧者炒條苓為丸以兼症之藥煎送若
瘀血為患用五靈脂為末燒銕器焙酒調服無不効
者

周暉內人病血山崩諸醫皆危之劉春齋用當歸一兩

荊芥一兩酒一鍾水一鍾煎服立止如神

續金陵
瑣事

易思蘭治一婦患崩晝夜十餘次每次去血升許用止
血藥愈甚卧牀月餘羸瘦食少面青爪黑氣促痰喘
診之心脉平和肝脉弦大時一結肺脉沉而大且有

力脾胃脉沉濇兩尺沉而無力曰此氣鬱病也詢之
果因午餐小婢忤意發怒構疾隨以四神散與之服
藥半盂未及一時頓覺神爽易曰未也明日子時分
指甲變桃紅色方可救至期甲色果紅復診之左三
部如前肺脉微起脾胃雖沉緩而不濇二尺仍舊謂
其家曰午時血當大崩毋得驚惶以駭病者至期果
然下紫黑血塊數枚自此遂止後用壯真五和丸調
理月餘全愈次年生子方用四神散以香附行氣為

君烏藥為臣蘇梗通十二經之闕竅白芷化腐血生
新血為佐加當歸引氣入心而生新血川芎引氣入
肝舒肝之鬱而去舊納新神麴引氣入脾暢脾結而
統新血白朮健脾胃而和中氣為使以行氣為主活
血輔之此治血先調氣之法也

吳孚先治俞氏婦血淋念載已成痼疾因幼孫出痘危

險忽下血兩晝夜不止汗瀉交作暈數次

思慮恐懼
三陰並傷

也脉向弦大而革者忽變而數疾欲脫奄奄一息用

人參黃耆各一兩製附炮薑棗仁各三錢五味龍骨
各一錢或疑附子太熱且謂何不用血藥曰血脫補
氣古人精義謂有形之血不能速生幾微之氣所當
急固又脾胃氣血俱喜熱而惡寒薑附宜服也二劑
脉漸轉前方加歸芍等血藥症已除然脉氣不弦非
三年調攝未易復也自後參耆不輟計服補劑六百
餘帖膏丸數料而起并宿疾亦瘳

一婦半月前小產繼以血崩舌硬心搖汗出髮潤日夜

俱熱耳閉不聞目視不見身浮浮如在舟車六脉細
數欲脫用人參二兩黃耆二兩白朮一兩熟地二兩
當歸五錢炮薑製附棗仁各三錢龍骨一錢五分一
劑頓減二劑精神爽慧

陸養愚治王笠雲母年四十九經事已止半年一日忽
暴至不止昏暈厥逆脉之兩手沈微如絲急以八物
湯加附子薑灰煎灌之半時方醒連進二大劑乃止
十之七八至十劑六日方止後數月復崩亦昏暈或

以犀角地黄湯加藕節阿膠之屬不止脉仍沈弱以附子乾薑鹿茸俱燒存性同釜底墨酒調服之即止後以六味加四物料服之約二斤一年不作次年八月間又暴至昏暈更久脉之如舊仍以八物湯加附子連進二劑昏暈自晡至晚未醒咸謂必死診之決其必甦蓋氣血暴脫一時至未能與胃氣相迎耳或投以牛黃丸至半夜人事稍省而血尚未止明早復診之仍判八物湯少加薑附二劑或造至云昨夜之

甦乃牛黃丸之功公實不知也向因屢服參附致屢
崩今人事既省斷宜順氣行瘀去其病本豈可復蹈
前轍曰昨早投大補之藥即不服牛黃丸亦甦此等
脉症急宜續投參著少緩恐成不救況可更以他藥
乎或乃怫然而去曰讀父書而坑趙卒天下每多此
人陸令先服煎劑隨製存性附子等灰午後人事更
爽進粥晚投末藥一服夜間血少止明日又湯散並
投血遂止再服前湯十劑而瘳

立齋治一婦人飲食因怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口
禁如癰瘰然吐痰如涌灌以二陳柴胡山梔枳殼吐
出酸味神思稍醒藥止次日進薄粥少許但乳脇脹
痛此悉屬肝火熾盛致脾氣不能運化先用六君柴
胡山梔鉤藤諸症頓退惟四肢不遂血崩如初或又
為肝火未息欲投清肝涼血之劑此肝脾氣血俱弱
先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經又用四物
參朮柴胡養肝經而四肢便利

餘見異
症名要

一婦人月經淋瀝無期作鬱怒傷肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣與歸脾湯逍遙散二藥四劑而愈

一婦人因怒經事淋瀝半月方竭遇怒其經即至甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰瘕抽搦上視作肝火熾盛以小柴胡加鈎藤黃連熟地山芑而愈

王執中治皮匠妻患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服少減而未斷因檢得耆域方如聖散用椶櫚烏梅乾

薑各一兩煎燒存五分性為末每服二錢食前烏梅

湯調下合一劑與服而疾平患甚者不過三服

資生經

有巡撫夫人年踰五十因傷寒而血崩與膠艾四物湯

一服漸愈後因勞復大作與鎮靈丹十五丸而止或

無此丹燒鹿角存性為末酒調服亦佳屢驗

全上

陳良甫治一婦人崩漏暴下諸醫投薑附桂等藥服之

愈甚診之六脉緊數遂用金華散兼局方龍腦雞蘇

丸數服即安本事方單用黃芩者亦此意也

良方

一親戚婦人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲嘶服諸藥無効診之六脉微濡問服何藥云凡是當歸川芎滋血諸品丹藥服之皆不作效遂合溥濟方伏龍肝散兼白礬丸服之愈

全上

繆仲淳治董清山夫人患血崩由于中年鬱怒百藥不效用大劑參耆令覓胎髮百餘丸火煨調入藥服久之漸愈煨髮用小砂罐鹽泥煉極熟將髮入罐中封固陰乾以炭火圍之俟黑烟將盡即起若青烟出髮

枯不可用矣非細心人不可任蓋火候不可過也

王肯堂曰徐朝奉傳其內人有血崩症服諸藥不效用

香附炒為末每服二錢米飲調下服後遂痊

未選

一親戚黃卿內子凌夫人忽苦血崩百藥不效用五靈

脂一味不拘多少炒令烟盡研末每服一錢溫酒調

下旋服遂安

蔣仲芳治毛氏婦經來淋瀝不斷已經三月涼血止血之藥服至五六十劑不效而口乾唇燥愈甚脉來微