

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷六十五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷六十五

女科

胎前
產後
月事
胎法
胎前
產後
月事
胎法

明 王肯堂 撰

名始胚飲食精熟酸美

正 姙娠一月足厥

欽定四庫全書

證治準繩

陰脉養不可針灸其經

如大敦行間太衝中封五里中郄等穴是也

足厥陰

內屬于肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事

寢必安靜無令恐懼

妊娠一月陰陽新合為胎寒多

為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安

之宜服

烏雌雞湯

烏雌雞

一隻治如食法

茯苓

阿膠

各二兩

吳茱萸

一升麥門冬

五合去心

人參

芍藥

白朮

各三兩

甘草

生薑

各一兩

右㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎
取三升內酒三升并膠烱盡取三升放溫每服一升
日三

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此 細辛一兩防風

二兩熟地黄 白朮各三兩生薑四兩吳茱萸 大麥各五兩

合一升烏梅

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服先食服
寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根二兩

若有所思去大麥加柏子仁三合一方有人參一兩

妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節

皆痛是為胎始結 妊娠二月足少陽脉養不可針灸

其經如膽竅丘墟付陽絕骨外立陽陵泉等穴是也足少陽內屬於膽膽主精

二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也 妊娠二月

始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所

動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱宜

服

艾葉湯 艾葉 丹參 當歸 麻黃各二兩 人參 阿

膠各三兩 甘草一兩 生薑六兩 大棗十二枚

右九味㕮咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服一方用烏雌雞一隻宿肥者治如食法割頭取血內三升酒中相和次以水一斗二升先煮取汁去雞內藥煎取三升內血酒并膠煎取三升分三溫服

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此 黃連 人參

各一兩 吳茱萸五合生薑三兩生地黄五兩一方用阿膠

右五味㕮咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜
一十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者
不用漿直用水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生
男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲
子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也 妊娠三月

手心主脉養不可針灸其經如中衝勞官大陵內關間使却門曲澤等穴是也

手心主內屬於心哀悲母思慮驚動 妊娠三月為定
形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔
怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍若痛或腰背卒有所下
宜服

雄雞湯

雄雞

一隻治如食法

黃芩

白朮

生薑

各一兩

麥門

冬

五合

芍藥

大棗

十二枚擘

甘草

人參

茯苓

阿

膠

各二兩

右為呔咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取

半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當

溫卧一方用當歸芎各一兩不用黃芩生薑

茯神湯 曾傷三月胎者當預服此方 茯神 丹參

龍骨各一兩 阿膠 當歸 甘草 人參各二兩 大棗

二十一 赤小豆二十一 枚一 擘一粒

右九味㕮咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服

七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩

深師有薤白二兩麻子一升

丹一婦人但有孕至三箇月左右必墮其脉左手

大而無力重取則漚知其血少也以其妙年只補中
氣使血自榮時初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末一
錢與數十貼得保全而生因思之墮於內熱而虛者
於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月上屬相
火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠為安胎妙藥
也 婦人經候三月驗法川芎生朮濃煎湯空心下
一匙腹中微動者是有胎

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是

謂盛氣血以通耳目而行經絡 妊娠四月手少陽脉

養不可針灸其經

如關衝陽池內關三陽天井曲垣等穴是也

手少陽內輸

三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲食有熱

小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱

或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上逼胸心煩不得

安卒有所下宜服

菊花湯

菊花

雞子大一團

麥門冬

升一大棗

十二枚

人參

半一兩

甘草

當歸各二兩

麻黃

阿膠各三兩

半夏四兩

生薑

五兩

右十味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此

白芍藥

生薑各四兩

厚朴

生李根白皮

枳實

白朮

柴胡各三兩

續斷

芎藭

甘草各一兩

當歸

一兩

半

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

一八日後復一劑

妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深

其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹

牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟 妊娠五月

足太陰脉養不可針灸其經

如隱太白都公孫商丘三陰交漏谷陰陵泉等穴是

也足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大饑無

甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦 妊娠五月有熱
苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四
肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下宜
服

阿膠湯

阿膠

四兩人參

一兩生薑

六兩當歸

芍藥

甘草

黃芩

各二兩

旋覆花

二合

吳茱萸

七合麥門冬

一升

右十味㕮咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠

微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不

瘕再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水
煮雞汁煎藥減半內酒并膠煎取三升半分四服

安中湯 曾傷五月胎者當預服此

黃芩一兩 當歸一兩 芎藭 乾地黄 人參各二兩 甘草

芍藥各三兩 生薑六兩 麥門冬一升 五味子 大麻仁各五兩

大棗三十枚

右十二味㕮咀以水七升清酒五升煮取三升半分
四服日三夜一七日復服一劑

安胎當歸湯 若妊娠五月舉動驚愕胎不安小腹痛

引腰脇小便下血 當歸 阿膠炒 川芎 人參各

兩 大棗十二枚 艾葉一把

右以酒水各三升煮至三升內膠令烊分三服一方
有甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出
遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂
變腠理紂筋以養其力以堅背脊 妊娠六月足陽明

脉養不可針灸其經

如厲兌豐隆陰市上下廉三里等穴是也

足陽明內屬

於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美

無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹

滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服

麥門冬湯

麥門冬一升人參

甘草

黃芩

各二兩

乾地

黃

三兩

阿膠

四兩

生薑

六兩

大棗

十五枚

右八味以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三

升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煎汁煎