

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百五十六



南京中医药大学图书馆版权所有

普濟方卷一百五十六

周王朱橚撰

產難門

總論

婦人以血為主
 血旺則氣順
 氣順則胎安
 胎安而後生理和
 本富貴之家
 往往得產
 母多悲恐
 運動故禁出入
 專坐
 前息氣閉
 而不舒快
 則必凝而不流暢
 產不轉動

育日夕勞苦血氣舒暢生理甚易何俟乎藥則孕貴於運動者明矣次則產婦妊娠已經六七箇月胎形已具而世人不知禁忌恣情交合嗜慾不節使敗精淤氣聚於胞中致令子損母傷臨產必難二也何以知之生下兒子頭上有白膜一片滯膩如膠俗強名曰戴白生兒身有青有黑俗強名曰宿痣此是入月交合所致也如此則不特母病其子一生浸淫赤爛瘡瘍俗謂之胎蛆動逾歲月不差三則臨蓐太早傷筋骨或信巫卜或說鬼

崇多方誤恐致令產母心驚神恐憂惱怖懼又為閑雜婦人喪孝穢濁之人衝觸若不預為杜絕臨產必難三也何以知之如偷生之女不正之屬既無產厄子母均安其理可知凡臨產初時腹痛或作或止名曰弄痛穩婆踈率不候時至便令試水試水頻洩胞漿先破風颯產門產道乾澀及其兒轉便令坐草太早兒轉亦難致令產難四也直候痛極眼中如火此是兒逼產門方用坐草即令易產如坐草稍久用力太過產母困睡抱

腰之人又不穩當致令坐立傾側胎死腹中其為難產
五也時當盛暑宜居深幽房屋當常令坐立開啓窓戶
多貯清水以防血暈血悶血溢妄行血虛發熱之症如
冬末春初天色凝寒宜密閉塞產室窒塞罅隙内外生
火常令煖氣如春仍令下部衣服不可少綿方免胎寒
血結無致產難六也

經驗方云婦人產難重事也凡產婦入月切忌飲酒呌
怒臨產時先脫尋常所着衣以籠井口則易產亦衣易

下不可令人喧擾及作倉忙之狀止令老成在旁扶持
看待產母惟當食軟飯粥之類初覺微痛而不甚名曰
弄痛不可便行試水探聽產母坐卧切須熟忍或服催
生符藥却不可曲腰眼垂連腰引動眼中如見火色此
是兒轉又須令人扶策徐徐而行若行步艱即凭物立
須臾扶策再行直立至連相引陣痛頻頻又服催生符
藥免強扶行痛轉甚難於行立認是產時將至然後安
詳坐草上草之時切勿太早恐兒在腰中難於轉側及

胞漿先破子道乾澁皆致難產務要產婦惜力心中熱悶先以蜜一匙新汲水調下若熱悶未已以生鷄子一箇打破吞服直待兒逼產門頭端正然後令人抱腰其抱腰之人不得傾斜則兒順其理自然易產新產下便以新汲水令產母徐啜三二呷以涼心經不致敗血上行可省百病又有卧產者須待卧定皆平着席體不偃曲則兒不失道如能依此節度必無難產之理纔得分娩切忌問是男是女且服壓血藥仍令人用手或物從

心下按至臍腹惟宜避風房內常淬醋煙以防暈悶○
儒門事親書收產胎論云有一孕婦年十八歲臨產召穩
媼三人其二極拽婦之臂其一媼頭抵婦之腹中以兩
手扳手腰極力為之胎死於腹良久乃下兒亦如血乃
穩媼殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎其婦因茲經
脉斷閉腹如刀刺大渴不止小溲悶絕主病者禁水不
與飲口舌枯燥牙齒黧黑臭不可聞飲不下昏憤欲
死戴人先以雪水恣令飲之納二升許痛緩渴止次舟

車九通經散前後五六服下數十行食大進仍以桂苓
甘露飲六一散柴胡飲子等調之○又論云凡婦難產
者皆因燥澀致臟腑不得開通宜先於降誕之日入月
之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一
切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石
滑胎故也

凡人生產先知此十一產證候則生產之婦永無傷損性
命生產之間性命最重幸而孩子易生人不知福萬一

有少艱難則湏臾之間子母之命懸於絲髮但世人所
患者惟在生產收生之人少有精良妙手緣此多有損
命因傷其事為十一產論一曰正產者蓋婦人懷胎十
月滿足陰陽氣足忽然腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷
至於臍腹疼痛極甚乃至腰間重痛穀道挺出迸繼之
漿破血下兒子遂生此名正產二曰傷產者蓋婦人懷
胎忽有七月八月而產或至九月十月而產忽有經一
年二年及四年五年而後產今獨以十月滿足為正產

蓋一人之生陰注陽定各有時日不可改移今有未產
一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無時是名試
月非正產也但一切產母未有前面正產候即不可令
人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛
兒身未順收生之人却教產母虛亂用力兒身纔方轉
動却被產母用力一逼遂使兒子錯路忽橫忽倒不能
正身皆緣產母未當用力之所致也凡產母用力須待
兒子順身臨逼產門始用力一迸令兒下生此方是產

母用力得當也未有正產之候而用力太早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗而助之長非獨無益而又害之此名傷產三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛甚兼腰重是正產之候但兒却未生即可服藥以產之或有腹痛數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下生此名催產四曰凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母血經得冷則凝結而不散因其血之不散以致

兒子不能生下此之一弊為害最深然世人不知覺若
冬產婦下部不可脫却綿衣并不卧坐寒冷之處當滿
房着火令遍方常有暖氣常令產母背身向火令臍下
腿膝間常有暖氣若背上心前少間寒冷須是暖炙綿
衣以包之貴其血得熱則流散使兒子易生此名凍產
若春秋之間天地有陰濕寒冷之氣亦可房中以微炭
火煖為妙五曰熱產者蓋言盛暑之月欲產之婦當要
其溫涼得所不可因熱恣意取涼及有傷損胎氣又生

產之處不可多著人數切忌人多熱氣逼襲產母蓋人之血氣得熱則散熱過則損今當夏暑炎熱之盛而產母氣虛則其血得熱而上蒸能令產母發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈者因此而成也若產於夏月時少有清涼之氣陰雨之變產母不可任取涼恐生大病六曰橫產者蓋兒子下先露其手或先露其臂此因未當用力而產母用力之過也臍腹疼痛兒身未順若是產母用力一遍遂致身橫而不能生不

幸而有此證候當令產母安然仰卧令看生之人推兜
入去凡推兜之法先推其兜身令直上漸漸通手以中
指摩其肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之須是
產母仰卧然後推兜直上徐徐正之候其身正門路皆
順煎催生藥一盞令產母吃了方可令產母用力令兜
下生此名橫產若看生之人非精良妙手不可依此法
恐恣其愚以傷人命七曰倒產者蓋因其母胎氣不足
關鍵不牢用力太早致令兜子不能回轉順生便只直

下先露其足也治之之法當令產母於床上仰卧令看
生之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚
恐候兒自順若久不生却令看生之人輕輕用手內入
門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸漸順下直
待兒子身轉門路正當然後煎催生藥令產母服一盞
後方始用力一逼令兒生下此名倒產若看生之人非
精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命八曰偏
產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正却被產母用

力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿反無從用力致令兒雖近人門而不能生下但云兒已露頂然不知兒之所露却非頂也或左額角或右額角而已謂兒頭偏柱一畔以此不能收治之之法當即令產母仰卧令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向人門然後令產母用力一逼即便兒子生下即令兒却只露額當令看生之人以一件綿衣炙令溫暖用裹手急於穀道或是小兒之後骨偏柱穀道外旁輕而推