

欽定四庫全書

子部

傷寒明理論卷三論方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

傷寒明理論卷三

搖頭第三十七

金成無已 撰

傷寒搖頭何以明之頭者諸陽之會也諸陽之脉皆上
於頭諸陰脉皆至頸胃中而還陽脉不治則頭為之搖
傷寒搖頭有三皆所主不同也有曰搖頭言者裏痛也
以裏有痛者語言則劇欲言則頭為之戰搖也有曰獨

搖頭卒口噤背反張者瘕病也以風盛於上風主動搖故也裏痛非邪也痛使之然瘕病非逆也風使之然至於陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者又謂之心絕蓋心藏神而為陰之本陽根於陰陰根於陽陰陽相根則榮衛上下相隨矣絕則神去而陰竭陽無根者則不能自主持故頭為之搖矣王冰曰滋苗者以固其根伐下者必枯其上內絕其根外作搖頭又何疑焉心絕者真病也風瘕裏痛者邪氣也觀其頭搖又當明其臧否焉

痹癰第三十八

傷寒痹癰何以明之痹者筋脉急也癰者筋脉緩也急者則引而縮緩者則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰痹癰俗謂之搐者是也黃帝內經曰病筋脉相引而急名曰痹癰痹謂若契合之契也行則緩卧則緊從則縱癰疾之縱者謂若放縱之縱也以急為痹以緩為癰理至明矣痹癰者風疾也而癰癰則痹癰焉傷寒痹癰者邪熱氣極也熱盛則風搏併經絡風主動故四肢痹

癰而不寧也故風溫被火者曰發微黃色劇者如驚癇
時癰癰言其熱氣之劇盛也傷寒病至於發癰癰者疾
勢已過矣多難可制內經曰太陽終者戴眼反折癰癰
絕汗乃出大如貫珠著身不流是見其癰癰為已過之
疾也又有四肢熱習為四肢動而不止似癰癰而無力
不得伸縮者也此為肝絕癰癰之證雖難已若能以祛
風滌熱之劑折其大熱則癰癰亦有生者若妄加灼火
或飲以發表之藥則死不旋踵經曰一逆尚引日再逆

促命期

不仁第三十九

傷寒不仁何以明之仁柔也不仁謂不柔和也痒不知也痛不知也寒不知也熱不知也任其屈伸灸刺不知所以然者是謂不仁也由邪氣擁盛正氣為邪氣閉伏鬱而不發榮衛血氣虛少不能通行致斯然也內經曰榮氣虛則不仁針經曰衛氣不行則為不仁經曰榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁即是言之知榮衛

血氣虛少不能通行為不仁者明矣經曰諸乘寒者則為厥鬱冒不仁言此厥者是正氣為寒氣所乘為厥氣也非四肢逆冷之厥也何者蓋以鬱冒為昏冒不仁為不知痛痒得不為尸厥之厥耶經曰少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥其乘寒之厥鬱冒不仁即此尸厥可知矣昔越人入號診太子為尸厥以鬱冒不仁為可治刺之而得痊濟者實神

醫之診也嗚呼設或脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁此又為命絕雖越人其能起之歟

直視第四十

傷寒直視何以明之直視者視物而目精不轉動者是也若目睛轉者非直視也水之精為志火之精為神目者心之使也神所寓焉肝之外候也精神榮焉鍼經曰五藏六府之氣皆上注於目而為之精精之窠為眼之睛精為瞳子筋之精為黑睛血之精為絡氣之精為白

睛肌肉之精為約束裏擷筋骨血氣之精與脉并為系
上屬於腦五藏血氣調和精氣充榮則目和而明矣傷
寒目直視者邪氣擁盛冒其正氣使神智不慧藏精之
氣不上榮於目則目為之直視傷寒至於直視為邪氣
已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗汗出則額
上陷脉急緊直視不能眴不得眠以肝受血而能視亡
血家肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所
致也此雖錯逆其未甚也逮乎狂言反目直視又為腎

絕直視搖頭又為心絕皆藏氣脫絕也直視譫語喘滿者死下利者亦死又劇者發則不識人循衣摸床惕而
不安微喘直視脉弦者生濇者死皆邪氣盛而正氣脫
也其或有目中不了了睛不和無表裏證大便難身微
熱者是非直視也此為內實也可用大承氣湯大柴胡
湯下之直視為不治之疾目中不了了為可治之候二
者形證相近其為二者宜熟視之

鬱冒第四十一

傷寒鬱冒何以明之鬱為鬱結而氣不舒也冒為昏冒而神不清也世謂之昏迷者是也鬱冒之來皆虛極而乘寒則有之矣經曰諸乘寒者則為厥鬱冒不仁又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也是知因虛乘寒乃生鬱冒金匱要略曰新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒三者大便難亡血復汗寒多故令鬱冒又曰產婦鬱冒其脉微弱嘔不能食大便堅所以

然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出即此觀之鬱冒為虛寒可知矣又或少陰病下利止而頭眩時時自冒者又為死證蓋謂其虛極而脫也觀其鬱冒幸無忽焉

動氣第四十二

傷寒動氣何以明之動氣者為築築然動於腹中者是矣藏氣不治隨藏所主發泄於臍之四旁動跳築築然謂之動氣難經曰肝內證臍左有動氣按之牢若痛心

內證臍上有動氣按之牢若痛肺內證臍右有動氣按之牢若痛腎內證臍下有動氣按之牢若痛是藏氣不治腹中氣候發動也動氣應藏是皆真氣虛雖有表裏攻發之證即不可汗下經曰動氣在左不可發汗汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤是發汗而動肝氣者也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱卧則欲蹠是下之而動肝氣者也動氣在上不可發汗汗則氣上衝正在心端是發汗而動心氣者也動氣

在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲
得水自灌是下之而動心氣者也動氣在右不可發汗
汗則衄而渴心苦煩飲即吐水是發汗而動肺氣者也
動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心
悸是下之而動肺氣者也動氣在下不可發汗汗則無
汗心中大煩骨節苦痛目運惡寒食則反吐穀不得下
是發汗而動腎氣者也動氣在下不可下下之則腹脹
滿卒起頭眩食則下清穀心下痞是下之而動腎氣者

也且脾內證當臍有動氣經特曰臍之四旁動氣不可
汗下獨不言脾候當臍有動氣者以脾者中州為胃以
行津液發汗吐下猶先動脾况脾家發動氣者詎可動
之也所以特不言之也傷寒所以看外證為當者蓋不
在脉之可見必待問之可得者發汗吐下務要審諦舉
此動氣類可知矣

自利第四十三

傷寒自利何以明之自利者有不經攻下自然溏泄者

謂之自利也傷寒自利多種須知冷熱虛實消息投湯
無致失差雜病自利多責為寒傷寒下利多由協熱其
與雜病有以異也表邪傳裏裏虛協熱則利不應下而
便攻之內虛協熱遂利是皆協熱也又合病家皆作自
利太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之太陽與少
陽合病必自下利黃芩湯主之陽明與少陽合病必自
下利大承氣湯主之三者皆合病下利一者發表一者
攻裏一者和解所以不同者蓋六經以太陽陽明為表