

中草药参考资料

江苏省医学会编

一九七六年十二月

PDG

毛主席语录

阶级斗争是纲，其余都是目。

思想上政治上的路线正确与否是决定一切的。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

要把中医中药的知识和西医西药的知识结合起来，创造中国统一的新医学新药学。

前 言

遵照伟大领袖和导师毛主席关于“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示，从巩固和发展合作医疗、赤脚医生这两个社会主义新生事物，推动中草药群众运动的深入发展，从战备和防震抗震医疗卫生工作的需要着眼，我们将各地提供的单方、验方、中草药制剂、针灸、新医疗法等有关资料汇编成《中草药参考资料》，供各级医务人员临床参考用。希各地在医疗实践中，注意总结经验，继续提供有关这方面的资料，协助我们做好汇编工作，更好地为社会主义革命和社会主义建设服务。

目 录

(一)单方 验方

一、骨折·····	1
二、截瘫、截瘫合并症·····	6
三、软组织损伤·····	10
四、抗感染·····	18
五、止血·····	21
六、烫伤、烧伤·····	25
七、褥疮·····	27
八、破伤风·····	29

(二)中草药制剂

一、新抗炎注射液·····	30
二、复方半丁注射液·····	31
三、野菊花注射液·····	32
四、鸡屎藤注射液·····	33
五、大蒜注射液·····	33
六、大蒜素注射液治疗截瘫并发尿路感染·····	34
七、大蒜合剂外敷治疗急性化脓性感染·····	36
八、地龙治疗骨折·····	36

九、治伤止痛的接骨草·····	37
十、四季青治疗褥疮·····	37
十一、枫杨树叶治疗急性菌痢·····	38
十二、大蒜液灌肠治疗菌痢·····	38
十三、黄连素穴位封闭治疗腹泻·····	39
十四、鬼针草治疗71例肠道疾病·····	40

(三)针灸 新医疗法

一、中西医结合治疗震伤·····	41
二、新医疗法对地震外伤的应用·····	44
三、针刺治疗腰椎损伤引起的截瘫·····	47
四、新针疗法治疗弛缓性截瘫·····	47
五、中医中药治疗外伤性截瘫·····	48
六、新医疗法治疗坐骨神经挫伤·····	50
七、外伤急救止痛消炎常用穴位·····	51

(一)单方、验方

一、骨 折

1. 活血续骨合剂:

〔处 方〕 当归4.5克 川芎4.5克 甘草4.5克 红花9克 赤芍9克 地鳖虫6克 自然铜15克 川断12克

〔制 法〕 以上为成人一日剂量,按比例制成合剂。

〔功能主治〕 活血化瘀,益肾接骨。主用于骨折。

〔用法用量〕 每服50毫升,一日二次,十天为一疗程,约服二至三个疗程。

〔疗 效〕 治疗骨折15例,除用小夹板固定外,服此合剂三周后摄片复查,大部分骨折部位的骨痂已形成,有的已全部愈合。

〔资料来源〕 南通市中医院。

2. 接骨片:

〔处 方〕 地鳖虫500克 自然铜2500克 乳香500克 没药500克 人中白500克 骨碎补1000克 煅硼砂500克 全当归1000克 川断1000克 太子参2000克 龟壳(或龟板)2000克 制木鳖子250克 陈皮1000克 砂糖3210克

〔制 法〕 将自然铜醋煅七次,另研极细末,砂糖化成糖浆。其余拣净打粉过细筛,用糖浆制成颗粒,烘干压0.5

克片。

〔功能主治〕 祛瘀、续骨。用于骨折瘀肿疼痛。

〔用法用量〕 内服：每日三次，每次三片。

〔资料来源〕 苏州市中医院

3. 接骨丸：

〔处 方〕 地鳖虫 血竭 骨碎补 川断肉 当归
乳香 没药 自然铜 各等份。

〔制 法〕 上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克。

〔功能主治〕 活血化瘀，理气止痛，续筋接骨。适用于骨折损伤。

〔用法用量〕 每服一丸，每日两次，开水或黄酒送服。

〔疗 效〕 治疗16例，4—6天内消肿止痛，并有促进骨组织愈合作用。

〔资料来源〕 徐州地区医院。

4. 跌打万金丸：

〔处 方〕 乳香60克 苏木60克 没药60克 自然铜
60克 地龙60克 当归60克 大黄30克 无名异60克 硼砂
30克 地鳖虫60克 骨碎补30克 马钱子30克（去毛、炮）

〔制 法〕 拣净研极细末，制蜜丸，每粒重3克。

〔功能主治〕 定痛祛瘀。适用于跌打损伤，筋断骨折，疼痛不止。

〔用法用量〕 一日两次，每次一粒。

〔禁忌症〕 孕妇忌服，开放性骨折慎用。

〔资料来源〕 南京市中医院。

5. 外用接骨止痛粉：

〔处 方〕 肉桂30克 自然铜(醋煅)250克 炮山甲30克 地鳖虫30克 延胡索60克 乳香30克 没药30克 丹参250克

〔制 法〕 上药拣净杂质，晒或烘干，共碾细末。

〔用 法〕 将骨折复位后，取药粉适量，加醋调敷骨折处，纱布绷带包扎，小夹板固定，七天换药一次。

〔疗 效〕 经多年使用，疗效显著。

〔资料来源〕 高邮县车逻公社和合大队合作医疗。

6. 骨折内服方：

〔处 方〕 地鳖虫250克 红花60克 当归180克 苏木250克 乳香120克 没药120克 骨碎补120克

〔制 法〕 上药共碾细粉，水泛为丸。

〔功能主治〕 活血化瘀，接骨镇痛；治疗骨折外伤，瘀血肿痛。

〔用法用量〕 每日三次，每次6—9克。

〔疗 效〕 经多年使用，疗效显著。

〔资料来源〕 高邮县车逻公社和合大队合作医疗。

7. 骨折1号合剂：

〔处 方〕 广木香7810克 泽兰15620克 泽泻15620克 蚤休15620克 酒精10000毫升 糖精18克

〔制 法〕 将广木香、泽兰、泽泻、蚤休煎汁渗漉回收浓缩30000毫升，加苯甲酸钠60克，尼泊金 9 克分装100—200毫升瓶，封口。

〔功能主治〕 去瘀活血止痛，适用于骨折外伤初期。

〔用法用量〕 内服每日三次，每次30毫升。

〔资料来源〕 苏州市中医院。

8. 接骨止痛散：

〔处 方〕 地鳖虫 9 克 骨碎补 9 克 延胡索12克
参三七 6 克

〔制 法〕 上药洗净，晒或烘干，共碾细粉，过 120 目筛。

〔功能主治〕 活血镇痛，治疗骨折外伤，瘀血肿痛。

〔用法用量〕 每日早、晚各服一次，每次3—6克，开水或黄酒吞服。

〔疗 效〕 骨折复位后，配合外用药治疗，效果明显。

〔资料来源〕 高邮县人民医院。

9. 活血散：

〔处 方〕 刘寄奴2000克 虎杖2000克 生南星2000克
地鳖虫1000克 黄柏 1000 克 半枝莲 2000 克 地肤子
2000克

〔制 法〕 共研极细末，过筛。

〔功能主治〕 活血祛瘀，消肿定痛。适用于损伤、骨折、脱位的中期。

〔用法用量〕 将药末与饴糖或米醋调匀成膏状，外敷患处。

〔禁忌症〕 有伤口者禁用。

〔资料来源〕 南京市中医院。

10. 损伤接骨散：

〔处 方〕 生白附子60克 白芷30克 防风30克 生南星30克 生川乌60克 血竭15克 大黄30克 羌活30克 肉桂30克 芙蓉叶120克 紫荆皮120克 红花120克 地骨皮120克 生草乌60克 地鳖虫30克 北细辛30克 制乳没各30克 黄柏60克

〔制 法〕 共研极细末。

〔功能主治〕 散瘀消肿，活血镇痛，舒筋接骨，适用于筋骨折伤肿痛。

〔用法用量〕 用适量药粉与黄酒调敷患处。禁内服。

〔资料来源〕 南京市中医院。

11. 接骨散：

〔处 方〕 真血竭 活地鳖虫 自然铜(醋煅七次) 甜瓜子 各等份

〔制 法〕 共研细末，再用透骨草三分之二，醋三分之一捣烂成糊状。

〔功能主治〕 有舒筋活血，消瘀止痛，促进骨质生长的功能，适用于外伤骨折，血瘀肿痛。

〔用法用量〕 在骨折整复后，用此散调敷患处。

〔禁忌症〕 开放性骨折及孕妇忌用。

12. 接骨膏：

〔处方〕 水牛角粉250克 地鳖虫90克 川椒粉1.5克 血余炭120克 老陈醋2000克 杨树叶 30 片 榆树皮适量 黄米粉适量

〔制法〕 上药共研极细粉末。另取醋煮沸后，将上药粉和入，调成糊状。

〔功能主治〕 活血化瘀，续骨定痛，适用于骨折血瘀肿痛。

〔用法用量〕 将此药膏，摊于牛皮纸上，贴在患处，外用绷带或加夹板固定。

〔禁忌症〕 开放性骨折和孕妇忌用。

二、截瘫、截瘫合并症

1. 截瘫饮：

〔处方〕 黄芪30克 党参15克 当归24克 红花9克 桃仁9克 鸡血藤30克 牛膝15克 川断15克 骨碎补12克

〔制法〕 加水煎成300毫升。

〔功能主治〕 腰椎损伤引起截瘫。

〔用法用量〕 一日二次分服。

〔疗效〕 治疗三例，服药三周配合针刺，下肢已产生感觉。

〔资料来源〕 徐州地区医院。

2. 弛缓性截瘫基本方:

〔处 方〕 当归60克 丹参60克 山甲30克 蜈蚣30克 牛夕30克 制乳没各15克 骨碎补30克 川断30克 地龙30克 地鳖虫30克 党参30克 黄芪30克 制马前子30克 狗脊30克

〔用法用量〕 蜜丸 9 克重,每日二至三次。每次服一丸。

3. 痉挛性截瘫基本方:

〔处 方〕 丹参60克 当归60克 山甲30克 牛膝30克 全蝎30克 姜蚕24克 王不留行30克 黄芪45克 狗脊30克 川断15克 地龙24克 杭芍30克 地鳖虫30克 射香6克

〔用法用量〕 研末蜜丸 3 克,重每日二至三次。每次一丸。

4. 截瘫基本方:

〔处 方〕 当归15克 丹参30克 桃仁15克 红花15克 制乳没各 6 克 地龙24克 土鳖虫15克 狗脊15克 骨碎补15克 鸡血藤30克 牛膝15克 山甲12克 血蝎1.5 克 冲 广木香12克

5. 截瘫合并尿路感染者:

〔处 方〕 当归15克 丹参24克 桃仁15克 红花15克 扁蓄15克 木通12克 泽漆15克 败酱30克 银花30克 连壳15克 车前草30克 通草 6 克

6. 截瘫大小便失禁者(体虚者可通用):

〔处 方〕 黄芪30克 党参15克 当归15克 柴胡9克
升麻9克 白术12克 川断15克 狗脊15克 益智仁15克

7. 截瘫合并肺感染者:

〔处 方〕 当归15克 丹参24克 桃仁15克 红花15克
鱼腥草30克 冬瓜子30克 银花30克 连壳15克 苇根
30克 黄芩12克 大贝9克 高热加羚羊粉0.9克冲

8. 截瘫大便不通者:

〔处 方〕 基本方加大黄9克(后下)元明粉9克 枳
壳9克 广木香6克 郁李仁15克 麻仁15克

9. 外伤性截瘫并发尿路感染方:

〔处 方〕 五倍子3克 乌梅9克 生地榆12克 四
季青叶15克 石苇15克 黄芩6克 虎杖15克 金钱草15克
石榴皮6克

随症加减:

高热加金银花12克 黄连3克

血尿加墨旱莲、大小蓟、白茅根各12克。

胃纳差加山楂、陈皮各9克,或间服健脾药。

小便不利加车前草、泽泻各12克,去五倍子。

尿混浊加川萆薢15克,去石榴皮、五倍子。

〔功能主治〕 适用于外伤性截瘫并发尿路感染。

〔用法用量〕 每日一剂，分二次水煎服。

〔疗效〕 据文献报道，治疗外伤性截瘫并发尿路感染117例，经多种抗菌素治疗产生抗药性而无效的患者，用上方治疗，获得较好疗效。其中58例痊愈，31例好转，治疗时间最短30天，最长90天，同时由于医护人员精心照料，定时按摩下腹部，以及针刺等，促使膀胱的反射性形成，对预防尿路感染，有积极意义。

〔资料来源〕 南京药学院 叶桔泉。

10. 瘫痪膏药：

〔处方〕 当归30克 生地30克 白芷15克 乌头 9克 鹅不食草30克 肉桂15克 血竭15克 田七 9克 桐油500克 广丹 9克

〔制法〕 将当归、生地、白芷、乌头放桐油内炸枯，过滤去渣，再熬至滴水成珠时，加入广丹，搅匀，离火待冷，即成为黑膏，最后加入鹅儿不食草、肉桂粉、血竭粉、田七粉，搅匀摊成布膏药。

〔功能主治〕 适用于麻痹瘫痪初期。

〔用法〕 贴穴位，上肢贴“肩髃”、“天宗”，下肢贴“环跳”，每张膏药可贴十天。

〔资料来源〕 南京药学院 叶桔泉。

11. 瘫痪药酒：

〔处方〕 鹅不食草60克 烧酒500克

〔制法〕 上药浸泡 3 小时即可用。

〔功能主治〕 适用于麻痹瘫痪初期。

〔用法用量〕 以药棉蘸药酒揉擦患部15~30分钟，一日3~5次。

〔资料来源〕 南京药学院 叶桔泉。

三、软组织损伤

1. 舒筋健骨丸：

〔处 方〕 丹参12克 鸡血藤12克 八楞麻15克 川断12克 川芎9克 党参9克 陈皮6克 广玉金9克 伸筋草12克 乌药6克 五茄皮9克 自然铜(煅)15克 木瓜9克 牛膝9克 补骨脂9克 桑枝12克 龙骨15克 生苡仁12克 丹皮9克

〔制 法〕 共研细末，炼蜜为丸。

〔功能主治〕 补益气血，舒筋壮骨。适用于损伤，骨折，脱位中后期。

〔用法用量〕 每日早晚各服6克。

〔资料来源〕 南京市中医院。

2. 治伤丸：

〔处 方〕 地鳖虫 乳香 没药 血竭 当归 制大黄 上药各等份

〔制 法〕 共研细末，以蜜为丸，每丸重9克。

〔功能主治〕 主用于挤压伤，撕裂伤而呈皮肤青紫肿胀或肢体瘫痪者。

〔用法用量〕 每日二次，每次一粒，开水或黄酒送服。

〔疗 效〕 治疗12例，二天止痛，五天后消肿，七天青紫消退。

〔资料来源〕 徐州地区医院。

3. 活血丸：

〔处 方〕 桃仁18克 红花18克 广木香9克 防风18克 当归24克 陈皮18克 白芷18克 乳香9克 制香附24克 甘草6克 没药9克

〔制 法〕 共研细末，炼蜜为小丸。

〔功能主治〕 活血止痛，适用于损伤淤血停滞肿痛及伤后感受风寒，伤处酸痛。

〔用法用量〕 每日早晚各服4.5克。

〔禁忌症〕 孕妇忌服。

〔资料来源〕 南京市中医院。

4. 伤科止痛丸：

〔处 方〕 洋金花粉0.3克

〔制 法〕 研细末装胶囊。

〔功能主治〕 适用于外伤引起的剧痛。

〔用法用量〕 必要时服一粒。不可多服。

〔疗 效〕 治疗数例，在30—40分钟内达到完全止痛。

〔资料来源〕 徐州地区医院。

5. 一支蒿丸(毒)：

〔处 方〕 一支蒿60克 广木香60克 骨碎补60克

别直参12克 当归60克 川断60克

〔制 法〕 一支蒿、广木香、骨碎补、别直参研细末，当归、川断煎成膏，化水与细末水泛为丸，丸粒干重0.5克。

〔功能主治〕 去瘀、和伤、止痛。

〔用法用量〕 每日二——三次，每次一粒，（每日三次为极量）

〔资料来源〕 苏州市中医院

6. 跌打内伤单方：

〔处 方〕 玄胡索 适量

〔制 法〕 盐水炒，研细末。

〔功能主治〕 活血定痛，适用于伤后未曾出血，但疼痛较甚者。

〔用法用量〕 每天服两次，每次6克，用温黄酒和服。

7. 地鳖虫酊：

〔处 方〕 地鳖虫40克，红花30克，威灵仙30克，65%乙醇适量。

〔制 法〕 将上药合并，加乙醇250毫升，浸泡一周后过滤，压榨取汁，过滤，与滤液合并，加乙醇至250毫升，瓶装备用。

〔主 治〕 跌伤、扭伤，外伤骨折，瘀血肿痛。

〔用法用量〕 成人每日三次，每次口服15—20毫升。

〔疗 效〕 经本公社卫生院及大队合作医疗长期使用，效果满意，有效率80%。