

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百六十二



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官大醫院醫士_臣趙正池

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十一

嬰孩五藏門

總論

周王朱櫛撰

錢氏論云五藏所生心主驚實則叫哭發熱飲水而搐

虛則困卧悸動不安肝主風實則目直大叫呵欠項

急煩悶虛則咬牙多欠氣熱則外生氣溫則内生脾

主困實則困睡身熱飲食虛則吐瀉生風肺主喘實

則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則哽氣長出氣
腎主虛無實也豆瘡入腎則黑陷 更當別虛實證
假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝
肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則
虛冷肝強直而反勝肺也視病之新久虛則補母實則
瀉子也 肝臟病見秋木旺肝強勝肺也宜補肺瀉肝
輕者肝病退重者唇青而死 肺病見春金旺肺勝肝
當補肝輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搗

為肝怯當目淡青色也 心病見冬火旺心強勝腎當
補腎治心輕者心病退重則不寢不語腎怯虛也 腎
病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者腎病退重者悸動
當搖也 脾病見四季皆倣此治之順者易治逆者難
治脾怯當面目赤黃五臟相反隨証治 胃怯汗上至
頂下至臍皆胃虛當補胃益黃散主之胃啼小兒筋骨
血脈未成多哭者至小所有也 胃氣虛面皖白無精
光口中冷氣不思飲食吐水當補脾益黃散主之 胃

冷虛面眊白色瘦弱不思乳食當補脾用益黃散下痢者宜調中丸湯氏詩小兒心臟中風時偃卧唇紅汗濕衣但灸心俞三五壯唇青黃白黑休醫目瞪此為心已絕性命多應六日期此疾難別難治李倅之子任義烏丞患心臟中風諸醫皆言死而退已三日不醒余遂灸之今已長大凡見此候先宜看艾心俞正大中骨下兩傍各一寸半次服家傳牛黃丸肝風踞坐舉頭難早灸心俞病即安細視眼連唇上色青黃方可放心寬黑色

只應旬日死命歸泉路不能還脾臟若或中風邪腹滿
通身色似瓜吐沫醫人猶可治唇青手足冷空嗟若灸
肺俞三五壯縱能危困命難賒腰痛面黑腎之風兩脇
趺蹠病可攻急灸腎俞由得瘥面黃發瘰莫從容啼不
作聲有兩般肺絕無聲不用看或若外邪侵主臟溫和
調氣自然安忽然喘急心煩滿縱有靈方命亦拚急灸肺
俞三五壯始知妙訣在人間楊氏肺中風多因嗽而始
但服嗽藥不能散其風邪入於肺臟之絡其候喘急面

色青黃目能認人口不能言醫人不明其證待斃而已余曾有親戚之子得此疾危亟余往視之尚留殘喘急以橘皮桑白皮罌粟殼三件煎湯化百部丸二服急灸肺俞至第三壯其喘已定忽能言丹灸作五壯繼而索粥自此生矣

心臟附論

心熱者視其睡口中氣溫或合面睡及上竅咬牙皆心熱也導赤散主之心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有

就冷之意故合面睡 心氣實則氣上不行澁合卧則氣不得通故喜仰卧則氣得上下通也瀉心湯主之

心有餘眠卧不安面伏地睡則導赤散洗心散主之虛弱則驚悸不安寧心膏主之小腸有熱或赤澁尿血木通散滑石散紅龍散主之心不驚悸恍惚憂愁不樂面無顏色用寧心膏安心膏有客熱則睡中語導赤散洗心散主之

方

參砂膏 通心氣除隔熱去痰壅

硃砂

人參

南星

炮遠志

去心木用皮
薑汁浸焙

白附子

僵蠶

炒各
等分 礞砂

焙 茯神

等
分 麝香

少
許

右為末煉蜜丸如櫻桃大金箔為衣每服一丸麥門

冬去心煎湯調下

八物定志丸

補心氣安精神

遠志

去心 麥門冬

去心 菖蒲

茯神

去皮
木

茯苓

去皮白
者各半

兩牛黃

錢一

白朮

分一

人參

錢六

右為末煉蜜為丸每一兩作三十丸以硃砂為衣每服一九人參湯化下食後

瀉心湯 瀉子

右用黃連一兩去鬚研極細末每服一字至半錢一錢臨臥溫水調下海藏云易老單瀉心湯加減法出於此方實邪也實則泄其子

肝臟附論

肝主感風者呵欠頻悶口熱氣當發散大青膏主之若

能食飲水不止當用大黃丸微下餘不可下 肝熱手

尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲食喘悶瀉白散

主之 肝有風目連扎不搐得心熱則治肝瀉青丸治

心導赤散主之 肝有熱目得直視不搐得心熱則治

肝瀉青丸治之導赤散主之 肝有方甚則身反張強直

不搐是肝受風也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青

丸主之 若病或新或久皆引肝風風動而止於頭目

目屬肝風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不任

風目連劄也若熱入目牽其筋脈兩眦俱緊不能轉視
故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相
搏故也治肝瀉青丸治心導赤散主之肝有餘目赤多
怒筋脈拘急肝風亦然或身熱者驅風膏并涼肝藥肝
不足視不明兩脇拘脹面色青白多恐悲泣地黃丸主
之

方

瀉青丸

治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物目直視

不搐得心熱則搐身反折強直目連劄或目肉青或

臟腑泄諸藥不止脾胃久虛並宜服之

又名瀉肝丸

當歸

去蘆頭切焙秤

龍膽草

焙秤

川芎

山梔子仁

川大

黃

濕紙裹煨

羌活

防風

去蘆頭切焙各等分

右為末煉蜜丸雞頭大每服半丸至一丸煎竹葉湯

同沙糖溫水化下

地黄丸

治小兒本氣虛怯由胎氣不成則神不足目

中白睛多其顙即解開面色眊白又腎氣不足則下

竈蓋骨重惟是墜於下而縮身也腎水陰也腎虛則
畏明無精光者並宜補之

熟乾地黄八錢 山茱萸焙秤 乾山藥各四錢 澤瀉 牡

丹皮 白茯苓去皮各三錢

右為細末煉蜜和丸每兩作五十丸三歲已下每服
一二丸至三丸溫水空心化下

麝香青金丸 治小兒肝臟有風呵欠頓悶神昏不爽
口中熱氣急驚搐搦胸滿氣短並皆治之

天麻

半兩

白附子

三錢

蝎稍

微炒

青黛

二味各二錢

白蛇

酒浸取肉焙乾八錢

麝香

別研

硃砂

別研

天竺黃

各一錢

右件為細末入研者麝香硃砂研勻煉蜜為丸每一

兩作四十丸每服一丸煎人參薄荷湯化下乳食空

脾臟附論

脾有餘脾胃有熱不思乳食或吐黃水瀉深黃色實熱也或瀉黃沫如蟬吐沫虛熱也皆食不化寶鑑云胃受熱五穀不能實先以黃白散行其臟腑後以五苓散脾

虛熱先五苓散次黃白散再服五苓散或少以益黃散
脾不足脾胃經冷不思乳食噦吐清水瀉綠白色食物
不化時腹痛或渴或不渴巢氏云小兒噦由哺冷冷氣
入胃與氣相連則胃氣不通致令噦也錢氏云瀉青白
米穀不化脾胃冷王氏云宿食不消脾胃冷也益黃散
兩服柴胡丸逐積再益黃散千金云脾虛腹脹鳴澹瀉
食物不消化 脾胃有積不思乳食則或吐酸瀉白食
物不化傷食亦同或腹痛或不痛家寶方云喫物不消