

重修政和經史證類備用本草卷第十二

成都唐慎微續證類

衛安肅公獲靈龜德意輟建聖所醫經撰舉內醫官編類藥性撰舉醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本草經

六種名醫別錄

一種唐本先附註云唐附

二種今附皆醫家嘗用有

一種新補

一種新定

七種新

一種唐慎微續補墨蓋子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

挂

牡桂

茵桂

松脂

實葉根節等附松黃松脂唐注五粒松續注

槐實

枝皮根等附

槐膠

新定

槐花

備

枸杞

葉上蟲窠續注

栢實

葉皮側栢等附

茯苓

附茯神

琥珀

璧

元附琥珀下今新分條

榆皮

附花

酸棗

藤木

附根

楮實

葉皮莖白汁等附穀帛續注

乾漆

附生漆

五加皮

牡荊實

蔓荊實

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂皮附唐附

女貞實拘骨冬青續注

木蘭

麝核

丁香今附母丁香續注

沉香

薰陸香

雞舌香

藿香

詹糖香

檀香

乳香已上七種元附沉香下今各分條

蘇合香獅子尿續注

金櫻子今附自革部今移

降真香

八種海藥餘

藤黃

返魂香

海紅豆

落鴈木

蘇木

柵木皮

無名木皮

奴會木

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

含水藤中水

旱蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛羅勒

靈壽木皮

綏木

斑珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

灰杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑


桂花




桂



賓州桂



宜州桂



桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼈能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽

二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣壯二桂而桂用體大同小異

吐逆陶隱居云按本經惟有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉今俗用便有三種乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸與前說相應正是此種爾今出廣州者好湘州始與桂陽縣即化為水者正

是桂亦有不廣州者交州桂州者形段小多脂肉升
好經云桂葉如柏葉黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以
植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乘異亦能凌冬
忍或壯壯時人多乎其桂正謂皮赤爾此方今重此每食
輒須之盡禮所云薑桂以為芬芳固本注菌桂葉似柿葉中
有縱文三道表裏無毛而光澤壯壯葉長尺許陶云似柿
言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不堅板無肉
何所出今按桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮或名筒桂其
全不堪用其小技薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其
壯桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂或名筒桂其
得人參等良本是菌桂剝出單桂條陶為深誤也今按陳藏
器本草云菌桂壯桂壯桂心已上三條並用是深誤也今按陳
嶺因桂為名今之生不離已上三條並用是深誤也今按陳
惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄
者必老以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香兼又
筒卷者必味淡自然板薄者即壯桂也一色嫩既辛香兼又
筒卷者即菌桂也俗至易書傳亦復因循桂字似菌字後人
誤而書之習而成俗至易書傳亦復因循桂字似菌字後人
上甲錯取其近裏辛而有味臣禹錫等謹按蜀本注云抄此
有三種菌桂葉似柿葉壯桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉
蘇以桂葉無似柏葉者乃云陶為深誤剩出此條今據陶注
云菌桂正圓如竹三重者良壯桂皮厚色黃多脂肉氣如木
味亦辛此桂則是半卷多脂者此則有三種明矣陶有三桂
云齊武

特得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實
 自漢武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而
 蘇恭但只有知二種亦不能細尋事跡而云陶為深
 斷之甚也抱朴子云桂可以竹歷合即之亦可以龜
 之際性論云桂心若亦名紫桂殺草木毒忌生葱味
 毒主治九種心痛殺三蟲主敗血通利月閉治軟脚
 治胎衣不下除欬逆結氣擁痺一止腹內冷氣痛不
 痢治鼻息肉白華子云桂心治一切風氣補五勞七
 瘵利關節益精明目暖腰膝破瘰癧瘰癧瘰癧
 消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉
 圖經曰載菌桂三種之異性味功用亦別而爾雅
 桂一種郭璞云南人呼之今桂厚皮者為木桂蘇恭
 桂及單名桂者是人呼之今桂厚皮者為木桂蘇恭
 板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓
 二種重者則今所謂筒桂也筒箇字近或傳寫之誤
 即名桂也今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者
 皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者
 板然若題曰桂也無腹別名參攷舊注謂菌桂上者
 同然若題曰桂也無腹別名參攷舊注謂菌桂上者
 三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓
 者相類桂葉攸於箇桂而長數倍其嫩枝皮半卷多
 今宜州韶州者相類彼上人謂其皮為木蘭皮黃心
 又有黃紫兩色益可驗也桂葉如恒葉而澤黑皮肉

欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作栢葉形為疑耳
皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以類但桂與單名桂為一物
亦有種考移植其木俱高三四丈多生深山巖洞中人家園圃亦
有四月生花全類茉莉九月結實今人多以裝綴花果作筵具
其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月多採皮九月採花並陰
乾不可近火中品又有天竺桂云生西國功用似桂不過
烈今亦稀有病瘁內熨方用此張仲景治傷寒用桂枝湯中
治陰受病發瘁內熨方用此張仲景治傷寒用桂枝湯中
杜酒中置馬矢溫中善封塗酒中綿絮一斗細白布四丈皆并
內乾復漬之以盡其汁每漬必臍使其氣五日布出綿乾之并
暴乾復漬之以盡其汁每漬必臍使其氣五日布出綿乾之并
滓與絮復布為中其布長六尺為六七日乃出布綿乾之并
炙中以熨寒痺所刺之處令熱入至六七日乃出布綿乾之并
之三十編而止汗出炙中拭身亦三編而止起布內無
見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治臂筋急亦
以白酒和桂末一大兩白蜜一方造桂漿法夏月飲之解煩渴益
氣消痰桂末一大兩白蜜一方造桂漿法夏月飲之解煩渴益
入新甞瓶中以後下二物攪二三日百轉令勻先煎取一斗待冷
上美格韻絕高今人
味多作故并著其法
亦多作故并著其法

雷公云

者使勿薄者要紫色厚者去上麓皮取心中味辛
每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生

之藥如末用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其州土單構用

聖惠方治風頭痛每欲天陰兩風先發者用桂心

又方治九種心痛妨悶用桂心二分為末以

又方治寒疝心為散四肢逆冷全不欲食用桂心一兩

又方治產後惡血衝心氣悶欲絕用桂心三兩擣羅為散

外臺秘要療小兒睡中遺尿不計時候用桂末相雞一

千金方治中風面日瘰癧引偏碎牙車急舌不可轉桂心以酒

常用
大效

又方治失音末桂

又方治卒中惡心痛桂心八分咬咀

肘後方治卒心痛桂心一分兩分三服

又方治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水

又方治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩

又方治反腰有血痛搏桂篩三升

葛氏方治卒吐血桂屑上方寸匕晝夜含二十

又方治產後腹中殺痛母秘綠同酒

孫真人食忌治中風失音一方桂一尺以

又方治垂血取桂寸匕擣作

梅師方蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體

服之濃豉汁

又方治卒外腎偏腫疼痛方桂

又方治產後血泄不禁止餘血弥痛煎桂

斗門方治中風失音用桂心一兩服去其麋皮近人白小體懷之

聖惠方同

和衆方

治小兒臍腫取桂心炙

抱朴子云

桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可

云過他子服桂二百年足下

衍義曰

桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯

一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此

二種性上溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言

其辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說亦取其菌桂上二桂

不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上二桂

其本身麤厚處亦不知緣何而立名慮後世為別物故書之又

有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛臂風脅

痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不

老生南海山谷

陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃指肉甚少氣如木

蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦
所未究唐木志云爾雅云侵音寢木桂古方亦用木桂或云
壯桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與茵桂同惟葉
倍長大小枝皮俱名杜桂然大枝皮肉埋籠虛如木肉少味
薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名
桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣禹錫等謹按蜀本
圖經云葉狹長於南桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中
皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂制去上皮名曰桂心藥
中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮為木桂桂樹
雅疏云侵一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹
葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青
間無雜木本草謂之杜桂是他藥性論云杜桂君味其辛能
去冷風
寒痛

圖平文具桂
糸條下

經馬後方

治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂
環末飯丸如菜豆大小兒熟水下五丸大人十

九未痊
再服

茵桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使
久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾桂林山谷

藥性論云桂樹正圓如竹立秋採陶隱居云交趾屬交州桂樹

崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真

別是一物應更研訪唐平注云菌者竹名古方用筒桂者是

故云三重者良其筒桂小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷

味極淡薄不八藥用今惟出韶州臣禹錫等謹按蜀本圖經

云葉似柿葉而尖挾光淨花白藥黃四月開五月結實樹皮

青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用

三月七月採皮日乾圖經文下具桂

列仙傳范蠡好食桂飲水討藥入世世見之服之

韓終采藥詩閭河之桂實大如栗後天而老

別說云謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人


味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故

本經以菌桂養精神以杜桂利關節仲景傷寒論發汗用桂

枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有

一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味苦甘溫無毒

土疸惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安五藏

除熱胃中伏熱咽乾

消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主

惡痺久服輕身不老

延年一名松膏一名松肪生太山山谷

六月採

松實味苦溫無毒

主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰

乾

松葉苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢陶隱居云採鍊松脂法並在服食中

數其過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏

飲服之亦有陰乾搗為屑丸服者人患患病服此無不苦

理為佳物但人多輕忽近易之爾松栢皆有脂潤又凌冬不凋

取似蒲黃正爾酒服身輕易病之爾本注云松花名松黃拂

牛瘡疥佳苦非也松取枝燒其上下承取汁名詰音詰主馬

可愛也臣禹錫等謹按藥性論松脂使味耳平殺蟲用之主

生肌止痛抽風蕭炳云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒

潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿反云松葉暖無毒多晉

凍瘡風濕瘡佳又云松節無毒治脚軟骨節風

補五勞益氣

圖經曰

松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸皆先鍊治其法用大釜加水置甑於上坎以桑薪湯滅即添

於水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既白皮去蒸

如出三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮去蒸

亦有名松食法但今松實多作果品餘不開堪入藥其花上黃

粉寄遠燒其技用上合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒

綠衣名艾納香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒

字當讀為鬣音之誤也言每玉鬣為一葉或有两鬣七鬣者

松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨

條不載所出州郡然亦

聖惠方則絕穀昇仙不飲水勿食他物白身輕日行五百里

又方服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀

初服錢亦可粥自便矣

又方治一切瘰癧煉成松脂木填