

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷十四




南京中医药大学图书馆版权所有

大正四年五月

終治準繩

准繩

便數



明 王肯堂 撰

之復便數憎風是也小

便數唯二處有之一屬肺經云肺肝太陰之脉氣盛有

證治準繩

餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠是也以刺言之瀉手太陰則愈一屬肝經云足厥陰之瘧令人如癰狀而小便不利又云肝痺者夜卧則驚多飲數小便是也視虛實補瀉之則愈 數而少茯苓琥珀湯利之

數而多薯蕷蓮肉益智仁之屬收之 生薯蕷半斤刮去皮以刀切碎於鍋中煮酒沸下薯蕷不得攪待熟加鹽葱白更添酒空腹下二三盞妙 蓮肉去皮不以多少用好酒浸一兩宿猪肚一个將酒浸蓮肉入肚中多

半為度水煮熟取出蓮肉切焙乾為細末酒煮麪糊為丸如芡實大每服五十九食前米飲湯下名水芝丸

夜多小便益智二十四個為末鹽五分水一盞煎八分

臨卧溫服 衛真湯并丸 桑螵蛸散 戴氏云小便

多者乃下元虛冷腎不攝水以致滲泄宜兔絲子丸八

味丸玄兔丹生料鹿茸丸 有人每日從早至午前定

尿四次一日之間又自無事此腎虛所致亦猶脾腎泄

早泄而晚愈次日又復然者也 若小便常急徧數雖

多而所出常少放了復急不澀痛却非淋證亦有小便
畢少頃將謂已盡忽再出此少者多因自忍尿或忍尿
行房事而然宜生料五苓散減澤瀉之半加阿膠一錢
吞加減八味丸此丸須用五味子者 有盛喜致小便
多日夜無度乃喜極傷心心與小腸為表裏宜分清飲
四七湯各半貼和煎仍以辰砂妙香散吞小兔絲子丸
或玄兔丹 若頻頻欲去而溺不多但不痛耳此腎與
膀胱俱虛客熱乘之虛則不能制水宜補腎丸六味地

黃丸 熱入水道澀而不利八正散或五苓散加黃蘗
知母麥門冬木通 大便硬小便數者是謂脾約脾約
丸主之

小便不禁

原病式云熱甚客於腎部干於足厥陰之經廷孔鬱結
極甚而氣血不能宣通則痿痺神無所用故津液滲入
膀胱而旋溺遺失不能收禁也考之內經則謂督脉生
病為遺溺靈樞謂肝所生病為遺溺蓋因二經循陰器

繫廷孔病則榮衛不至氣血勞劣莫能約束水道之竅故遺失不禁劉河間可謂得此旨矣然內經復言膀胱不約為遺溺靈樞言手太陰之別名曰列缺其病虛則欠故小便遺數由此觀之則又不獨病在陰器廷孔而已夫如是者內由三焦決瀆之失常也何則手少陽之脉從缺盆布臙中下膈循屬三焦足太陽之脉從肩膊內挾脊抵腰中入循脊屬膀胱三焦虛則膀胱虛故不約也肺從上焦通調水道下輸膀胱腎又上連肺故將

兩歲是子母也母虛子亦虛此上中下三焦氣虛皆足以致遺溺矣由是而知三焦所部五歲之淫氣變而為五邪者悉能干於下焦腎肝膀胱出水之竅而為不禁之病何止於熱極鬱結痿痺腎部而已乎又自內經所謂太陰在泉客勝濕客下焦洩便不時太陰之復甚則入腎竅泄無度者觀之則知濕主於痞況是所勝之邪其不為鬱結痿痺者乎從而思之聖人之言舉一隅便當以三隅反前所謂肝腎膀胱之病不言其邪可見諸

邪盡能病之也次言手太陰列缺虛者為子母藏氣之要也可見所生所勝不勝之五邪皆足以乘之也其言太陰之勝復則濕為所勝之重者也其他風寒燥熱雖不及言可知在其中矣 治法上虛補氣 下虛澀脫

東垣云小便遺失者肺金虛也宜安卧養氣禁勞役以黃芪人參之類補之不愈當責有熱加黃蘗生地 下虛謂膀胱下焦虛經云水泉不止者是膀胱不藏也 仲景云下焦竭則遺溺失便其氣不能自禁制不須治

久則愈又云下焦不歸則遺洩世用桑螵蛸雞脬脰之類是也 古方多燥熱如二氣丹家韭子丸兔絲子丸

固脬丸白茯苓散鹿茸散兔絲子散內有桂附唯真虛寒者宜之 桑螵蛸散鹿角霜丸阿膠飲鹿茸散溫補

而不僭 小便不禁而淋瀝澀滯者澤瀉散茯苓丸

滑脫者牡蠣丸 如白薇散雞腸散內俱有寒藥內熱者宜之 婁全善治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黃

蘗知母杜牛膝為君青皮甘草為臣木香為佐桂些少

反佐服數貼大效此法與千金白薇散皆河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所用不能收禁之意也 遺尿有實熱者用神芎導水丸每服百丸空心白湯下若一服利止後服此謂淫氣遺溺痺聚在腎痺謂氣血不通宣也戴云睡著遺尿者此亦下元冷小便無禁而然宜大兔絲子丸猪胞炙碎煎湯下凡遺尿皆屬虛 通用方薏苡仁鹽炒煎服 雞腸一具以水三升煮取一升分三服一方用雄雞燒灰為末用三指撮溫漿水調一錢

向北斗服之更良 雄雞喉嚨及矢白脰脰裏黃皮燒

為末麥粥清調服 羊脬盛水貯令滿繫兩頭煮熟開

取水頓服之 雞脰脰一具并腸洗淨燒灰男用雌女

用雄為細末每服二錢空心溫酒調服一方如猪脬灰

燕蓐草主眠中遺尿不覺燒令黑研水進方寸七

膀胱欬者欬而遺溺

妊娠尿出不知 用白薇芍藥為末酒調下或白礬牡

蠣為末酒調二錢或雞毛灰末酒服一七或炙桑螵蛸

益智仁為末米飲下

薛氏云前證若脬中有熱宜加

味逍遙散若脾肺氣虛宜補中益氣湯加益智若肝腎
陰虛宜六味丸

產後小便數 乃氣血不能制故也 薛氏曰若因穩

婆不慎以致胞損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣血
兼進補脬飲若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若
膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎

婦人產褥產理不順致傷膀胱遺尿無時宜補脬飲桑

螵蛸散白薇散薛氏曰前證若脾肺陽虛用補中益氣
湯若肝腎陰虛用六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八
味地黃丸若肝脾氣血虛熱用加味逍遙散佐以六味
丸 丹溪云嘗見尿胞因收生者不謹以致破損而得

淋瀝病遂為廢疾有婦年壯難產得此因思肌肉破傷
在外者可以補完胞雖在腹恐亦可治診其脈虛甚遂
與峻補以參芪為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為
佐煎以豬羊胞中湯極飢時飲之但劑小者率用一兩

至一月而安蓋令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

小便黃赤

諸病水液渾濁皆屬於熱 小便黃者少腹中有熱也
藏府小便黃有四 一屬肝熱經云肝熱病者小便
先黃是也 二屬胃實經云胃足陽明之脉氣盛則身
已前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃是也 三
屬肺虛經云肺手太陰之脉氣虛則肩背痛寒少氣不

足以息溺色變是也 四屬腎虛經云冬脉者腎脉也
冬脉不及則令人眊清脊痛小便變是也 運氣小便
黃有二 一屬風經云厥陰之勝肱脇氣變化而為熱
小便黃赤是也 二屬熱經云少陰司天熱淫所勝病
溺之變又云少陽之勝溺赤善驚又云陽明司天淫氣
下臨暴熱至乃暑陽氣鬱發小便變是也蓋暴熱謂地
氣少陰之熱也 邪之所在者為不足中氣不足溲便
為之變補足外踝下氣之用藥則補中益氣湯是已

小便黃無如黃蘗知母效 脉經云尺瀉足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝補之

遺精

丹溪書分夢遺精滑為二門蓋夢與鬼交為夢遺不因夢感而自遺者為精滑然總之為遺精也其治法無二故合之 或問精滑何因得之曰金匱要畧謂虛勞之病脉浮大手足煩陰寒精自出又謂脉弦而大此名革亡血失精又謂小腹弦急陰頭寒脉動微緊男失精女