

# 欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十五



南京中医药大学图书馆版权所有

景岳全書卷四十一

和

虛癆

胃

豆豉

總論

治者如

其有不

治者如初熱時即見  
蓋吐利中自有疎通  
其有吐利之甚者則

張介賓 撰

不得不治又有元氣本弱而見此證者使不速為調  
補必致脾氣困憊則痘出之後虛證疊見而救無及  
矣此痘前之吐利其當治不必治自有輕重之分也  
若見點之後則吐瀉大非所宜速當察其寒熱虛實  
而調治之

一痘瘡吐瀉雖曰多屬脾經然亦有三焦五臟之辨蓋  
病在上焦但吐而不利病在下焦但利而不吐病在  
中焦則上吐下利故在上焦者當辨心肺之脾氣在

下焦者當察肝腎之脾氣此五臟之氣各有相滋相制之機設不明此鮮不誤矣

一痘瘡吐瀉大都中氣虛寒者十居七八然亦有邪實毒盛及飲食過傷而為吐瀉者此宜詳審脉證自有可辨若果有熱毒實邪則不可誤認虛寒輕用溫補恐反助邪以致餘毒癰腫或為潰爛難收等證

嘔吐 四二

痘瘡嘔吐大都虛寒者多實熱者少但當以溫養脾胃

為主即或有無雜證者亦必有實邪可據方可因病而無治之故不得輕用寒涼及消耗等藥

一凡嘔吐之病病在上中二焦也切不可妄用下藥致犯下焦元氣則必反甚而危矣即或有大便不通者亦當調補胃氣從緩利導但得脾胃氣和則升降調而便自達此不可不知也

一痘瘡別無風寒食滯脹滿疼痛等證而為嘔吐或乾嘔惡心者必脾胃虛寒也宜六味異功煎五君子煎

參薑飲之類主之或溫胃飲理中湯皆可酌用

一脾氣微寒微嘔而中焦不寒者宜五味異功散

一胃口虛寒嘔吐而兼有痛滯者六味異功煎送神香散或調中湯亦佳

一脾胃虛寒吐瀉並行者溫胃飲甚者陳氏十二味異功散

一脾腎虛寒命門不煖而為吐瀉者必飲食不化水穀不分而下腹多痛非胃關煎或理陰煎不可

一凡寒氣犯胃腹脹腹痛而為嘔吐者神香散益黃散  
或加炮薑若因飲水或食生冷瓜果而作嘔吐者五  
苓散加炮薑

一飲食過傷停滯胃口胸膈脹滿而為嘔吐者宜和胃  
飲或大和中飲或神香散

一痰飲停蓄胸膈而脹滿嘔吐者宜二陳湯或橘皮湯  
加炮薑

一三焦火閉煩熱壅滯胃口而為嘔吐者此必陽明火

證也宜橘皮湯加黃連甚者再加石膏或用竹葉石膏湯但此證甚少勿以虛火作實火也

程氏曰凡痘瘡嘔吐之證須辨冷熱熱吐者宜六君子湯加薑汁炒芩連冷吐者宜六君子湯加丁香藿香白豆蔻

一痘瘡嘔吐不已聲濁而長或乾噦者最是瘡家惡候  
泄瀉 四三

痘瘡首尾皆忌泄瀉而後為尤甚惟初熱時有隨瀉而

隨止者為吉若自見點之後以至收靨毒氣俱已在表俱要元氣內充大便堅實庶能托載收成苟畧泄瀉則中氣虛弱變患百出矣若初出之後而見泄瀉則必難起難灌既起之後而見泄瀉一瀉則漿停瀉止則漿滿既灌之後而見泄瀉則倒陷倒靨內潰內敗等證無所不至此實性命所關最可畏也今多見妄藥誤治敗人脾氣以致莫救者猶云欲去其毒瀉瀉無害欺耶昧耶庸莫甚矣

凡治痘疹泄瀉只在辨其寒熱熱者必濕滯之有餘寒者必元陽之不足但十瀉九虛而實熱者極少故凡見泄瀉嘔吐腹痛而別無實熱等證者無論痘前痘後俱速宜溫救脾腎此大要也當詳察之若失其真誤治則死

一虛寒泄瀉凡證無大熱口不喜冷脈不洪數腹無熱脹胸無煩躁飲食減少而忽然自利者則悉屬虛寒切不可妄用寒涼之劑再傷脾土必致不救宜溫胃

飲養中煎五君子煎或理中湯四君子湯之類隨宜用之○若腹有微滯微脹而為泄瀉者宜六味異功煎或五味異功散加砂仁○若泄瀉無嘔無痛而氣有不順者宜養中煎加丁香木香或四君子湯合二仙散○若泄瀉而山根唇口微見青色或口鼻微寒手足不熱指尖微冷瀉色淡黃或無青白睡或露睛此皆脾腎虛寒之證非速救命門終不見效宜胃關煎理陰煎主之或陳氏十二味異功散亦可○若泄

瀉勢甚用溫脾之藥不效者則必用胃關煎或理陰煎之類主之○若久瀉滑脫不能止者宜胃關煎溫胃飲或陳氏十二味異功散送五德丸或肉豆蔻丸○若胃本不虛但以寒濕傷脾或飲水而為泄瀉者宜佐關煎抑扶煎或益黃散加猪苓澤瀉或五苓散俱佳

一蓄熱泄瀉本不多見用間亦有之然必有熱證可據方可用清利之藥如脉見洪數身有大熱口有大渴

喜冷惡熱煩躁多汗或中滿氣粗或痘色掀腫紅紫  
或口鼻熱赤小便澀痛之類皆熱證也且熱瀉者必  
暴而甚寒瀉者必徐而緩皆可辨之然治熱之法當  
察火之微甚勿使藥過於病恐致傷脾則必反為害  
○凡濕熱內蓄小水不利微熱不甚而為泄瀉者宜  
五苓散四苓散或小分清飲之類加木通主之○若  
濕熱稍甚清濁不分而泄瀉者宜四苓散加薑炒黃  
連或合黃芩湯治之○若食多脉盛氣壯而泄瀉者

當從熱治宜黃芩湯加黃連○若熱在下焦小水赤  
澁而泄瀉者宜大分清飲或合益元散○若濕熱在  
脾泄瀉內熱而無腹痛者宜香連丸○若頰赤身熱  
頭痛咽疼口瘡煩躁而泄瀉者陽明火證也宜瀉黃  
散○若濕熱在脾瀉而無嘔者黃芩湯加半夏生薑  
或御藥大半夏湯加黃芩○若內熱泄瀉而無氣虛  
者四君子湯加芍藥黃連木香

一發渴乃泄瀉之常候蓋水泄於下則津涸於上故凡

患泄瀉者必多口乾口渴但乾與渴不同渴者欲飲  
乾者不欲飲渴屬陽而乾屬陰此其辨也然有渴欲  
飲水者此火證也有渴欲飲湯者此非火也有雖欲  
飲水而不能多者有口雖欲涼而胸腹畏寒者此皆  
非火證也然則病渴者尚有陰陽之辨而矧夫但乾  
而不渴者此實以水虧而然若作火治鮮不為害故  
凡有久瀉津亡而作渴者當審其非熱而不可不壯  
其水也

程氏曰泄瀉須分寒熱寒者○便清宜理中湯或參苓白朮散然白朮茯苓非泄瀉發泡者不宜用以其滲利故也○按此說可見治痘者即滲利亦忌顧可妄為消伐以殘其氣血津液乎

陳氏曰凡瀉頻津耗則血氣不榮瘡雖起發亦難收靨如身溫腹脹氣促咬牙煩燥譫妄者皆難治緣穀食去多津液枯竭故多死也速宜與十一味木香散或十二味異功散

萬氏曰瘡未出而利者邪併於內裏實也宜從清毒瘡已出而利者邪達於表裏虛也宜治其虛凡痘瘡所忌惟內虛泄瀉若溫之固之而不愈者此不治之證

寒戰咬牙 四四

寒戰者陽中之氣虛也陽氣虛則陰乘之陽不勝陰故寒慄而戰也咬牙者陰中之氣虛也陰氣虛者腎元憊骨氣消索故切齒而鳴也總之虛在氣分則無非陰盛陽虛之病耳非大加溫補不可也