

醫宗金鑑



上海錦華書局出版

醫宗全說卷下

外科

編輯外科心法要訣

腹部

幽癰

幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼憂思厚味火毒發咬牙寒戰毒陷攻

〔註〕此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鵝卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內

而外發也初起腫痛皮色未紅時若心煩嘔噦

脹沉實者當疎火毒以絕其源宜內疎黃連湯

服之。膿腫痛甚邪氣實也宜服託裏散外用艾

壯隔蒜片灸之。脈見沉遲其膿未成用補中益

氣湯託之。脈見洪數其膿已成用託裏透膿湯

幽癰在臍上七寸



臍熱脹痛不潰係氣血虛也急用十全大補湯溫補之外兼用臥鍼開臥鍼者斜入斜出防傷內膜也或誤行汗下

或誤敷寒涼以致腫而不潰.潰而不斂者急用十全大補湯加乾薑附子以救之.已潰朝寒暮熱者氣血虛也.食少作瀉脾胃虛也.胸痞痰涌肺虛也.俱服六君子湯服後諸證悉退.換十全大補湯調理即愈外治之法按癰疽腫瘍潰瘍門無論已潰未潰忽咬牙寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者係內膜已透俱爲逆證.

〔託裏散〕皂刺 金銀花 黃芩 牡蠣殼 當歸 赤芍 朴硝 大黃 花粉 連翹去心等分 共研粗末每用五錢酒水各一鍾煎八分去渣服.

〔方歌〕託裏散醫諸瘡毒腫甚焮疼煎服消皂刺銀花芩牡蠣歸芍硝黃花粉翹.

〔內疎黃連湯〕見腫瘍門

〔隔蒜灸法〕見首部灸法

〔託裏透膜湯〕見頭頸部灸法

〔補中益氣湯〕〔十全大補湯〕〔六

君子湯〕卽香砂六君子湯減去

木香砂仁俱見潰瘍門

中脘疽

中脘疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無紅熱不食嘔噦毒內攻〔註〕此證一名胃疽.

發於心胸之下臍上四寸任脈經中脘穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙博以致胃腑火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裏作嘔不食歟嗽^瘍宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲^瘍宜散膿勢將成內外治法俱見癰疽腫瘍潰瘍門若起長膿遲或瘡不厭痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸之回陽

中 脘 疽 圖



中 脘 疽 在 脍 上 四 寸

〔山甲內消散〕穿山甲三片炒大

當歸尾 大黃 甘草節

各三錢

土木鼈

三個

黑牽牛 疟蟲

各一錢炒

酒水各

一鍾煎八分空心服

心服渣再煎服大便行三四次方食稀粥淡味調理

〔方歌〕山甲內消火毒積色紫堅疼中脘疽歸尾大黃殼草節木鼈牽牛加酒宜

〔仙方活命飲〕見腫瘍門

嚇癰

嚇癰七情鬱火成膿上三寸粟微紅暴腫膿痛二七潰頂陷色黑潰遲凶

〔註〕此證由七情鬱火凝結而成生臍上

嚇

癰

圖



嚇癰生在臍上三寸

三寸屬任脈經建里穴初如粟米癰痛相兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噯牽引臍痛初腫微紅頂尖根束漸透赤色時痛時止十四日潰膿者順若頂陷紫黑根脚漫腫面赤大渴脈見浮數而散大者逆內治與幽癰參考外治法按癰疽腫瘍潰瘍門

衝疽

衝

疽



衝疽在臍上二寸

紫黑膿水清稀七惡證見者逆

〔瘡科流氣散〕見背部
瘀注發〔仙方活命飲〕見腫門

臍癰(附臍中出水)

衝疽臍上二寸生心火毒熾入腎紅高腫焮痛速潰吉若見七惡定然凶。【註】此證生於任脈臍上二寸下脘穴一名中發疽又名壅應在二十日潰破膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方活命飲消之膿將成時內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其證若平塌

臍

圖



臍癰生在肚臍

臍癰毒發在臍中腫大如瓜突若鈴無紅無熱宜蒜灸稠膿爲吉污水凶。【註】此證由心經火毒流入大腸小腸所生於臍中屬任脈經神闕穴此穴禁鍼腫大如瓜高突若鈴無紅無熱最宜隔蒜灸之初宜服仙方活命飲加升麻消之便結實者內疎黃連湯通利之將欲成膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門順時得稠膿者順時出污水臭穢者逆亦有臍中不痛不腫甚癢時流黃水此屬腸胃濕熱積久宜服黃連平胃散外用三妙散乾撒滲濕即愈當忌酒麵生冷果菜不致再發若水出不止者亦屬逆。

水出不止者亦屬逆

〔黃連平胃散〕 黃連五錢 陳皮 厚朴各三錢

甘草二錢

蒼朮炒一兩

共研細末每服三錢白滾水調服

〔方歌〕黃連平胃散陳甘厚朴蒼朮共細研專除濕熱兼消積能令脣水立時乾

〔三妙散〕 檳榔 蒼朮生 黃藥各等分

共研細末乾撒肚脣出水津溼成片止癢滲濕又治濕癬以蘇合油

調搽甚效

〔方歌〕三妙散用檳榔蒼朮黃藥同研滲濕瘡蘇合油調治濕癬收乾止癢效稱強

〔隔蒜灸法〕見首卷

〔仙方活命飲〕〔內疎黃連湯〕見腫門

少腹疽

少腹疽生脅下邊證由七情火鬱纏高腫紅疼牽背易漫硬陷竇水膿難〔註〕此證由七情火鬱而生每發於氣海丹田關元三穴氣海在脅下一寸五分丹田在脅下二寸關元在脅下三寸皆屬任脈經此三穴或一穴發腫即爲

少腹疽高腫堅硬綿潰竇爛膿稀如水者難治若漫腫堅硬綿潰竇爛膿稀如水者難治

凡遇此證初起急用艾灸腫頂七壯至三七壯以痛癢通徹爲度宜服仙方活命飲氣實之人渴便祕者宜服內疎黃連湯通利之老弱之人宜服內補十宣散令其速潰若潰遲恐透內膜外治法同癰疽腫瘍潰瘍門

少腹疽圖



少腹疽

〔仙方活命飲〕〔內疎黃連湯〕俱見腫門

〔內補十宣散〕見胸腹部

腹皮癰

腹皮癰生腹皮內皮裏膜外腫隱疼腹痛不止膿成候證由膏梁火生〔註〕此證生於腹皮裏膜外無論左右隱痛日久後發癰腫於皮外右關脈見沉數而腹痛甚者是其候也由膏梁火鬱而成初起壯實者用雙解貴金丸下之虛弱者減半用之不應再服半劑凡下之後腹痛不止膿將成也急用託裏透膿湯潰後與癰疽潰瘍門治法相同不可過用尅伐之劑若希圖消散


過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立見危亡矣

〔雙解貴金丸〕見腫門

〔託裏透膿湯〕見膚頭部

緩疽

緩疽在少腹之旁



腹皮癰圖

腹皮癰左右皆同



緩疽脾經氣積凝少腹旁生堅又疼數月不潰生寒熱食少削瘦效難成〔註〕此證由太陰脾經氣滯寒積而成生於少腹之旁堅硬如石不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食山甲內消散不應不可強消徒損胃氣以十全大補湯加烏藥附子胡蘆巴溫補之外用

木香餅熨之兼用獨頭蒜搗爛鋪於患處艾壯灸之以知熱爲止次日再灸以或消或潰爲效若潰後卽按摩直潰

瘍門治法

〔山甲內消散〕

見中
膿疽

〔十全大補湯〕

見潰
瘍門

〔木香餅〕

見乳部
中結核

腋部
腋癰

腋癰生在肱肢窩居中左右皆同



老弱之人難痊

〔柴胡清肝湯〕

見頭部
鬚疽

〔冲和膏〕

見腹
透膿散

腋疽

腋疽初起若核形肝恚脾憂氣血凝漫腫堅硬宜蒜灸日久紅熱潰先疼註此證一名米疽又名疚疽發於肱肢窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂恚怒氣結血滯而成漫腫堅硬皮色如常日久將潰色紅微熱疼痛

腋癰暴腫生腋間腫硬焮赤痛熱寒肝脾血熱兼忿怒初宜清解潰補瘡註此證一名夾肢癰發於腋際卽俗名肱肢窩也屬肝脾血熱兼忿怒而成初起暴腫焮硬色赤疼痛身發寒熱難消必欲作膿初宜服柴胡清肝湯外敷冲和膏疼痛日增宜服透膿散加金銀花甘草節桔梗膿脹痛者減之已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門此證首尾忌用寒涼中年易愈

也初宜艾壯隔蒜片灸法內服柴胡清肝湯加烏藥消之虛弱之人宜服香貝養榮湯外用烏龍膏敷之早治或有全消者遲則膿成宜服託裏透膿湯膿脹痛者鍼之膿出痛減隨患者虛實補之其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門此證初終內外治法禁用寒涼中年易愈衰老難痊

〔隔蒜灸法〕見首卷後法

〔柴胡清肝湯〕見頭部癰疽

〔香貝養榮湯〕見項部上石疽

〔烏龍膏〕見腫瘍門

〔託裏透膿湯〕見頭項

〔部侵
膿疽〕

黯
疔

黯疔生在肱肢窩居中堅硬潰遲左右皆同之如釘頭

黯
疔



腋疽圖



腋疽生在肱肢窩居中堅硬潰遲左右皆同

黯疔藏於腋下生肝脾火毒癰而疼寒熱拘急色紫黑急按疔門治卽寧

〔註〕此證生於腋下由肝脾二經火毒而成堅硬勢若釘頭

癰而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩躁作嘔痛引半身宜服麥靈丹其次內外急按疔門治之卽愈

〔麥靈丹〕見腫瘍門

肋部

肋疽

肋疽始發屬肝經火毒鬱怒結腫形紫痛梅李甚如盤急宜鍼砭免內攻〔註〕此證一名夾熒疽生於肋條骨間由肝經火毒鬱怒結聚而成初如梅李漸大如盤色紫焮痛連及肩肘患在左痛牽右肋患在右痛牽左肋二十日

肋疽在肋條骨間堅硬色紫腫大如盤



肋疽

氣爲主蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二停飲內傷者十有八九惟醫人臨證詳辨之膿熟用臥鍼開之餘按躁脈實作嘔爲有餘之證宜服雙解貴金丸下之腫硬不潰宜服透膿湯脈弱作嘔此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助感受寒邪及偶觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助

急宜磁鍼砭出紫血庶免毒氣攻裏砭後赤腫痛甚煩躁脈實作嘔爲有餘之證宜服雙解貴金丸下之腫硬不潰宜服透膿湯脈弱作嘔此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助感受寒邪及偶觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助

淵疽

〔雙解貴金丸〕〔透膿散〕俱見腫門〔香砂六君子湯〕見瀉門

淵疽

圖



淵疽肝膽憂成生於肋下硬腫疼潰破有聲內膜透未潰當服護膜靈〔註〕此證因憂恚太過以致肝膽兩傷而成生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也卽於陽陵泉穴灸二七壯其聲卽止穴

淵疽在腋下三寸堅硬不紅

在膝臍骨外廉下一寸陷中，蹲坐取之即得。內外治法皆同。肋疽凡肋脰脅腰腹空軟之處發癰疽者，當在將潰未潰之際，多服護膜散可免透膜之患。

【護膜散】白蠟 白芨各等分 共研細末，輕劑一錢，中劑二錢，大劑三錢。黃酒調服米湯亦可。

【方歌】護膜散內二味藥，白蠟白芨爲細末。或酒或以米湯調，將膜預服不透膜。

內發丹毒

丹毒肝脾熱極生肋上，腰胯赤霞形急，宜砭出紫黑血。嘔噦昏脹毒內攻。〔註〕此證由肝脾二經熱極生風所致，生於肋骨延及腰胯，色赤如霞，遊步如雲，痛如火燎，急向赤腫週圍，砭出紫黑血，以瘦牛肉片貼之，羊肉片亦可。其毒即可減半。初服雙解貴金丸汗之，次服化斑解毒湯，投方應病者順。若嘔噦昏潰，胸腹脹脹，偏身青紫者，則爲毒氣內攻屬逆。

圖 内發丹毒



內發丹毒生於肋骨延及腰胯色赤如霞遊走如雲

〔化斑解毒湯〕 升麻 石膏 連翹心 牛蒡子

人中黃 黃連 知母 黑參各一錢 竹葉二十片水二鍾煎八分服。

〔方歌〕化斑解毒熱生風，致發丹毒雲片紅。升膏翹蒡中黃等，黃連知母黑參同。
〔雙解貴金丸〕 觀腫湯門。

脇癰（附疽）

脇癰焮紅高腫疼，疽堅塌漫冷不紅，皆屬肝膽怒火結，遲潰敗漿冷虛凶。〔註〕此證生於軟肋，有硬骨者爲肋下，軟肉處爲季脇，癰疽二證皆由肝膽怒火凝結而成，多生於體虛之人，初如梅李，漸長如鵝卵，色紅焮痛高腫，二七

脇

癰

圖



脇癰在肋骨下軟肉處

〔柴胡清肝湯〕見頭部

〔託裏透膿湯〕見頭部

內癰部

肺癰

肺癰肺熱復傷風。肺臟生癰隱痛胸。狀若傷寒燥欬甚。稠濁痰涎腥臭膿。未潰射干麻黃汗。壅不得臥葶苈攻。潰後膿稠能食吉。膿清兼血不食凶。〔註〕此證係肺藏蓄熱復傷風邪鬱久成癰。以致胸內中府穴隱隱疼痛。振寒脈數。狀類傷寒。咽燥不渴。欬而喘滿。唾稠黏黃痰。兼臭穢膿血也。治之者於未潰時。乘膿未成。風鬱於表者。法宜疏散。用射干麻黃湯以汗之。如氣壅喘滿。身不得臥者。急服葶苈大棗湯以瀉之。如欬有微熱。煩滿。胸中甲錯。膿欲成者。宜千金葦莖湯以吐之。若吐膿腥臭。形如米粥者。宜桔梗湯以排除膿。若吐膿腥臭。欬而胸滿者。宜外臺桔梗白散。以開瘀塞。若咯吐膿血。兼午後身熱煩躁。宜金鯉湯主之。兼飲重便。若潰後胸膈脇肋隱痛不止。口燥咽乾。煩悶多渴。自汗盜汗。眠臥不得安。吐稠痰腥臭。此係癰膿不盡。而兼裏虛。宜寧肺桔梗湯主之。若癰膿已潰。喘滿腥臭。濁痰俱。

潰破膿稠爲癰。若堅硬平塌。漫腫木痛。不紅不熱。月餘潰破稀膿爲疽。若失治。屆期不潰。攻擊成膿。腫如鼓脹。破出敗漿。腥臭膿者逆。鬱瀉火。如已成者。服託裏透膿湯。膿熟脹痛。俱用臥鍼開之。已潰以排餘膿。補氣血爲要。餘按癰疽潰瘍門治法。投補不應者難治。

退惟欬嗽咽乾咯吐痰血脇肋微痛不能久臥者此屬肺癰潰處未斂宜紫菀草湯清補之渴甚去半夏加石膏服之若癰瘍潰後欬嗽無休脹痰不盡形氣虛羸者宜清金寧肺丸主之凡治此證惟以身溫脈細膿血交黏痰色鮮明飲食甘美膿血漸止便潤者為吉若手掌皮粗潰後六脈洪數氣急顴紅污膿白血慶食及大便結燥者為凶中府穴又名肺募在乳上第三根肋骨間。

〔射干麻黃湯〕 射十或十三枝 麻黃

生薑各四兩 細辛 紫菀 款冬花各三兩

大棗七枚 五味子 半夏各半升洗水煎溫服

〔方歌〕射干麻黃欬上氣肺癰喉中水雞聲

射麻生薑辛菀夏五味大棗並款冬

〔葶藶大棗湯〕 〔苦葶藶〕輕者五錢重者一兩

〔大棗〕輕者五枚去核 以水三鍾煎至一

鍾服之

〔方歌〕葶藶大棗治肺壅欬不得臥有癰膿葶藶苦寒瀉實熱佐棗之甘和胃經

〔千金葦莖湯〕 葦莖升 炒 蕙苡仁 炒 瓜瓣各半升 即桃仁五十粒去尖炒研


〔方歌〕千金葦莖肺癰欬微熱煩滿吐敗濁皮膚甲錯宜葦莖蕙苡桃仁瓜瓣合

〔桔梗湯〕 苦桔梗兩 甘草生水煎服

〔方歌〕桔梗湯用排餘膿肺癰吐膿米粥形清熱解毒須甘草開提肺氣桔梗功

〔桔梗湯〕 苦桔梗兩 甘草生水煎服

五 腸 心募巨闕穴 胃募中脘穴 大腸募天樞穴 三焦募石門穴 膀胱募中極穴



小腸募關元穴

〔外臺桔梗白散〕 苦桔梗 貝母分

巴豆一分去皮
一兩重

以上三味爲散強人飲服半錢七羸者減之病在

膈上者吐嘔在膈下者瀉出若下多不止飲冷水一盃則定

〔方歌〕外臺桔梗白散方肺癰便祕服之良桔梗貝母與巴豆藥微力大功速強

〔金鯉湯〕 金色活鯉魚一尾約四兩重

貝母錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末摻在魚肚內線

繫之用上白童子便半大盤將魚浸童便內重湯炮煮魚眼突出爲度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內炮

熟肉與童便作二三次一日食盡一枚其功效甚捷

〔方歌〕金鯉湯中效罕稀法同貝母活鯉魚童便浸魚重湯炮肺癰煩熱善能醫

〔寧肺桔梗湯〕 苦桔梗 貝母心當歸

桔梗仁研 生黃耆 枳殼炒

甘草節 桑白皮炒 防己

百合心

薏苡各八分炒

五味子 地骨皮 知母生

杏仁研

苦葶藶各五分

水二鐘薑三片煎八分不拘時

服 效甚倍加百合

身熱加柴胡黃芩

大便不利加蜜炙大黃一錢

小水澀滯加燈心木通 頑躁痰血

加白茅根 胸痛加人參白芷

〔方歌〕寧肺桔梗肺癰著歸蕷貝殼甘桑皮防己百合草五味杏知苡仁地骨宜

〔紫菀草湯〕 紫菀草 犀角末 甘草炙

人參分各五

桑葉霜者用經

款冬花 百合心

杏仁炒

阿膠潤便

炒用便

貝母去

半夏製

蒲黃各七分生

引薑三片水二鐘煎八分將犀角末調入食後服

〔方歌〕紫菀草湯參犀角款冬桑葉杏百合阿膠甘夏貝蒲黃專醫肺癰不久臥

〔清金寧肺丸〕 墓皮 白茯苓 苦桔梗 貝母去

人參 黃芩錢各五

麥冬去地骨皮 銀柴胡 川

芍 白芍炒 胡黃連錢各六分

五味子 天冬去

生地酒浸搗膏熟地膏搗

歸身 白朮錢炒 甘草三錢 以

上爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七十丸食遠白滾湯送下

〔方歌〕清金寧肺丸。肺癰陳芩桔貝參二冬。柴芩歸芍黃連草。尤味生熟地骨芍。

大小腸癰

大小腸癰因濕熱氣滯瘀血注腸中。初服大黃行瘀滯。膿成薏苡牡丹平。〔註〕此二證俱由濕熱氣滯凝結而成。或努力瘀血或產後敗瘀蓄積。流注於大腸小腸之中。初起發熱惡風。自汗。身皮甲錯。關元天樞二穴隱痛微腫。按之腹內急痛。大腸癰多大便堅腫。小腸癰多小水澀滯。脈俱遲緊。此時癰膿未成。宜大黃湯下之。瘀血利盡。若小水閉澀。仍宜大黃湯加琥珀末木通利之。自效。若癰成日久不潰。身皮甲錯。內無積聚。腹急腹痛。身無熱而脈數者。係腸內陰冷。不能爲膿。宜薏苡附子散主之。若脈見洪數。肚脅高突。腹痛脹滿。不食動轉。側身則有水聲。便淋刺痛者。癰膿已成。宜薏苡湯主之。腹濡而痛。少腹急脹。時時下膿者。毒未解也。宜丹皮湯治之。如膿從脣出。腹脹不除。飲食減少。面白神勞。此屬氣血俱虛。宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子斂而補之。患者轉身動作。宜徐緩而勿驚慎之。如耽延日久。因循失治。以致毒攻內藏。腹痛牽陰。腸胃受傷。或致陰器紫黑腐爛。色敗無膿。每流污水。衾幃多臭。煩躁不止。身熱嗌乾。俱屬逆證。關元穴又名小腸募。在臍下三寸。天樞穴又名大腸募。在臍旁開二寸。

〔大黃湯〕 大黃炒剉 牡丹皮 硝石研 芥子 桃仁炒先以湯浸去皮尖雙仁勿用 以上各等分。共剉碎。每用五錢。水二鍾。煎至一鍾。去渣空心溫服。以利下膿血爲度。未利再服。

諸募圖



〔方歌〕大黃湯善治腸癰少腹堅痛脹未成牡丹皮與大黃炒芥子桃仁硝石靈。

〔薏苡附子散〕附子炮二分敗醬分五錢薏苡仁一錢以上爲末每服方寸匕以水二合煎頓服小水當下三因云薏苡附子同前敗醬用一兩一分每四錢水盞半煎七分去渣空心服。

〔方歌〕薏苡附子散甲錯腸癰腹脹痛脈數附子敗醬薏苡仁爲末水煎空心服。

〔薏苡湯〕薏苡仁 桔梗仁各三錢 牡丹皮 桃仁二錢水二鍾煎至一鍾不拘時服。

〔方歌〕薏苡湯治腹水聲腸癰便淋刺痛疼牡丹皮共桔梗子還有桃仁薏苡仁。

〔丹皮湯〕丹皮 桔梗仁各一錢 桃仁泥 朴硝各二錢 大黃五錢水二鍾煎一鍾去渣入硝再煎數滾不拘時服。

〔方歌〕丹皮湯療腸癰證腹濡而痛時下膿硝黃丹蔞桃仁共水煎服之有奇功。

〔八珍湯〕見瀆瘍門。

胃癰

胃癰中脘穴腫疼不欬不嗽吐血膿飲食之毒七情火候治腸癰大法同。〔註〕此證初起中脘穴必隱痛微腫寒熱如瘡身皮甲錯並無欬嗽咯吐膿血由飲食之毒七情之火熱聚胃口成癰脈來沉數者初服清胃射干湯下之若脈濇滯者瘀血也宜服丹皮湯下之脈洪數者膿成也赤豆薏苡仁湯排之體倦氣喘作渴小水頻數者肺氣虛也補中益氣湯加麥冬五味子補之其候證生死治法與大小腸癰同中脘穴又名胃募在臍上四寸。

〔清胃射干湯〕射干 升麻 犀角 麥冬去心 元參 大黃 黃芩各一錢 芒硝 檀子 竹葉各五錢以上水煎服。

〔方歌〕清胃射干湯射干升麻犀角麥冬全參芩大黃芒硝等竹葉山梔胃癰痊。

〔赤豆薏苡仁湯〕 赤小豆 薏苡仁 防己 甘草各等分 水二鍾煎八分食遠服。

〔方歌〕赤豆薏苡湯最神。甘己赤豆薏苡仁。胃癰膿成脈洪數。二鍾水煎服八分。

〔丹皮湯〕見大小腸 〔補中益氣湯〕見瀆門

脾癰

脾癰濕熱瘀血凝。章門穴腫兼隱疼。腹脹噏乾小水短利下濕瘀補收功。〔註〕此證始發章門穴必隱疼微腫由過食生冷兼濕熱或瘀血鬱滯脾經而成令人腹脹咽噏乾燥小水短澀初宜大黃湯赤豆薏苡仁湯二方合而用之以攻滯鬱二便通利腹脹全消宜六君子湯扶脾調理順逆看法與胃癰同章門穴又名脾募在臍旁開六寸高上二寸。

〔大黃湯〕見大小腸

〔赤豆薏苡仁湯〕見胃

〔六君子湯〕即香砂六君子湯去藿香砂仁見瀆湯門去

肝癰

肝癰憤鬱氣逆成。期門穴腫更兼疼。臥驚肢滿溺不利清肝滋腎即成功。〔註〕此證始發期門穴必隱痛微腫令人兩胠脹滿脇痛側臥則驚便溺艱難由憤鬱氣逆而成初服復元通氣散次服柴胡清肝湯痛脹已止宜服六味地黃丸脾虛食少則佐以八珍湯滋腎補脾治之最效禁用溫補鍼灸期門穴又名肝募在乳旁一寸半再直上一寸半。

〔復元通氣散〕見腫門

〔柴胡清肝湯〕見頭部

〔六味地黃丸〕見面部

〔八珍湯〕見瀆門

心癰

心癰巨闊腫隱疼。酷飲嗜熱火毒成面赤口渴身作痛治法陽熱總宜清。〔註〕此證始發巨闊穴必隱痛微腫令人寒熱身痛頭面色赤口渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼酷飲嗜熱而成宜服涼血飲酒毒爲病者宜服升麻葛根湯